

## **RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

### **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Deccox 6 – 6 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi per bovini ed ovini

### **2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**

Un chilogrammo di prodotto contiene:

**Principio attivo:**

Decochinato            6,00 g

**Eccipienti:**

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

### **3. FORMA FARMACEUTICA**

Premiscela per alimenti medicamentosi

### **4. INDICAZIONI CLINICHE**

#### **4.1 Specie di destinazione**

Bovini ed ovini

#### **4.2 Indicazioni per l'impiego specificando la specie di destinazione**

Affezioni da coccidi sensibili al decochinato. Trattamento preventivo delle coccidiosi in bovini ed ovini in allevamenti con anamnesi confermata.

#### **4.3 Controindicazioni**

Vietato l'utilizzo in animali il cui latte è destinato al consumo umano.

#### **4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Al fine di ottenere un efficace controllo dei coccidi il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci per la ricerca delle oocisti.

#### **4.5 Precauzioni speciali per l'impiego**

**Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Nessuna

**Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Evitare il contatto con il prodotto. Durante la manipolazione non mangiare, bere né fumare. Usare guanti e mascherina di protezione.

#### **4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

Nessuna nota

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento**

L'uso non è raccomandato durante l'allattamento. In assenza di studi sulla specie di destinazione usare in gravidanza solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

#### **4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Nessuna conosciuta

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

Via di somministrazione: attraverso il mangime.

Posologia:

Bovini: 8,3 g di premiscela ogni 100 kg di peso vivo pari a 0,5 mg di decochinato per kg di peso vivo al giorno per 28 giorni.

Ovini: 16,6 g di premiscela ogni 100 kg di peso vivo pari a 1 mg di decochinato per kg di peso vivo al giorno per 28 giorni.

Oppure

Specie	Razione giornaliera di mangime	Corrispondenti dosaggi di Decox 6
Bovini	100g/10kg p.v.	8.33 kg/ton di mangime
	75g/10 kg p.v.	11.1 kg/ton di mangime
	50g/10 kg p.v.	16.7 kg/ton di mangime
Ovini	100g/10kg p.v.	16.7 kg/ton di mangime
	75g/10 kg p.v.	22.2 kg/ton di mangime
	50g/10 kg p.v.	33.4 kg/ton di mangime

La somministrazione nel mangime deve essere eseguita tenendo conto del consumo giornaliero di alimento e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta. L'assunzione di mangime medicato dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovradozaggio raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo, tenendo conto del consumo giornaliero di alimento, e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da miscelare nel mangime.

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario**

Durante le sperimentazioni nessun effetto collaterale negativo è stato evidenziato.

#### **4.11 Tempi di attesa**

7 giorni per le carni bovine.

1 giorno per le carni ovine.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

### **5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE**

Gruppo farmacoterapeutico: anticoccidico

Codice ATC vet: QP51AX14

#### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

Il decochinato appartiene alla categoria dei chinolonici, inibisce lo sviluppo dei parassiti agendo durante i primi giorni del ciclo dei coccidi che corrisponde allo sviluppo dei parassiti presenti nell'intestino tenue dell'animale. Il decochinato si deposita sulla superficie degli sporozoi inibendo lo sviluppo e interferendo con la sintesi del DNA.

#### **5.2 Proprietà farmacocinetiche**

Assorbimento: essendo molto poco solubile, il decochinato è destinato ad esercitare un effetto solamente locale visto che l'assorbimento intestinale è quasi inesistente.

Distribuzione: in caso di somministrazione endovenosa nelle vacche e nei montoni il decochinato scompare nel plasma in 1,5 ore. Le concentrazioni più elevate si riscontrano nel fegato e nei reni per entrambe le specie.

### **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

#### **6.1 Eccipienti:**

Farina di frumento

#### **6.2 Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

#### **6.3 Periodo di validità**

3 anni per il prodotto conservato in confezione integra correttamente conservato.

Periodo di validità dopo prima apertura: 1 mese.

#### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Non conservare a temperature superiori a 30°C e proteggere dalla luce solare diretta.

#### **6.5 Natura e composizione del condizionamento primario**

Sacchi da 10 e 25 kg in carta multistrato polietilenata

#### **6.6 Precauzioni speciali da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo**

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti

in conformità alle disposizioni di legge locali.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Zoetis Italia S.r.l.  
Via Andrea Doria, 41 M  
00192 Roma

**8. NUMERO(I) DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Sacco da 10 kg 102450018  
Sacco da 25 kg 102450020

**9. DATA DELLA PRIMA AIC/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

19/12/1997 - 19/12/2007

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Gennaio 2014

**MODALITÀ DI DISPENSAZIONE**

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

**Deccox 6**  
**6 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi**  
**Bovini, Ovini**

**Composizione**

Un kg di prodotto contiene:

Principi attivi: Decochinato 6.00 g

Eccipienti: Farina di frumento q.b. a 1000.00 g

**Indicazioni terapeutiche**

Affezioni da coccidi sensibili al decochinato. Trattamento preventivo delle coccidiosi in bovini e ovini in allevamenti con anamnesi confermata.

**Posologia**

Via di somministrazione: orale attraverso il mangime.

Posologia: Bovini: 8.3 g di premiscela/100 kg di peso vivo pari a 0.5 mg di decochinato per kg p.v.

Ovini: 16.6 g di premiscela/100 kg di peso vivo pari a 1 mg di Decochinato per kg p.v.

Oppure

Specie	Razione giornaliera di mangime	Corrispondenti dosaggi di Deccox 6
Bovini	100g/10kg p.v.	8.33 kg/ton di mangime
	75g/10 kg p.v.	11.1 kg/ton di mangime
	50g/10 kg p.v.	16.7 kg/ton di mangime
Ovini	100g/10kg p.v.	16.7 kg/ton di mangime
	75g/10 kg p.v.	22.2 kg/ton di mangime
	50g/10 kg p.v.	33.4 kg/ton di mangime

La somministrazione nel mangime deve essere eseguita tenendo conto del consumo giornaliero di alimento e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta. L'assunzione del mangime medicato dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovraccarico o sottodosaggio raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo, tenendo conto del consumo giornaliero di alimento, e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da miscelare nel mangime.

**Durata del trattamento**

28 giorni.

**Tempo di attesa**

Bovini: 7 giorni per le carni

Ovini: 1 giorno per le carni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

**Precauzioni:** Evitare il contatto con il prodotto. Durante la manipolazione non mangiare, bere né fumare. Usare guanti e mascherina di protezione.

**Avvertenze speciali per ciascuna specie:** Al fine di ottenere un efficace controllo dei coccidi il trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci per la ricerca delle oocisti. **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento:** L'uso non è raccomandato durante l'allattamento. In assenza di studi sulla specie di destinazione usare in gravidanza solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

**Incompatibilità:** In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

**Reazioni avverse:** Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli appositi sistemi di raccolta per i medicinali scaduti o non utilizzati.

**Speciali precauzioni per la conservazione:** Non conservare a temperature superiori a 30°C e proteggere dalla luce diretta del sole.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta veterinaria in triplice copia non ripetibile.

#### USO VETERINARIO

AIC 102450018

CONFEZIONE 10 KG

Titolare AIC:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Qalian Italia s.r.l.

V. del Commercio 28/30,

Carpi (MO)

Validità: 3 anni. La validità si riferisce al prodotto in confezione integra originale correttamente conservata alle normali condizioni di temperatura e umidità ambientale.

Dopo l'apertura usare entro 1 mese.

LOTTO n°

DATA SCADENZA

**Deccox 6**  
**6 g/kg premiscela per alimenti medicamentosi**  
**Bovini, Ovini**

**Composizione**

Un kg di prodotto contiene:

Principi attivi: Decochinato 6.00 g

Eccipienti: Farina di frumento q.b. a 1000.00 g

**Indicazioni terapeutiche:** Affezioni da coccidi sensibili al decochinato. Trattamento preventivo delle coccidiosi in bovini e ovini in allevamenti con anamnesi confermata.

**Posologia**

Via di somministrazione: orale attraverso il mangime.

Posologia: Bovini: 8.3 g di premiscela/100 kg di peso vivo pari a 0.5 mg di decochinato per kg p.v.

Ovini: 16.6 g di premiscela/100 kg di peso vivo pari a 1 mg di Decochinato per kg p.v.

Oppure

Specie	Razione giornaliera di mangime	Corrispondenti dosaggi di Deccox 6
Bovini	100g/10kg p.v.	8.33 kg/ton di mangime
	75g/10 kg p.v.	11.1 kg/ton di mangime
	50g/10 kg p.v.	16.7 kg/ton di mangime
Ovini	100g/10kg p.v.	16.7 kg/ton di mangime
	75g/10 kg p.v.	22.2 kg/ton di mangime
	50g/10 kg p.v.	33.4 kg/ton di mangime

La somministrazione nel mangime deve essere eseguita tenendo conto del consumo giornaliero di alimento e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta. L'assunzione del mangime medicato dipende dalle condizioni cliniche degli animali. Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovra o sottodosaggio raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo, tenendo conto del consumo giornaliero di alimento, e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da miscelare nel mangime.

**Durata del trattamento**

28 giorni.

**Tempo di attesa**

Bovini: 7 giorni per le carni

Ovini: 1 giorno per le carni.

Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano.

**Precauzioni:** Evitare il contatto con il prodotto. Durante la manipolazione non mangiare, bere né fumare. Usare guanti e mascherina di protezione.

**Avvertenze speciali per ciascuna specie:** Al fine di ottenere un efficace controllo dei coccidi il

trattamento dovrebbe essere effettuato in base agli esiti dell'esame parassitologico sulle feci per la ricerca delle oocisti. **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento:** L'uso non è raccomandato durante l'allattamento. In assenza di studi sulla specie di destinazione usare in gravidanza solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

**Incompatibilità:** In assenza di studi di compatibilità non miscelare con altri medicinali veterinari.

**Reazioni avverse:** Nessuna nota. Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo:** Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli appositi sistemi di raccolta per i medicinali scaduti o non utilizzati.

**Speciali precauzioni per la conservazione:** Non conservare a temperature superiori a 30°C e proteggere dalla luce diretta del sole.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta veterinaria in triplice copia non ripetibile.

#### USO VETERINARIO

AIC 102450020

CONFEZIONE 25 KG

Titolare AIC:

Zoetis Italia S.r.l.

Via Andrea Doria, 41 M

00192 Roma

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Qalian Italia S.r.l

V. del Commercio 28/30,

Carpi (MO)

Validità: 3 anni. La validità si riferisce al prodotto in confezione integra originale correttamente conservata alle normali condizioni di temperatura e umidità ambientale.

Dopo l'apertura usare entro 1 mese.

LOTTO n°

DATA SCADENZA