

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/00/1232
Vitaminthe pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 M L.I.D.
06516 Carros
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Vitaminthe pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml pastas satur:

Aktīvās vielas:

Niklozamīds	0, 24 g
Oksibendazols	0, 03 g

Palīgvielas:

Nātrija bisulfīds, nātrija benzoāts, dekvalīna hlorīds, ksantāna sveķi, nātrija polinaftalēna sulfonāts, dimetikons 300, nātrija ciklamāts, anšovu pulveris, pretputu līdzeklis 70426, attīrīts ūdens.

Dzeltena līdz brūna pasta.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Lenteņu, un cērmju (*Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Dipylidium caninum*) invāzijas ārstēšanai suņiem un kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kaķēniem vai kucēniem, jaunākiem par 6 nedēļām.

Nelietot diarejas vai zarnu nosprostošanas gadījumā.

Nelietot dzīvniekiem ar zināmu pastiprinātu jutību pret kādu no aktīvajām vielām vai pret palīgvielām.

Nelietot gadījumos, ja ir aizdomas par rezistenci pret benzimidazoliem.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Reti var novērot pārejošus gremošanas traucējumus (diareju, vemšanu).

Īslaicīgi var novērot mīkstas fekālijas.

Reti var novērot letarģiju un neiroloģiskas pazīmes (piemēram, trīci, ataksiju un grīlošanos).

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 ārstētajiem dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s));
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100 ārstētajiem dzīvniekiem);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 dzīvniekam no 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus ziņojumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi, kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Lietot 15 mg oksibendazola un 120 mg niklozamīda, kas atbilst 0,5 ml pastas, uz vienu kilogramu ķermeņa svara.

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

5 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 0,5 kg ķermeņa svara.

10 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 2 kg ķermeņa svara.

25 ml šļirce: katra iedaļa atbilst 10 kg ķermeņa svara.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zāles lietot vienas devas veidā uz dzīvnieka mēles vai sajaucot ar barību.

Kucēniem un kaķēniem: lietot divas reizes ar 4 nedēļu intervālu, laikā no 6. līdz 12. dzīves nedēļai.

Pieaugušiem dzīvniekiem: lietot reizi 6 mēnešos.

Sieviešu kārtas dzīvniekiem: lietot 3 reizes gadā — pārošanas laikā, vienu nedēļu pirms dzemdībām un 3–4 nedēļas pēc dzemdībām.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma ar EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pēc ilgstošas vai atkārtotas šo zāļu lietošanas var izveidoties rezistence.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Pēc rīkošanās ar zālēm rūpīgi nomazgāt rokas. Izvairīties no zāļu saskares ar ādu, ja ir zināma pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām. Ja notikusi nejauša norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko

palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Likvidēt kontaminētās fekālijas. Nelaist bērnus pie ārstētajiem dzīvniekiem.

Lietošana grūsnības un laktācijas laikā

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnības un laktācijas laikā. Lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā var novērot neiroloģiskas pazīmes, piemēram, trīci, ataksiju un grībošanos.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

02/2023

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Igaunija

Tālr.: +3726709001