

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCORTIN, 2 mg/ml injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

deksametazono (natrio fosfato druskos) 2 mg,

pagalbinių medžiagų

benzilo alkoholio 10,4 mg,

natrio metabisulfito, trinitratro citrato, dinatrio edetato, polietilenglikolio-400.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, kai reikalingas vidutinės veikimo trukmės parenterinis kortikosteroidų poveikis. Gali būti naudojamas kaip priešūždegiminis ir antialerginis vaistas, ar gydant galvijus nuo pirminės ketozės, taip pat karvėms atsivedimui sukelti. Naudotinas esant acetonemijai, alergijai, artritui, bursitui, šoku ir tendovaginitui.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu, išskyrus jei norima sukelti abortą ar paankstinti atvedimą.

Negalima naudoti gyvūnams sergantiems diabetu, lėtiniu nefritu, inkstų ligomis, esant kongestiniam širdies nepakankamumui, osteoporozei, išskyrus skubios pagalbos atvejus.

Negalima naudoti gyvūnams virusinės infekcijos viremijos stadijos metu.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Klinikiniai ir laboratoriniai duomenys rodo, kad patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu sugirdyti ar sušvirkšti kortikosteroidai gali sužadinti atsivedimą, kuris kartais gali būti kompliktuotas vaisiaus distocija, gaisimu, susilaikysiomis nuovalomis ir metritu. Kortikosteroidai naudoti vaikingoms kalėms, triušėms ir graužikams sukėlė vaisių vilko gomurį, kalėms – ir kitokius šuniukų apsigimimus, pvz., deformuotas priekines galūnes.

Gyvūnus, kuriems naudojamas šis vaistas, būtina įdėmiai stebėti. Kortikosteroidai veikia priešūždegimiškai ir gali maskuoti infekcijos požymius, todėl iki bus nustatyta tiksli diagnozė, gali

tekti nustoti naudoti vaistą. Kai kurių gliukokortikoidų perdozavimas gali skatinti natrio ir skysčių susilaikymą, kalio netekimą ir svorio prieaugį.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra. Žr. p. 4.3.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina saugotis ir neį(si)švirkšti žmogui. Atsitiktinai įsišvirkštus, būtina kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio vaisto etiketę.

Būtina vengti vaisto patekimo ant odos ar į akis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, būtina plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirgimui išliekant ilgesnį laiką būtina kreiptis į gydytoją.

Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Priešuždegimiškai veikiantys kortikosteroidai, pvz., deksametazonas, gali kelti daug šalutinių poveikių. Jei vienkartinė didesnė dozė dažniausiai yra gerai toleruojama, tai naudojant ilgą laiką ar ilgo veikimo esterius, gali pasireikšti sunkios nepalankios reakcijos. Jei vaistą reikia naudoti ilgiau ar ilgai, būtina skirti mažiausias vaisto dozes, tiek kiek būtina simptomams kontroliuoti.

Sistemiškai naudojami kortikosteroidai gali sukelti poliuriją, polidipsiją ir polifagiją, ypač ankstyvuoju gydymo metu. Ilgai naudojami kai kurie kortikosteroidai gali sukelti natrio ir vandens užsilaikymą bei hipokalemiją. Sisteminiai kortikosteroidai sukėlė kalcio atsидėjimą odoje (*calcinosis cutis*).

Kortikosteroidai gali lėtinti žaizdų gijimą, o dėl imunosupresinio poveikio gali mažėti organizmo atsparumas ar sunkėti gyvūno būklė dėl esančios infekcijos. Esant bakterinei infekcijai ir naudojant kortikosteroidus, būtina naudoti antibakterinius vaistus. Esant virusinei infekcijai, kortikosteroidai gali sunkinti ar greitinti ligos eigą.

Veterinarijos gydytojas turi atidžiai stebėti gyvūno būklę viso gydymo kurso metu.

Sisteminių kortikosteroidų negalima naudoti gyvūnams, sergantiems inkstų ligomis ir cukriniu diabetu. Naudojant kortikosteroidus buvo pastebėti virškinimo trakto opėjimo atvejai, be to opėjimas gali pasunkėti kai gyvūnai vienu metu yra gydomi nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ar jiems yra stuburo trauma. Kortikosteroidai gali sukelti kepenų padidėjimą (hepatomegaliją) ir kepenų fermentų kiekio serume pagausėjimą.

Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninę atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Išskyrus jei norima sukelti atsivedimą karvėms, vaikingoms patelės kortikosteroidų naudoti nerekomenduojama. Naudojus laboratorinių gyvūnų patelėms ankstyvuoju vaikingumo metu, buvo nustatyti vaisiaus apsigimimo atvejai. Naudojamas vėlyvuoju vaikingumo metu, vaistas gali sukelti abortą ar ankstyvąjį atsivedimą.

Naudojus vaistą karvėms atsivedimui sukelti, dažnai gali susilaikyti nuovalos, o vėliau pasireikšti metritas ir (ar) karvės gali sunkiau apsisėklinti.

Naudojus vaistą karvėms laktacijos metu, gali sumažėti primilžis.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti vienu metu su fenitoinu, rifampinu ir barbituratais, nes šie vaistai gali skatinti gliukokortikoidų biotransformavimą ir mažinti deksametazono kiekį kraujyje.

Nenaudoti vienu metu su makrolidų antibiotikais (eritromicinu, klaritromicinu, tilozinu), ketokonazoliu ir kitais azolo priešgrybiniais vaistais, nes jie gali lėtinti gliukokortikoidų biotransformavimą ir didinti deksametazono kiekį kraujyje.

Naudojami vienu metu su opėjimą skatinančiais vaistais, pvz., nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, kortikosteroidai gali didinti virškinimo trakto opėjimo pavojų. Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninį atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis. Kortikosteroidų negalima leisti į veną tuo pat metu su kalcio tirpalais. Negalima maišyti su kitais vaistais.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti į raumenis ar į veną, laikantis įprastų aseptikos reikalavimų:
galvijui – 5–15 ml,
veršeliui, ožkai ar kiaulei – 1-2,5 ml,
šuniui – 0,25-1 ml,
katei – 0,25 ml.
Jei reikia, pakartotinai gydyti galima po 24-48 val.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Perdozavus gali pasireikšti poliurija, polidipsija ar polifagija. Ilgas kortikosteroidų naudojimas gali sukelti sunkias nepalankias reakcijas. Žr. 4.6. p. „Nepalankios reakcijos“.

4.11. Išlauka

Galvijienai, ožkienai – 7 paros, kiaulienai – 2 paros, pienui – 72 val. (6 melžimai).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: sisteminis hormoninis preparatas. ATCvet kodas: QH02AB02.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Deksametazonas yra sintetinis gliukokortikosteroidas, kuriam būdingas stiprus priešuždegiminis, antialerginis ir įvairus hormoninis bei metabolinis poveikis. Deksametazonas veikia apie 25 kartus stipriau nei natūraliai organizme susidarantis kortizolis. Kortikosteroidai yra svarbūs normaliai baltymų, angliavandenių ir riebalų apykaitai vykti bei kontroliuojant uždegimą. Jie slopina uždegiminio atsako vystymąsi, t.y. paraudimą, tinimą, skausmą, taip pat kapiliarų išsiplėtimą bei fagocitozę ir užkerta kelią padidėjusio jautrumo reakcijoms, kurios gali pasireikšti po antigeno ir antikūno sąveikos. Daugiausiai deksametazonas veikia gliukoneogenezę, glikogeno atsidėjimą ir baltymų bei kalcio apykaitai, be to, neleidžia išsiskirti kortikotropinui. Gliukortikoidai taip pat veikia riebalų mobilizaciją, oksidaciją, sintezę bei kaupimąsi organizme. Išskyrus jei naudojamas esant antinksčių nepakankamumui, deksametazonas negydo sergančio gyvūno, o daugiausiai naudojamas ligos simptomams lengvinti dėl savo farmakologinių savybių, t.y., priešuždegiminio ir antialerginio poveikio. Didelėmis dozėmis jis yra švirkščiamas skubiais anafilaksinio reakcijų, nugaros smegenų pažeidimo ar šoko atvejais.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Deksametazonas ima veikti greitai (per 5–45 min.), veikia vidutiniškai ilgai. Šio vaisto sudėtyje yra deksametazono dinatrio fosfato esteris. Sušvirkštus ne į kraujagyslę (į raumenis, po oda, į sąnarį), esteris greitai absorbuojasi iš injekcijos vietos ir nedelsiant hidrolizuojamas į deksametazoną, kuris ima veikti greitai ir veikia 24–48 val. Švirkštus į raumenis, didžiausia deksametazono koncentracija (C_{max}) galvijų, arklių, kiaulių ir šunų kraujo plazmoje susidaro per 20 min. Kraujyje su baltymais jungiasi nedidelis deksametazono kiekis. Biologinis prieinamumas švirkštus į raumenis, lyginant su injekcija į veną, visų rūšių gyvūnų yra didelis. Deksametazonas patenka į audinių skysčius, tarp jų ir smegenų skystį. Vaistas

biotransformuojamas inkstuose ir kepenyse, iš organizmo išsiskiria su šlapimu. Pusinės eliminacijos laikas arkliams švirkštus į veną yra 3,5 val. Švirkštus į raumenis, pusinės eliminacijos laikas įvairių rūšių gyvūnams buvo nuo 1 iki 20 val.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Natrio metabisulfitas, trinatrio citratas, dinatrio edetatas, benzilo alkoholis, polietilenglikolis 400, injekcinis vanduo.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Deksametazono natrio fosfato negalima derinti su daunorubicino hidrochloridu, doksorubicino hidrochloridu, metaraminolio bitartratu ir vankomicinu.

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais. Žr. 4.8. p.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C), sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo rudo stiklo buteliukai po 50 ml, užkimšti brombutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas
LIETUVA

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/10/2010/001

9. REGISTRAVIMO/PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2010-12-10.

Perregistravimo data 2015-12-09.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2017-08-08

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS
BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCORTIN, 2 mg/ml injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

1 ml tirpalo yra 2 mg deksametazono (natrio fosfato druskos).

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

50 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti į raumenis ar į veną.

8. IŠLAUKA

Išlauka: galvijienai, ožkienai – 7 paros, kiaulienai – 2 paros, pienui – 72 val. (6 melžimai).

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius – 2 sav.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS
--

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C), sandariai uždarytą.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA
--

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas
LIETUVA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/10/2010/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
GLUCORTIN, 2 mg/ml injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Vinčų g. 3-48, 46297 Kaunas
LIETUVA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,
Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,
74001 Harjumaa,
ESTIJA

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

GLUCORTIN, 2 mg/ml injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

deksametazono (natrio fosfato druskos) 2 mg,

pagalbinių medžiagų

benzilo alkoholio 10,4 mg,
natrio metabisulfito, trinatrio citrato, dinatrio edetato, polietilenglikolio-400.

4. INDIKACIJA (-OS)

Galvijams, veršeliams, ožkoms, kiaulėms, šunims ir katėms gydyti, kai reikalingas vidutinės veikimo trukmės parenterinis kortikosteroidų poveikis. Gali būti naudojamas kaip priešūždegiminis ir antialerginis vaistas, ar gydant galvijus nuo pirminės ketozės, taip pat karvėms atsivedimui sukelti. Naudotinas esant acetonemijai, alergijai, artritui, bursitui, šokui ir tendovaginitui.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu, išskyrus jei norima sukelti abortą ar paankstinti atvedimą.

Negalima naudoti gyvūnams sergantiems diabetu, lėtiniu nefritu, inkstų ligomis, esant kongestiniam širdies nepakankamumui, osteoporozei, išskyrus skubios pagalbos atvejus.

Negalima naudoti gyvūnams virusinės infekcijos viremijos stadijos metu.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Priešuždegimiškai veikiantys kortikosteroidai, pvz., deksametazonas, gali kelti daug šalutinių poveikių. Jei vienkartinė didesnė dozė dažniausiai yra gerai toleruojama, tai naudojant ilgą laiką ar

ilgo veikimo esterius, gali pasireikšti sunkios nepalankios reakcijos. Jei vaistą reikia naudoti ilgiau ar ilgai, būtina skirti mažiausias vaisto dozes, tiek kiek būtina simptomams kontroliuoti. Sistemiskai naudojami kortikosteroidai gali sukelti poliuriją, polidipsiją ir polifagiją, ypač ankstyvuoju gydymo metu. Ilgai naudojami kai kurie kortikosteroidai gali sukelti natrio ir vandens užsilaikymą bei hipokalemiją. Sisteminiai kortikosteroidai sukėlė kalcio atsidėjimą odoje (*calcinosis cutis*). Kortikosteroidai gali lėtinti žaizdų gijimą, o dėl imunosupresinio poveikio gali mažėti organizmo atsparumas ar sunkėti gyvūno būklė dėl esančios infekcijos. Esant bakterinei infekcijai ir naudojant kortikosteroidus, būtina naudoti antibakterinius vaistus. Esant virusinei infekcijai, kortikosteroidai gali sunkinti ar greitinti ligos eigą. Veterinarijos gydytojas turi atidžiai stebėti gyvūno būklę viso gydymo kurso metu. Sisteminių kortikosteroidų negalima naudoti gyvūnams, sergantiems inkstų ligomis ir cukriniu diabetu. Naudojant kortikosteroidus buvo pastebėti virškinimo trakto opėjimo atvejai, be to opėjimas gali pasunkėti kai gyvūnai vienu metu yra gydomi nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo (NVNU) ar jiems yra stuburo trauma. Kortikosteroidai gali sukelti kepenų padidėjimą (hepatomegaliją) ir kepenų fermentų kiekio serume pagausėjimą. Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninį atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, veršeliai, ožkos, kiaulės, šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti į raumenis ar į veną, laikantis įprastų aseptikos reikalavimų:
galvijui – 5–15 ml,
veršeliui, ožkai ar kiaulei – 1-2,5 ml,
šuniui – 0,25-1 ml,
katei – 0,25 ml.
Jei reikia, pakartotinai gydyti galima po 24-48 val.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. 8 p.

10. IŠLAUKA

Galvijienai, ožkienai – 7 paros, kiaulienai – 2 paros, pienui – 72 val. (6 melžimai).

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Atidarius laikyti šaldytuve (2–8 °C), sandariai uždarytą.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 2 sav.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pakuotės.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Klinikiniai ir laboratoriniai duomenys rodo, kad patelėms paskutiniojo vaikingumo trimestro metu sugirdyti ar sušvirkšti kortikosteroidai gali sužadinti atsivedimą, kuris kartais gali būti komplikotas vaisiaus distocija, gaišimu, susilaikiusiomis nuovalomis ir metritu. Kortikosteroidai naudoti vaikingoms kalėms, triušėms ir graužikams sukėlė vaisių vilko gomurį, kalėms – ir kitokius šuniukų apsigimimus, pvz., deformuotas priekines galūnes.

Gyvūnus, kuriems naudojamas šis vaistas, būtina įdėmiai stebėti. Kortikosteroidai veikia priešūždegimiškai ir gali maskuoti infekcijos požymius, todėl iki bus nustatyta tiksli diagnozė, gali tekti nustoti naudoti vaistą. Kai kurių gliukokortikoidų perdozavimas gali skatinti natrio ir skysčių susilaikymą, kalio netekimą ir svorio prieaugį.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Būtina saugotis ir neį(s)švirkšti žmogui. Atsitiktinai įsišvirkštus, būtina kreiptis į gydytoją ir jam parodyti šio vaisto etiketę.

Būtina vengti vaisto patekimo ant odos ar į akis. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, būtina plauti dideliu kiekiu vandens. Sudirgimui išliekant ilgesnį laiką būtina kreiptis į gydytoją.

Vaistą būtina naudoti apdairiai, laikantis saugumo reikalavimų. Naudojus preparatą, reikia plauti rankas.

Vaikingumas ir laktacija

Išskyrus jei norima sukelti atsivedimą karvėms, vaikingoms patelės kortikosteroidų naudoti nerekomenduojama. Naudojus laboratorinių gyvūnų patelėms ankstyvuojų vaikingumo metu, buvo nustatyti vaisiaus apsigimimo atvejai. Naudojamas vėlyvuojų vaikingumo metu, vaistas gali sukelti abortą ar ankstyvąjį atsivedimą.

Naudojus vaistą karvėms atsivedimui sukelti, dažnai gali susilaikyti nuovalos, o vėliau pasireikšti metritas ir (ar) karvės gali sunkiau apsisėklinti.

Naudojus vaistą karvėms laktacijos metu, gali sumažėti primilžis.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti vienu metu su fenitoinu, rifampinu ir barbituratais, nes šie vaistai gali skatinti gliukokortikoidų biotransformavimą ir mažinti deksametazono kiekį kraujyje.

Nenaudoti vienu metu su makrolidų antibiotikais (eritromicinu, klaritromicinu, tilozinu), ketokonazoliu ir kitais azolo priešgrybiniais vaistais, nes jie gali lėtinti gliukokortikoidų biotransformavimą ir didinti deksametazono kiekį kraujyje.

Naudojami vienu metu su opėjimą skatinančiais vaistais, pvz., nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo, kortikosteroidai gali didinti virškinimo trakto opėjimo pavojų.

Kadangi kortikosteroidai gali slopinti imuninę atsaką į vakciną, vaisto negalima naudoti vienu metu su vakcinomis.

Kortikosteroidų negalima leisti į veną tuo pat metu su kalcio tirpalais. Negalima maišyti su kitais vaistais.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavus gali pasireikšti poliuriija, polidipsija ar polifagija. Ilgas kortikosteroidų naudojimas gali sukelti sunkias nepalankias reakcijas.

Nesuderinamumai

Negalima maišyti su kitais vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2017-08-08

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Farmakoterapinė grupė: parenterinis hormoninis preparatas. ATCvet kodas: QH02AB02.

Pakuotė:

II tipo rudo stiklo buteliukai po 50 ml, užkimšti brombutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.