

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ, КЪМ ЛИЦЕНЗ
ЗА УПОТРЕБА № 0022-1921-07.01.2013**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ЦИПЕРМЕТРИН ФАРМА
CYPERMETHRIN FARMA

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция в 100 ml:

Суперmethrin 10 g

Експципенти:

За пълен списък на експципентите, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор за кожа.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Говеда, овце, кучета и котки.

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

Инвазии от паразити чувствителни към циперметрин: За лечение на инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи при говеда, овце, кучета и котки. За лечение на краста.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен

Да не се използва в комбинация с други противопаразитни продукти.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Продуктът е предназначен за външна употреба, при стриктно спазване на всички указания за употреба.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

- Да се избягва вдишване на мъгла и пари.
- Да се избягва директен контакт с кожата. Да се измият ръцете след употреба. При контакт ръцете да се измият обилно с вода.

- Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, незабавно да се изплакнат, обилно с вода. Препоръчително е да се използват ръкавици при работа с продукта.
- Да не се пипа мястото на приложение за период от 3-6 часа след третирането.
- Хора с установена свръхчувствителност към пиретроидните инсектициди трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.
- При случайно поглъщане, да се потърси медицинска помощ. В случаи на продължително кожно или очно дразнещо действие, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции от приложението на продукта.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не се прилага по време на бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Да не се употребява паралелно с други инсектициди.

4.9 Доза и начин на приложение

Само за употреба върху кожата.

	Степен на разтваряне с вода	Концентрация, която трябва да се приложи	Забележки
Говеда	1 : 1000	100 ppm	Напръскване на цялото тяло; изкъпване
Говеда	1 : 200	500 ppm	Напръскване по гръбнака на животното (от тила до основата на опашката) 0.5 литра/животно
Овце	1 : 1000	100 ppm	Искъпване
Кучета и котки	1 мл на литър вода	100 ppm	Напръскване от разстояние 15-20 см по дължината на гърба до овлажняване на косъма.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Циперметринът е слабо токсичен при кожно приложение. Признаците на интоксикация при всички пътища на приемане са характерни за циано-индуцираните пиретроидни интоксикации и се характеризират със седация, атаксия, приведена походка,

непостоянен тремор и конвулсии. Тези признаци на токсичност се появяват няколко часа след прилагане на дозата и се проявяват при оцелелите за период от 3 дни.

4.11 Карентен срок

Месо и вътрешни органи (говеда и овце) – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Ектопаразитициди за локална употреба, Пиретрини и пиретроиди

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QP53AC08

Циперметринът е синтетичен пиретроиден инсектицид, който притежава висока инсектицидна активност, ниска токсичност за птиците и бозайниците и е достатъчно стабилен на въздух и светлина.

Циперметринът е високо ефективен инсектицид, ефикасен срещу широк кръг паразити. Инсектицидът притежава невротоксично действие върху аксоните на централната и периферната нервна система, посредством взаимодействие с натриевите канали при бозайници и инсекти.

При гръбначните и безгръбначните, циперметрина действа главно върху нервната система. Циперметринът действа едновременно като стомашна отрова и като контактен инсектицид. В периферната нервна система, първоначалното му действие се изразява в предизвикване на видими повтарящи се действия и възникването на нервни импулси в резултат на промяна на йонния пермамбилитет на нервните мембрани. Това дълго и постоянно действие може да причини стотици до хиляди повтарящи се нервни импулси в сетивните органи. Тази повтаряща се активност е в следствие на пиретроидни увреждания на зависимите от напрежението, натриеви канали, които остават отворени, много повече от нормалното време.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

Polysorbate 80	20 g
Polyethylen glycolum PEG 400	70 g

6.2 Несъвместимости

Не смесвайте с други инсектициди.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни.

Срок на годност след разтваряне, в съответствие с инструкциите: след разтваряне на продукта във вода, разтвореното количество да се използва незабавно.

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина
Да се съхранява далече от източници на топлина.
Да се съхранява далеч от храни и напитки.
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Стъклени флакони с гумена тапа и алуминиева капачка с вместимост 10, 20, 50 мл и 100 мл. Пластмасови туби от 1 литър и 5 литра.
Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

„ФАРМА ВЕТ” ООД, гр. Шумен ул.”Отец Паисий” № 40, тел/факс 054/ 801-215

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

№ 0022-1921-07.01.2013

9. ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

07.01.2013

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

26/11/2012

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР