

## PROSPECTO

### 1. Denominación del medicamento veterinario

Telmin Unidia 200 mg Comprimidos para razas medianas y grandes perros

### 2. Composición

Cada comprimido contiene:

#### Principio activo:

Mebendazol ..... 200 mg

#### Excipientes:

Amarillo de quinoleína A-3 (E-104)

Amarillo anaranjado S (E-110)

Aroma de naranja P-10405-31

Comprimido circular plano, color anaranjado y ranurado en una cara.

### 3. Especies de destino

Perros

### 4. Indicaciones de uso

Tratamiento de infecciones causadas por los nematodos gastrointestinales y cestodos siguientes:

#### Nematodos:

Ascarídeos, (formas adultas y larvarias)

*Toxocara canis*

*Toxocara cati*

*Toxascaris leonina*

Tricurídeos, (formas adultas y larvarias)

*Trichuris vulpis*

Ancilostomídeos, (formas adultas)

*Uncinaria stenocephala*

*Ancylostoma caninum*

*Ancylostoma tubaeforme*

#### Cestodos:

*Taenia pisiformis*, (formas adultas y larvarias)

*Taenia hydatigena*, (formas adultas y larvarias)

*Hydatigera taeniaeformis*, (formas adultas y larvarias)

*Echinococcus granulosus*.

## **5. Contraindicaciones**

No usar en caso de hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

## **6. Advertencias especiales**

### Advertencias especiales:

Los parásitos pueden desarrollar resistencia a cualquier clase de antihelmíntico tras el uso frecuente y repetido de un antihelmíntico de la misma clase.

### Precauciones especiales para una utilización segura en las especies de destino:

No procede.

### Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:

Las personas con hipersensibilidad conocida al mebendazol deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.

Lavarse las manos después de usar el medicamento.

### Gestación y lactancia:

Los estudios de laboratorio efectuados en ratas y ratones han demostrado efectos tóxicos para el feto y para la madre.

No utilizar este medicamento veterinario durante los dos primeros tercios de la gestación ya que no se han realizado suficientes estudios en la especie de destino al comienzo de la gestación.

### Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Ninguna conocida.

### Sobredosificación:

Si, por error, se sobredosifica, pueden presentarse síntomas gastrointestinales, reversibles al suspender la medicación.

### Restricciones y condiciones especiales de uso:

Ver 'Advertencias especiales'.

Administración bajo control o supervisión del veterinario

## 7. Acontecimientos adversos

Perros:

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)	Vómitos, diarrea
---	------------------

La notificación de acontecimientos adversos es importante. Permite la vigilancia continua de la seguridad de un medicamento veterinario. Si observa algún efecto secundario, incluso aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, póngase en contacto, en primer lugar, con su veterinario. También puede comunicar los acontecimientos adversos al titular de la autorización de comercialización utilizando los datos de contacto que encontrará al final de este prospecto, o mediante su sistema nacional de notificación:

Tarjeta verde

[https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario\\_tarjeta\\_verde.doc](https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosVeterinarios/docs/formulario_tarjeta_verde.doc)  
o NOTIFICAVET <https://sinaem.aemps.es/FVVET/notificavet/Pages/CCAA.aspx>

## 8. Posología para cada especie, modo y vías de administración

Vía oral

Perros: 20 mg de mebendazol/kg p.v./día. (Equivalente a 1 comprimido/10 kg p.v./día).

Duración del tratamiento:

Nematodosis: 3 días.

Cestodosis: 5 días.

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para garantizar una dosificación correcta.

## 9. Instrucciones para una correcta administración

Administración por vía oral directamente o con una porción de alimento.

El calendario o momento del tratamiento debe basarse en factores epidemiológicos y ser personalizado para cada animal. El programa de tratamiento debe establecerlo el veterinario.

## 10. Tiempos de espera

No procede.

## 11. Precauciones especiales de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en el blíster, caja después de Exp. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

No conservar comprimidos fraccionados.

## **12. Precauciones especiales para la eliminación**

Los medicamentos no deben ser eliminados vertiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos.

Utilice sistemas de retirada de medicamentos veterinarios para la eliminación de cualquier medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados de su uso de conformidad con las normativas locales y con los sistemas nacionales de retirada aplicables. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

Pregunte a su veterinario o farmacéutico cómo debe eliminar los medicamentos que ya no necesita.

## **13. Clasificación de los medicamentos veterinarios**

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

## **14. Números de autorización de comercialización y formatos**

Numero de autorización de comercialización: 687 ESP

### Formatos:

Caja con 1 blíster con 5 comprimidos

Caja con 2 blísteres con 5 comprimidos (10 comprimidos)

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

## **15. Fecha de la última revisión del prospecto**

12/2023

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la base de datos de medicamentos de la Unión (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **16. Datos de contacto**

Titular de la autorización de comercialización y datos de contacto para comunicar las sospechas de acontecimientos adversos:

Ecuphar Veterinaria S.L.U.  
C/Cerdanya, 10-12 Planta 6º  
08173 Sant Cugat del Vallés  
Barcelona, España  
Tel: +34 935 955 000  
E-Mail: info@ecuphar.es



Fabricante responsable de la liberación del lote:

LABIANA PHARMACEUTICALS, S.L.U.  
c/ Casanova, 27-31  
08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)  
España