

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Plastikbox mit 2, 10 oder 20 Durchstechflaschen mit 1 Dosis (2 ml)
Faltschachtel mit 1 Durchstechflasche mit 5 Dosen (10 ml)
Plastikbox mit 5 oder 10 Durchstechflaschen mit 5 Dosen (10 ml)
Faltschachtel mit 1, 12 oder 24 Durchstechflaschen mit 25 Dosen (50 ml)
Faltschachtel mit 1 Durchstechflasche mit 50 Dosen (100 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Fencovis Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (2 ml):

Escherichia. coli, Serotyp O8:K35 (fimbrialadhesin F5) Inaktiviertes

RP* ≥ 1

Bovines Rotavirus, Serotyp G6P1, Stamm TM-91 Inaktiviertes

RP* ≥ 1

Bovines Coronavirus, Stamm C-197 Inaktiviertes

RP* ≥ 1

*Relative Wirksamkeit

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2 x 1 Dosis (2 ml)
10 x 1 Dosis (2 ml)
20 x 1 Dosis (2 ml)
1 x 5 Dosen (10 ml)
5 x 5 Dosen (10 ml)
10 x 5 Dosen (10 ml)
1 x 25 Dosen (50 ml)
12 x 25 Dosen (50 ml)
24 x 25 Dosen (50 ml)
1 x 50 Dosen (100 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trächtige Färsen und Kühe).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp.: { /MM/JJJJ }

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nach dem Öffnen sollten die Durchstechflaschen nicht über 25 °C gelagert werden.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V660434 (Typ-I-Glas-Durchstechflaschen)

BE-V660435 (Typ-II-Glas-Durchstechflaschen)

BE-V660436 (Durchstechflasche HDPE)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**100 ml Durchstechflasche aus Glas oder Plastik (50 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Fencovis Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis. (2 ml):

Escherichia. coli, Serotyp O8:K35 (fimbrialadhesin F5) InaktiviertesRP* ≥ 1

Bovines Rotavirus, Serotyp G6P1, Stamm TM-91 Inaktiviertes

RP* ≥ 1

Bovines Coronavirus, Stamm C-197 Inaktiviertes

RP* ≥ 1 ***Relative Wirksamkeit**

50 Dosen (100 ml)

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (trächtige Färsen und Kühe).

4. ARTEN DER ANWENDUNG**i.m.**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

**Durchstechflasche aus Glas mit 1 Dosis (2 ml),
Durchstechflasche aus Plastik 5 Dosen (10 ml) und 25 Dosen (50 ml)**

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Fencovis

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 d
5 d
25 d

2 ml
10 ml
50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp: {/MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.