

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE**  
CORTIZEME suspenze

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC SA – 1<sup>ère</sup> Avenue – L.I.D. – 2065 m – 06516 – CARROS (France)

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

CORTIZEME kožní suspenze

Neomycini sulfas

Prednisolonum

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 ml bílé homogenní suspenze obsahuje :

**Léčivé látky:**

Neomycini sulfas ..... 5000 IU

Prednisolonum ..... 1 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)..... 0,005 ml

Natrium-hydroxymethansulfínát ..... 1 mg

**4. INDIKACE**

Léčba ekzémů nebo infekčních dermatitid u psů a koček.

**5. KONTRAINDIKACE**

Přecitlivělost vůči kortikoidům.

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Hypersensitivní reakce.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi, kočky

**8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Množství přípravku se aplikuje v závislosti na povrchu lézí, které jsou léčeny. Striktní dávkování při použití lokálních léčiv není doporučeno. Aplikaci opakujte 1-2krát denně po dobu několika dnů až do zřetelného vyléčení lézí.

## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Před aplikací je doporučeno vyholení resp. ostříhání srsti pokrývající postiženou oblast.

## **10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Není určeno pro potravinová zvířata.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 3 měsíce

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Při aplikaci používejte rukavice. Po použití přípravku si umyjte ruce.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

## **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Září 2018

## **15. DALŠÍ INFORMACE**

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Pouze pro zvířata.

Na předpis veterinárního lékaře.