

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Virbactan 150 mg maść dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda strzykawka (3 g) zawiera:
Cefquinom (w postaci siarczanu): 150,0 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Pudełko zawierające 1 saszetkę z 4 strzykawkami i 4 chusteczki do dezynfekcji.
Pudełko zawierające 5 saszetek z 4 strzykawkami i 20 chusteczek do dezynfekcji.
Pudełko zawierające 6 saszetek z 4 strzykawkami i 24 chusteczek do dezynfekcji.
Pudełko zawierające 15 saszetek z 4 strzykawkami i 60 chusteczek do dezynfekcji.
Pudełko zawierające 30 saszetek z 4 strzykawkami i 120 chusteczek do dezynfekcji.

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie dowymieniowe.



7. OKRESY KARENCJI

Tkanki jadalne: 2 dni

Mleko: 1 dzień po wycieleniu, gdy okres zasuszenia jest dłuższy niż 5 tygodni
36 dni, gdy okres zasuszenia wynosi 5 tygodni lub mniej

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

VIRBAC

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

1613/05

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Etykieta saszetki****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Virbactan 150 mg maść dowymieniowa

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda strzykawka (3 g) zawiera:
Cefquinom (w postaci siarczanu): 150,0 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie zasuszenia)

4. DROGI PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Podanie dowymieniowe.

5. OKRESY KARENCJI

Tkanki jadalne: 2 dni

Mleko: 1 dzień po wycieleniu, gdy okres zasuszenia jest dłuższy niż 5 tygodni
36 dni, gdy okres zasuszenia wynosi 5 tygodni lub mniej

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC

9. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

3 g strzykawka

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Virbactan

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

150,0 mg

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}