

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti trichofytóze koní

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRICHOEQUEN inj. sicc. ad us. vet.

Vakcína proti trichofytóze koní

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení na 1 ml:

A) lyofilizát

Léčivá látka:

Trichophyton equinum min. 4 . 10⁶ CFU, max. 16. 10⁶ CFU

Pomocné látky:

Izotonický roztok chloridu sodného, lyofilizační médium

B) Solvens

Zředovač A 1 ml

4. INDIKACE

K profylaxi a terapii trichofytózy koní.

5. KONTRAINDIKACE

Provádění jiných imunopreventivních zákroků v době mezi první a druhou vakcinací až do 20 dnů po druhé (třetí) vakcinaci, nebo aplikovat koním perorální nebo parenterální přípravky s antimykotickými účinky a umísťovat v této době vakcinovaná zvířata mezi koně nakažené trichofytózou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při vysoké fyzické nebo tréninkové zátěži koní v době 1 týdne po vakcinaci a hlavně revakcinaci může dojít k výskytu bolestivých otoků v místě aplikace vakcíny a ke snížení příjmu potravy. Tyto změny po 5 až 7 dnech samovolně vymizí. Ojedinelé může vzniknout celková anafylaktoidní reakce zpravidla do dvou hodin po aplikaci vakcíny. V případě vzniku anafylaktoidních reakcí ihned použít přípravky s antihistaminovým účinkem (adrenalin, kalcium).

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kůň od 4 měsíců stáří.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování

Profylaktické:

- hříbatům od věku čtyř měsíců do dvanácti měsíců: 2 x 2,5 ml

- koně nad dvanáct měsíců věku: 2 x 5 ml

Interval mezi vakcinací a revakcinací je 10 – 16 dnů.

Léčebné:

U hříbat a koní starších než 4 měsíce dvakrát 5 ml s intervalem 10-16 dnů. Při rozsáhlém postižení se doporučuje třetí aplikace vakcíny v léčebné dávce. 10-16 dnů po revakcinaci.

Způsob podání

Intramuskulárně do krční svaloviny nebo do svaloviny zadní končetiny. Vakcinace se doporučuje provádět do levé, revakcinace do pravé poloviny těla.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcínu je nutno spotřebovat do 2 hodin po naředění.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso 14 dní.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po aplikaci vakcíny nevystavujte koně po dobu 1 týdne nadměrné fyzické zátěži. U jezdeckých koní doporučujeme vakcinaci provádět mimo tréninkové a závodní období nebo tyto aktivity dočasně přerušit.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU

Použité lékovky a pomůcky nutno inaktivovat, nesmí zůstat odloženy ve stáji. K inaktivaci je vhodné použít 2 % roztok Ajatinu, 1 % roztok kyseliny peroctové (po dobu 4 hodin) nebo je možné tepelně inaktivovat (100 °C, 2 hodiny).

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

únor 2007

15. DALŠÍ INFORMACE

Léková forma

Injekce suchá (lyofilizovaná).

Léková forma určená k podání - injekční roztok pro parenterální použití, který vznikne naředěním lyofilizátu v přiloženém Zřed'ovači A.

Interakce

Nedoporučuje se současně s vakcinací provádět perorální nebo parenterální ošetření antimykotickými přípravky.

Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku

Veterinární imunopreparát

U imunizovaných zvířat vzniká imunita celulárního a částečně i humorálního typu. Imunita vzniká do 1 měsíce po revakcinaci a trvá minimálně 1 rok.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení

1 x 5 ml, 5 x 5 ml, 1 x 25 ml, 1 x 50 ml