

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/09/0024
Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A.
1^{ère} avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros Cedex
Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām
Oxytetracyclinum dihydricum

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Aktīvā viela:

1 ml šķīduma satur:
Oksitetraciklīnu (dihidrāta veidā) 200 mg

Palīgvielas:

Nātrija formaldehīda sulfoksilāts, dinātrija edetāts, vieglais magnija oksīds, povidons K17, N-metilpirolidons, etanolamīns, ūdens injekcijām.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu, piemēram, grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju, dažu mikoplazmu sugu, riketsiju, vienšūņu vai hlamīdiju, izraisītu vai ar tiem saistītu slimību ārstēšanai un profilaksei.

Liellopiem: pastereļozes, pret oksitetraciklīnu jutīgu baktēriju izraisītas pneimonijas ārstēšanai, aktinobaciloze, anaplazmoze, teļu difterija, pododermatīts, abscesi, inficētas brūces, infekciju profilaksei pēc ķirurģiskām operācijām vai pēc dzemdībām, atbalstošā terapija mastītu gadījumā.

Cūkām: pret oksitetraciklīnu jutīgu baktēriju izraisītas pneimonijas ārstēšanai, pastereļozes profilaksei un ārstēšanai, pret oksitetraciklīnu jutīgu ierosinātāju izraisīta MMA sindroma profilaksei, sarkanguļa, mastīts, nagu/locītavu slimības, abscesi, inficētas brūces, infekciju profilaksei pēc ķirurģiskām operācijām vai pēc dzemdībām.

Aitām, kazām: pret oksitetraciklīnu jutīgu ierosinātāju izraisīta pneimonija un enzootiskie aborti, nagu puve, mastīts, metrits, nagu/locītavu slimības, abscesi, inficētas brūces, infekciju profilaksei pēc ķirurģiskām operācijām vai pēc dzemdībām, ērcu izraisīta drudža un piēmijas īslaicīgai profilaksei jēriem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot, ja konstatēta rezistence pret tetraciklīnu.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Var novērot lokālas nepanesības reakcijas — no sāpēm injekcijas vietā līdz audu bojājumiem muskuļu nekrozes dēļ.

Līdzīgas nevēlamās blakusparādības ir novērotas pret visiem tetraciklīniem: gremošanas traucējumi, retāk — alerģiskas reakcijas un paaugstināta jutība pret gaismu.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, kazas un cūkas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Liellopiem, cūkām, kazām un aitām *Terralon LA* ievada intramuskulāri vienreizējas devas veidā pa 1 ml/ 10 kg ķermeņa svara vai 20 mg/kg ķermeņa svara.

Sivēniem ar ķermeņa svaru līdz 2 kg: 0,5ml subkutāni.

Parasti ar vienreizēju devu pietiek, lai ārstētu pret oksitetraciklīnu jutīgu mikroorganismu izraisītas infekcijas.

Smagos gadījumos otrā injekcija var būt nepieciešama 3-5 dienas pēc pirmās injekcijas.

LIELLOPI: intramuskulārā injekcija jāveic dziļi muskulī. Jālieto dzīvnieka lielumam atbilstoša adata. Lai izvairītos no lokālām reakcijām injekcijas vietā, vēlams paredzēto devu sadalīt un ievadīt divās injekcijas vietās.

CŪKAS: cūkām ar ķermeņa svaru līdz 10 kg jāievada 1 ml. Lai izvairītos no audu kairinājuma un sāpju reakcijas, ievadīt subkutāni aizauss apvidū. Cūkām, kas sver vairāk par 10 kg, jāievada 1 ml/10 kg ķermeņa svara intramuskulāri vienā vietā.

Cūkām, kas sver vairāk par 100 kg, ieteicams paredzēto devu sadalīt un injekciju veikt divās dažādās vietās.

Atrofiskā rinīta profilaksei sivēniem trešajā dzīvības dienā ievadīt 0,5 ml, bet 12. un 21. dienā – 1 ml.

KAZAS un AITAS: ievada 1 ml/ 10 kg ķermeņa svara intramuskulāri. Dzīvniekiem, kas sver vairāk par 50 kg, zāles ieteicams ievadīt divās dažādās vietās.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skatīt 8. punktu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 21 diena.

Pienam: 7 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Personām ar pastiprinātu jutību pret tetraciklīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja pēc saskares ar preparātu rodas atbilstīga reakcija (piem., izsitumi) konsultējieties ar ārstu.

Laboratorijas apstākļos veiktās pārbaudēs oksitetraciklīnam nav konstatēta nekāda embriotoksiska vai teratogēna iedarbība uz dzīvniekiem.

Zīdītāju organismā oksitetraciklīns penetrē placentāro barjeru, izraisa zobu krāsas izmaiņas un palēnina embrija augšanu.

Attiecībā uz produkta lietošanu grūsnēm dzīvniekiem veterinārārstam jānovērtē ieguvuma un riska attiecība.

Div- vai trīsvērtīgie katjoni (Mg, Fe, Al, Ca) kombinācijā ar tetraciklīniem var veidot helātus.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2014

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.