PRILOGA III

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

100 ml ali 250 ml kartonska škatla ali 1000 ml plastenka (stična ovojnina)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Baycox Multi 50 mg/ml peroralna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje 50 mg toltrazurila.

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml
250 ml
1000 ml

4. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo (teleta mlečnih pasem, sesna teleta mesnih pasem, bikci mesnih pasem), prašiči (pujski, stari 3–5 dni), ovce (jagnjeta).

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Peroralna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo:
Meso in organi: 63 dni.
Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:
Meso in organi: 77 dni.

Ovce:
Meso in organi: 42 dni.
Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}
Odprto zdravilo uporabite do …
Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco logo

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0029/004

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml ali 250 ml plastenka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Baycox Multi 50 mg/ml peroralna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje 50 mg toltrazurila.

3. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo (teleta mlečnih pasem, sesna teleta mesnih pasem, bikci mesnih pasem), prašiči (pujski, stari 3–5 dni), ovce (jagnjeta).

4. POTI UPORABE

Peroralna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:
Meso in organi: 63 dni.
Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:
Meso in organi: 77 dni.

Ovce:
Meso in organi: 42 dni.
Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite do ...
Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco logo

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}