

**ANEXA I**

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI**

## 1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Purevax RCP liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă.

## 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Pentru o doză de 1 ml sau 0,5 ml:

### Substanțe active:

Herpesvirus atenuat al rinotraheitei feline (tulpina FHV F2) .....  $\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub><sup>1</sup>

Antigene inactivate ale calicivirozei feline (tulpinile FCV 431 și FCV G1) .....  $\geq 2,0$  ELISA U.

Virus atenuat al panleucopeniei feline (PLI IV) .....  $\geq 10^{3,5}$  DICC<sub>50</sub><sup>1</sup>

<sup>1</sup> doză infectantă pe culturi celulare 50%

### Excipienți:

| Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți | Compoziția cantitativă, dacă această informație este esențială pentru administrarea corectă a produsului medicinal veterinar |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Liofilizat:</b>                                            |                                                                                                                              |
| Sucroză                                                       |                                                                                                                              |
| Sorbitol                                                      |                                                                                                                              |
| Dextran 40                                                    |                                                                                                                              |
| Caseină hidrolizată                                           |                                                                                                                              |
| Colagen hidrolizat                                            |                                                                                                                              |
| Fosfat dipotasium                                             |                                                                                                                              |
| Dihidrogenofosfat de potasiu                                  |                                                                                                                              |
| Hidroxid de potasiu                                           |                                                                                                                              |
| Apă pentru preparate injectabile                              |                                                                                                                              |
| <b>Solvent:</b>                                               |                                                                                                                              |
| Apă pentru preparate injectabile                              | q.s. 1 ml sau 0,5 ml                                                                                                         |

Liofilizat: peletă friabilă, omogenă, de culoare bej până la alb.

Solvent: lichid incolor limpede.

## 3. ÎNFORMAȚII CLINICE

### 3.1 Specii țintă

Pisici.

### 3.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Imunizarea activă a pisicilor în vârstă de 8 săptămâni și mai mari:

- împotriva rinotraheitei virale feline pentru reducerea semnelor clinice,
- împotriva infecției cu calicivirus pentru reducerea semnelor clinice,
- împotriva panleucopeniei feline pentru prevenirea mortalității și a semnelor clinice.

Instalarea imunității: 1 săptămână după prima vaccinare.

Durata imunității: 1 an după prima vaccinare și 3 ani după ultima revaccinare.

### 3.3 Contraindicații

Nu există.

### 3.4 Atenționări speciale

Vaccinați doar animalele sănătoase.

### 3.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare a în siguranță la speciile țintă:

Nu este cazul.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de auto-injecție accidentală solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul sau eticheta produsului.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Nu este cazul.

### 3.6 Evenimente adverse

Pisici:

|                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frecvente<br>(1 până la 10 animale / 100 de animale tratate):                         | Apatie, anorexie, hipertermie <sup>1</sup> .<br>Reacție la locul injectiei (durere, prurit, edem) <sup>2</sup> . |
| Mai puțin frecvente<br>(1 până la 10 de animale / 1 000 de animale tratate):          | Reacție de hipersensibilitate <sup>3</sup> .                                                                     |
| Foarte rare<br>(<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate): | Emeză <sup>4</sup> .                                                                                             |

<sup>1</sup> durează de obicei 1 sau 2 zile.

<sup>2</sup> durere ușoară la palpare, prurit sau edem limitat dispare în cel mult 1 sau 2 săptămâni.

<sup>3</sup> poate necesita tratament simptomatic adecvat.

<sup>4</sup> cu precădere în decurs de 24 până la 48 de ore.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței produsului medicinal veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului autorizației de comercializare sau reprezentantului local al acestuia, fie autorității naționale competente prin sistemul național de raportare. Consultați prospectul pentru datele de contact respective.

### **3.7 Utilizare în perioada de gestație și lactație**

Nu se administrează pe tot timpul perioadei de gestație și lactație.

### **3.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune**

Există informații disponibile referitoare la siguranță și eficacitate care demonstrează că acest vaccin poate fi mixat și administrat cu vaccinul non-adjuvant împotriva leucemiei feline al firmei Boehringer Ingelheim și/sau administrat în aceeași zi dar nu combinat cu vaccinul cu adjuvant împotriva rabiei al firmei Boehringer Ingelheim.

Sunt disponibile date referitoare la siguranță și eficacitate care demonstrează că acest vaccin poate fi mixat și administrat cu vaccinul non-adjuvant împotriva rabiei, al firmei Boehringer Ingelheim.

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar cu excepția produselor menționate mai sus. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

### **3.9 Cantități de administrat și calea de administrare**

Administrare subcutanată.

A se reconstitui cu grijă vaccinul astfel încât să se obțină o suspensie uniformă cu cât mai puțină spumă. Aspectul vizual după reconstituire: suspensie limpede gălbuie.

După reconstituirea liofilizatului cu 0,5 ml sau 1 ml de solvent (în funcție de prezentarea aleasă), se injectează o doză de 1 ml sau 0,5 ml de vaccin (în funcție de prezentarea aleasă) conform următoarei scheme de vaccinare:

Prima vaccinare:

- prima injecție: începând cu vârsta de 8 săptămâni,
- a 2-a injecție: 3-4 săptămâni mai târziu.

În cazurile în care se presupune existența unui nivel ridicat de anticorpi maternali împotriva componentelor rinotraheitei, calicivirozei sau panleucopeniei (de ex. la pisoi în vârstă de 9 până la 12 săptămâni, născuți din pisici care au fost vaccinate înaintea gestației și/sau expuse sau suspecte de expunere anterioară la patogen(i)), prima vaccinare ar trebui amânată până la vârsta de 12 săptămâni.

Revaccinarea:

- prima revaccinare trebuie să se efectueze după un an de la prima vaccinare,
- următoarele revaccinări: la intervale de până la 3 ani.

### **3.10 Simptome de supradozaj (și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi)**

Nu au fost observate alte evenimente adverse decât cele deja menționate la secțiunea 3.6 „Evenimente adverse”, cu excepția hipertermiei care poate dura, în cazuri excepționale, până la 5 zile.

### **3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea produselor medicinale veterinare antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței**

Nu este cazul.

### **3.12 Perioade de de așteptare**

Nu este cazul.

## **4. INFORMAȚII IMUNOLOGICE**

### **4.1 Codul ATCvet: QI06AH09**

Vaccin împotriva rinotraheitei virale feline, calicivirozei feline și panleucopeniei feline.  
Stimulează imunitatea activă împotriva herpesvirusului rinotraheitei feline, calicivirusului felin, și virusului panleucopeniei feline.

S-a demonstrat că produsul reduce excreția calicivirusului felin la instalarea imunității și timp de un an după vaccinare.

## **5. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE**

### **5.1 Incompatibilități majore**

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar, cu excepția solventului furnizat pentru utilizarea cu acest produs medicinal veterinar și cu excepția celor menționate în secțiunea 3.8 de mai sus.

### **5.2 Termen de valabilitate**

Termenul de valabilitate a produsului așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni  
Termenul de valabilitate după reconstituirea conform indicațiilor: a se utiliza imediat.

### **5.3 Precauții speciale pentru depozitare**

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C – 8 °C).  
A se feri de lumină.  
A nu se congela.

### **5.4 Natura și compoziția ambalajului primar**

Flacon din sticlă tip I care conține 1 doză liofilizat și un flacon din sticlă tip I care conține 1 ml sau 0,5 ml solvent, amândouă închise ermetic cu butil elastomer și sigilate cu dop de aluminiu sau de plastic.

Cutie de plastic cu 10 flacoane cu 1 doză liofilizat și 10 flacoane cu 1 ml solvent.  
Cutie de plastic cu 50 flacoane cu 1 doză liofilizat și 50 flacoane cu 1 ml solvent.  
Cutie de plastic cu 10 flacoane cu 1 doză liofilizat și 10 flacoane cu 0,5 ml solvent.  
Cutie de plastic cu 50 flacoane cu 1 doză liofilizat și 50 flacoane cu 0,5 ml solvent.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

### **5.5 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

**6. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**7. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

EU/2/04/052/001-004

**8. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI**

Data primei autorizări: 23/02/2005

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR  
PRODUSULUI**

LL/AAAA

**10. CLASIFICAREA PRODUSELOR MEDICINALE VETERINARE**

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în baza de date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

## **ANEXA II**

### **ALTE CONDIȚII ȘI CERINȚE ALE AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Nu există.

**ANEXA III**  
**ETICHETAREA ȘI PROSPECTUL**



## **A. ETICHETAREA**

**INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie de plastic pentru 10 flacoane de liofilizat și 10 flacoane de solvent

Cutie de plastic pentru 50 de flacoane de liofilizat și 50 flacoane de solvent

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Purevax RCP liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă

**2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE**

Pentru o doză de 0,5 ml sau 1 ml:

FHV (tulpina F2)

$\geq 10^{4,9}$  DICC<sub>50</sub>

FCV (tulpinile 431 și G1)

$\geq 2,0$  ELISA U.

FPV (PLI IV)

$\geq 10^{3,5}$  DICC<sub>50</sub>

**3. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI**

Liofilizat (10 x 1 doză) + solvent (10 x 1 ml)

Liofilizat (50 x 1 doză) + solvent (50 x 1 ml)

Liofilizat (10 x 1 doză) + solvent (10 x 0,5 ml)

Liofilizat (50 x 1 doză) + solvent (50 x 0,5 ml)

**4. SPECII ȚINTĂ**

Pisici.

**5. INDICAȚII****6. CĂI DE ADMINISTRARE**

Administrare subcutanată.

**7. PERIOADE DE AȘTEPTARE****8. DATA EXPIRĂRII**

Exp. {zz/ll/aaaa}

După reconstituire se va utiliza imediat.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE**

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare.

A se feri de lumină.

A nu se congela.

**10. MENȚIUNEA „A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE”**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**11. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”**

Numai pentru uz veterinar.

**12. MENȚIUNEA „A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR”**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**13. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE**

EU/2/04/052/001 Liofilizat (10 x 1 doză) + solvent (10 x 1 ml)

EU/2/04/052/002 Liofilizat (50 x 1 doză) + solvent (50 x 1 ml)

EU/2/04/051/003 Liofilizat (10 x 1 doză) + solvent (10 x 0,5 ml)

EU/2/04/051/004 Liofilizat (50 x 1 doză) + solvent (50 x 0,5 ml)

**15. NUMĂRUL SERIEI**

Lot {număr}

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

**Flacon cu liofilizat**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Purevax RCP



**2. INFORMAȚII CANTITATIVE PRIVIND SUBSTANȚELE ACTIVE**

1 doză

0,5 ml sau 1 ml

**3. NUMĂRUL SERIEI**

Lot {număr}

**4. DATA EXPIRĂRII**

Exp. {zz/ll/aaaa}

**INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR**

**Flacon cu solvent**

**1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Purevax RCP solvent



**2. INFORMAȚII CANTITATIVE PRIVIND SUBSTANȚELE ACTIVE**

0,5 ml sau 1 ml

**3. NUMĂRUL SERIEI**

Lot {număr}

**4. DATA EXPIRĂRII**

Exp. {zz/ll/aaaa}

## **B. PROSPECTUL**

## PROSPECT

### 1. Denumirea produsului medicinal veterinar

Purevax RCP liofilizat și solvent pentru suspensie injectabilă.

### 2. Compoziție

Pentru o doză de 1 ml sau de 0,5 ml:

#### Substanțe active:

##### Liofilizat:

|                                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Herpesvirus atenuat al rinotraheitei feline (tulpina FHV F2)               | $\geq 10^{4,9}$ DICC <sub>50</sub> <sup>1</sup> |
| Antigene inactivate ale calicivirozei feline (tulpinile FCV 431 și FCV G1) | $\geq 2,0$ ELISA U.                             |
| Virus atenuat al panleucopeniei feline (PLI IV)                            | $\geq 10^{3,5}$ DICC <sub>50</sub> <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> doză infectantă pe culturi celulare 50%

##### Solvent:

Apă pentru preparate injectabile q.s. 1 ml sau 0,5 ml

Liofilizat: peletă friabilă, omogenă, de culoare bej până la alb.  
Solvent: lichid incolor limpede.

### 3. Specii țintă

Pisici.

### 4. Indicații de utilizare

Imunizarea activă a pisicilor în vârstă de 8 săptămâni și mai mari:

- împotriva rinotraheitei virale feline pentru reducerea semnelor clinice,
- împotriva infecției cu calicivirus pentru reducerea semnelor clinice,
- împotriva panleucopeniei feline pentru prevenirea mortalității și a semnelor clinice.

Instalarea imunității: 1 săptămână după prima vaccinare.

Durata imunității: 1 an de la prima vaccinare și 3 ani după ultima revaccinare.

### 5. Contraindicații

Nu există.

### 6. Atenționări speciale

Vaccinați doar animalele sănătoase.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

În caz de autoinjectare accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul produsului sau eticheta.

#### Gestație și lactație:

Nu se utilizează pe parcursul întregii perioade de gestație și de lactație.

#### Interacțiuni cu alte produse medicinale și alte forme de interacțiune:

Sunt disponibile date privind siguranța și eficacitatea care demonstrează că acest vaccin poate fi mixat și administrat împreună cu vaccinul non adjuvant împotriva leucemiei feline al firmei Boehringer Ingelheim și/sau administrat în aceeași zi dar nu amestecat cu vaccinul cu adjuvant împotriva rabiei, al firmei Boehringer Ingelheim

Sunt disponibile date referitoare la siguranță și eficacitate care demonstrează că acest vaccin poate fi mixat și administrat împreună cu vaccinul non-adjuvant împotriva rabiei al firmei Boehringer Ingelheim.

Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar cu excepția produselor menționate mai sus. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după alte produse medicinale veterinare va fi stabilită de la caz la caz.

#### Supradozare:

Nu au fost observate alte evenimente adverse decât cele deja menționate la secțiunea „Evenimente adverse”, cu excepția hipertemiei care poate dura, în cazuri excepționale, până la 5 zile.

#### Incompatibilități majore:

A nu se amesteca cu niciun alt produs medicinal veterinar, cu excepția solventului furnizat pentru utilizarea cu acest produs medicinal veterinar și cu excepția celor menționate mai sus.

### **7. Evenimente adverse**

Pisici:

#### **Frecvente (1 până la 10 animale / 100 de animale tratate):**

Apatie, anorexie, hipertermie<sup>1</sup>.

Reacții la locul injecției (durere, prurit, edem)<sup>2</sup>.

#### **Mai puțin frecvente (1 până la 10 de animale / 1 000 de animale tratate):**

Reacție de hipersensibilitate<sup>3</sup>.

#### **Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate):**

Emeză<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> durează de obicei 1 sau 2 zile.

<sup>2</sup> durere ușoară la palpare, prurit sau edem limitat dispar în cel mult 1 sau 2 săptămâni.

<sup>3</sup> poate necesita tratament simptomatic adecvat.

<sup>4</sup> cu precădere în decurs de 24 până la 48 de ore.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: {detalii sistem național}.

### **8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare**

Administrare subcutanată.

După reconstituirea liofilizatului cu 0,5 ml sau 1 ml de solvent (în funcție de prezentarea aleasă), se injectează o doză de vaccin conform următoarei scheme de vaccinare:



Prima vaccinare:

- prima injecție: începând cu vârsta de 8 săptămâni,
- a 2-a injecție: 3-4 săptămâni mai târziu.

În cazurile în care se presupune existența unui nivel ridicat de anticorpi maternali împotriva componentelor rinotraheitei, calicivirozei sau panleucopeniei (de ex. la pisoi în vârstă de 9 până la 12 săptămâni, născuți din pisici care au fost vaccinate înaintea gestației și/sau expuse sau suspecte de expunere anterioară la patogen(i)), prima vaccinare ar trebui amânată până la vârsta de 12 săptămâni.

Revaccinarea:

- prima revaccinare trebuie să se efectueze după un an de la prima vaccinare,
- următoarele revaccinări: la intervale de până la 3 ani împotriva.

## **9. Recomandări privind administrarea corectă**

A se reconstitui cu grijă vaccinul astfel încât să se obțină o suspensie uniformă cu cât mai puțină spumă. Aspectul vizual după reconstituire: suspensie limpede gălbuie.

## **10. Perioade de așteptare**

Nu este cazul.

## **11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C – 8 °C).

A se feri de lumină.

A nu se congela.

A nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe cutie și pe flacon după Exp. Termenul de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: a se utiliza imediat.

## **12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile produsului medicinal veterinar respectiv.

Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protejarea mediului.

## **13. Clasificarea produselor medicinale veterinare**

Produs medicinal veterinar care se eliberează cu prescripție.

## **14. Numerele autorizațiilor de comercializare și dimensiunile ambalajelor**

EU/2/04/052/001-004

Cutie de plastic care conține:

10 x 1 doză de liofilizat și 10 x 1 ml de solvent sau

50 x 1 doză de liofilizat și 50 x 1 ml de solvent sau  
10 x 1 doză de liofilizat și 10 x 0,5 ml de solvent sau  
50 x 1 doză de liofilizat și 50 x 0,5 ml de solvent.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

#### **15. Data ultimei revizuirii a prospectului**

{LL/AAAA}

Informații detaliate privind acest produs medicinal veterinar sunt disponibile în baza de date a Uniunii privind produsele (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

#### **16. Date de contact**

Deținătorul autorizației de comercializare:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Germania

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS  
Laboratoire Porte des Alpes  
Rue de l'Aviation  
69800 Saint-Priest  
Franța

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

##### **België/Belgique/Belgien**

Boehringer Ingelheim Animal  
Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

##### **Lietuva**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Lietuvos filialas  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Vīne, Austrija  
Tel: +370 5 2595942

##### **Република България**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Виена, Австрия  
Tel: +359 2 958 79 98

##### **Luxembourg/Luxemburg**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,  
1050 Bruxelles/Brussel/Brüssel  
Tél/Tel: + 32 2 773 34 56

##### **Česká republika**

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.  
Purkyňova 2121/3  
CZ - 110 00, Praha 1  
Tel: +420 234 655 111

##### **Magyarország**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Magyarországi Fióktelep  
Lechner Ö. Fasor 10.  
H-1095 Budapest  
Tel: +36 1 299 8900

**Danmark**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics  
A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: + 45 3915 8888

**Deutschland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
55216 Ingelheim/Rhein  
Tel: 0800 290 0 270

**Eesti**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Eesti filiaal  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viin, Austria  
Tel: +372 612 8000

**Ελλάδα**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

**España**

Boehringer Ingelheim Animal Health España,  
S.A.U.  
Prat de la Riba, 50  
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  
Tel: +34 93 404 51 00

**France**

Boehringer Ingelheim Animal Health France,  
SCS  
29, avenue Tony Garnier  
69007 Lyon  
Tél : +33 4 72 72 30 00

**Hrvatska**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Beč, Austrija  
Tel: +385 1 2444 600

**Ireland**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

**Malta**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, il-Ġermanja  
Tel: +353 1 291 3985

**Nederland**

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Netherlands bv  
Basisweg 10  
1043 AP Amsterdam  
Tel: +31 20 799 6950

**Norge**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tlf: +47 66 85 05 70

**Österreich**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Wien  
Tel: +43 1 80105-6880

**Polska**

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
Tel.: + 48 22 699 0 699

**Portugal**

Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal,  
Unipessoal, Lda.  
Avenida de Pádua, 11  
1800-294 Lisboa  
Tel: +351 21 313 5300

**România**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Sucursala București  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viena, Austria  
Tel: +40 21 302 28 00

**Slovenija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Podružnica Ljubljana  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Dunaj, Avstrija  
Tel: +386 1 586 40 00

**Ísland**

Vistor  
Hörgatún 2  
210 Garðabær  
Sími: + 354 535 7000

**Italia**

Boehringer Ingelheim Animal Health  
Italia S.p.A.  
Via Vezza d'Oglio, 3  
20139 Milano  
Tel: +39 02 53551

**Κύπρος**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Γερμανία  
Τηλ: +30 2108906300

**Latvija**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  
Latvijas filiāle  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viena, Austrija  
Tel: +371 67 240 011

**Slovenská republika**

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.  
Dr. Boehringer Gasse 5-11  
A-1121 Viedeň, Rakúsko  
Tel: +421 2 5810 1211

**Suomi/Finland**

Vetcare Oy  
PL/PB 99  
24101 Salo  
Puh/Tel: + 358 201443360

**Sverige**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S  
Weidekampsgade 14  
DK-2300 København S  
Tel: +46 (0)40-23 34 00

**United Kingdom (Northern Ireland)**

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH  
D-55216 Ingelheim/Rhein, Germany  
Tel: +353 1 291 3985

**17. Alte informații**

S-a demonstrat că produsul reduce excreția calicivirusului felin la instalarea imunității și timp de un an după vaccinare.