

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Dexacortin 2 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

deksametazon (v obliki natrijevega deksametazonfosfata): 2,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intravenska, intramuskularna ali subkutana uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 8 dni

Mleko: 72 ur

Prašiči: Meso in organi: 2 dneva

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0086/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**VIALA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Dexacortin 2 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina:

deksametazon (v obliki natrijevega deksametazonfosfata): 2,0 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke

4. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo: Meso in organi: 8 dni

Mleko: 72 ur

Prašiči: Meso in organi: 2 dneva

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Intervet International B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}