

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE LUB PLASTIKOWE

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

KOLIBIN RC NEO roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dawka (2 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Rotawirus bydlęcy inaktywowany, szczep TM-91 nie mniej niż 1 RP *
Koronawirus bydlęcy inaktywowany, szczep C-197 nie mniej niż 1 RP *
3 inaktywowane enteropatogenne szczepy *E. coli*,
serowary: O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99 nie mniej niż 1 RP *

*)RP – względna moc oznaczona metodą ELISA

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Plastikowe pudełko z wytłoczonym wieczkiem: 2 x 2 ml, 10 x 2 ml, 5 x 10 ml, 10 x 10 ml, 20 x 2 ml, 5 x 4 ml, 10 x 4 ml

Tekturowe pudełko: 1 x 4 ml, 1 x 10 ml, 1 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Tekturowe pudełko z wewnętrznymi przegródkami: 5 x 20 ml, 10 x 20 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (ciężarne jałówki i krowy)



5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 godzin.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Chronić przed światłem.

Przechowywać w suchym miejscu.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Grabikowski-Grabikowska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INEX” Spółka Jawna

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

1681/06

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOŁKI SZKLANE LUB PLASTIKOWE 100 ml, 250 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

KOLIBIN RC NEO roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dawka (2 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Rotawirus bydlęcy inaktywowany, szczep TM-91	nie mniej niż 1 RP *
Koronawirus bydlęcy inaktywowany, szczep C-197	nie mniej niż 1 RP *
3 inaktywowane enteropatogenne szczepy <i>E. coli</i> , serowary: O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99	nie mniej niż 1 RP *

*)RP – względna moc oznaczona metodą ELISA

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (ciężarne jałówki i krowy)



4. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 godzin.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Chronić przed światłem.

Przechowywać w suchym miejscu.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Grabikowski-Grabikowska
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „INEX” Spółka Jawna

9. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

FIOLKI PLASTIKOWE 10 ml

FIOLKI SZKLANE 3 ml, 7 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

KOLIBIN RC NEO



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dawka (2 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Rotawirus bydlęcy inaktywowany, szczep TM-91	nie mniej niż 1 RP *
Koronawirus bydlęcy inaktywowany, szczep C-197	nie mniej niż 1 RP *
3 inaktywowane enteropatogenne szczepy <i>E. coli</i> , serowary: O8:K35, K99; O9:K35, K99; O101:K30, K99	nie mniej niż 1 RP *

*)RP – względna moc oznaczona metodą ELISA

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 10 godzin.