

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Ectomax SPOT ON 744 mg/ml rácsepegtető oldat kutyáknak A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Fortevit Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Primavet Produkt Állatgyógyászati Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1108 Budapest, Gumigyár u 5-7.)

Forgalmazó:

Tolnagro Kft. (7100, Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Ectomax SPOT ON 744 mg/ml rácsepegtető oldat kutyáknak A.U.V.

Permetrin (cisz:transz 25:75)

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:

Permetrin (cisz:transz 25:75): 744 mg/ml

4. JAVALLAT(OK)

A permetrinre érzékeny ektoparaziták által okozott fertőzések ellen alkalmazható:

Bolhák (*Ctenocephalides felis*), valamint kullancsok (*Ixodes ricinus* és *Rhipicephalus sanguineus*) elpusztítására. A bolhák elleni inszekticid hatás 4 hétig tart. Kullancsok ellen a termék 4 hétig tartó folyamatos atkaölő hatással rendelkezik.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható három hónaposnál fiatalabb kutyákon.

Nem alkalmazható 2 kg alatti testtömegű kutyákon.

Nem alkalmazható beteg, lábadozó, illetve bőrsérüléssel rendelkező állaton.

A KÉSZÍTMÉNY NEM ALKALMAS MACSKA KEZELÉSÉRE. Rendkívül mérgező macskára, használata az állat elpusztulását is okozhatja. Meg kell akadályozni, hogy a macska közvetlen érintkezésbe kerüljön a termékkel, ezért a kutyákat kezelés után 72 óráig távol kell tartani a macskáktól. Véletlen érintkezés esetén azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy a segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Néhány esetben a készítmény a kezelés helyén enyhe, körülírt irritációt válthat ki, amely 48 órán belül elmúlik. A kezelés helyén átmenetileg alopecia előfordulhat.

Átmeneti túlérzékenység, illetve vakaródzás előfordulása lehetséges a kezelés utáni bőrfelületen.

Ritka esetben a központi idegrendszer akut intoxikációja, valamint a gyomor-, bélsatorna rendellenességeire utaló tünetek előfordulhatnak.

Ha bármilyen mellékhatást észlel, még ha az nem is szerepel ebben a használati utasításban, vagy úgy gondolja, hogy a készítmény nem hatott, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kutya

8-9 ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT, A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Kizárólag külsőleges használatra!

Rácsepegtetési alkalmazásra.

2-15 kg közötti testtömegű kutyák részére:

Az állat hátán a lapockák közötti területen hajtogassuk szét a szőrzetet, úgy hogy a bőr jól láthatóvá váljon. A tubus kupakjának lecsavarása után a tubus megnyomásával juttassunk 1 ml készítményt közvetlenül a bőrre. A szőrzetre csepegtetés kerülendő. A készítménynek az ujjakkal való érintkezése kerülendő.

15 kg feletti testtömegű kutyák részére:

Az állat hátán a lapockák közötti területen hajtogassuk szét a szőrzetet, úgy hogy a bőr jól láthatóvá váljon. A tubus megnyomásával juttassunk 1 ml készítményt közvetlenül a bőrre. A szőrzetre csepegtetés kerülendő. A készítménynek az ujjakkal való érintkezése kerülendő. Az előbbihez hasonló módon csepegtessünk 1 ml készítményt a fartő feletti bőrfelületre.

Egyetlen kezelés 28 napos védelmet nyújt bolhák és kullancsok ellen, azonban ha a kutya megázik, vagy megfürdetik, ez az idő lerövidülhet. A kezelés 14 nap múlva biztonsággal megismételhető.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25 °C alatt tárolandó. Fénytől védve tartandó. Hűtőben nem tárolható.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a tubuson és a címkén feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

Kezelést követően az állatokat nem szabad természetes vízben úszni hagyni, mert a készítmény mérgező lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

A kezelt állat gyakori úsztatását, fürdetését, valamint samponozását kerülni kell, mert mindez csökkentheti a készítmény hatékonyságát. Egy házban több kutya tartása esetén minden állat egyidejű kezelése szükséges. Ezekben a házakban élő macskákat azonos javallatra, macskákra engedélyezett készítménnyel kell kezelni.

Az állatokról származó bolhák gyakran elszaporodnak az állatok kosarában, fekvő-, és pihenőhelyén, a padlón és a kárpitokon. Ezeket a helyeket megfelelő rovarirtó szerrel kell kezelni és rendszeresen porszívózni kell. Meg kell akadályozni, hogy a kutyák a kezelés helyét nyalogassák. A kutyákat az esti órákban ajánlott kezelni.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

A készítmény első használata során az állat bőrének kezelt területén átmenetileg zsiros folt jelenhet meg. Világos szőrzetű kutyánál ez a folt sárgás színben jelenhet meg. Ha a tünetek folyamatosan fennállnak, vagy nem múlnak el, állatorvosi segítséget kell igénybe venni.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

Véletlen bőrre kerülés esetén az érintett bőrfelületet meleg szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Emberekben a permetrin érintése egy-két órás lappangási idő után fonákérzést, úgynevezett paresztéziát válthat ki. A készítmény használata során védőkesztyűt kell viselni. A készítmény többszöri használata esetén, pl. kutyatenyésztőknél, a 0,3 mm vastag neoprén, vagy nitril anyagból készült kesztyűt kell viselni. A kezelt bőrfelületet a kezelés után 3-6 órán át nem szabad megérinteni.

A termék nyálkahártya- és szemirritációt okozhat. Ezért el kell kerülni a terméknek a szembe, illetve szájba jutását. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Tartós bőrizgató hatás és/vagy szemizgató hatás esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét. Szintetikus piretroidok iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.

A kezelés alatt enni, inni, dohányozni tilos. Kezelés után meleg szappanos vízzel kezdet kell mosni.

A készítménnyel kezelt állatokat nem szabad nyílt láng közelébe engedni a kezelt bőrfelület megszáradásáig.

Vemhesség, laktáció:

Patkányon végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei a készítmény főtotoxicitását mutatták ki. Vemhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

A javasolt dózis kétszerese nem okozott mellékhatásokat felnőtt kutyáknál. A túladagolás klinikai tünetei jellemzőek a szintetikus piretroidok által okozott mérgezésekre. Ezek a túlzott mértékű nyálzás, hasmenés, izomremegés, és túlérzékenység. Súlyosabb esetben hipotermia, hipertermia, diszpnöe és rángatózás léphet fel. Ha a túladagolás tünetei

jelentkeznek, a kutyát antiparazitikumtól mentes samponnal kell megfürdetni, majd tüneti kezelés javasolt. A piretroidok által okozott mérgezésnek nincs specifikus antidotuma.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az Ectomax SPOT ON 744 mg/ml rácsepegtető oldat kutyáknak A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe valamint a csatornába, mert nagyon mérgező a halakra és más vízi élőlényekre. Mérgező a méhekre.

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. június 14.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség, forgalmazhatóság

Vény nélkül kiadható állatgyógyászati készítmény.

Szabadon forgalmazható.

Kiszerelési egységek

1 ml oldat, áttetsző fehér polietilén tubusban polipropilén csavaros kupakkal lezárva.

1, 2, 3, 6 vagy 10 tubus karton dobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.