



ETIQUETA / PROSPECTO

KENOSTART SPRAY Y BAÑO

3mg/g, solución para baño y pulverización de pezones en bovino (vacas lecheras)

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL PROPIETARIO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL PROPIETARIO DE LA AUTORIZACIÓN DE PRODUCCIÓN RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, SI ES DISTINTO

CIDLINES NV
Waterpoortstraat 2
8900 Ieper
Bélgica
Tel. +32 57 21 78 77
Fax. +32 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

KENOSTART SPRAY Y BAÑO
3mg/g, solución para baño y pulverización de pezones en bovino (vacas lecheras).

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRA(S) SUSTANCIA(S)

Iodo disponible: 3mg/g

4. INDICACIONE(S) DE USO

Desinfección de los pezones como parte de una estrategia preventiva de mastitis en el ganado bovino.

5. CONTRAINDICACIONES

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

6. REACCIONES ADVERSAS

Si observa cualquier efecto de gravedad no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

La exposición repetida al iodo puede producir alergia al mismo. Las reacciones alérgicas al iodo pueden aparecer como reacción en la piel pero también en raros casos como choque anafiláctico.

7. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (Vacas Lecheras)



8. POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VIA(S) DE ADMINISTRACIÓN

El medicamento veterinario se utiliza para el baño o la pulverización inmediata después del ordeño.

El medicamento veterinario se suministra listo para usar como solución para baño o pulverización de los pezones. Si se utiliza un vaso dosificador para baño, éste debe contener al menos 5ml de medicamento veterinario. Sumerja cada pezón inmediatamente después de cada ordeño. Asegúrese de que tres cuartos de la longitud de los pezones están completamente cubiertos. Para la pulverización de los pezones, pulverizar la superficie entera de cada pezón con el medicamento veterinario inmediatamente después de cada ordeño. El vaso dosificador o el pulverizador se deben rellenar cuando sea necesario. El vaso dosificador o el pulverizador se deben vaciar después del tratamiento y deben lavarse antes de su nuevo uso. El medicamento veterinario es para utilizarse como producto para el baño o pulverización de los pezones post-ordeño hasta dos veces al día.

9. TIEMPO(S) DE ESPERA

Carne: Cero días

Leche: Cero días

10. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Conservar en el envase original.

Mantener el envase perfectamente cerrado.

Proteger de la congelación.

Si el medicamento veterinario se ha congelado, descongelar en un lugar cálido y agitar bien antes de utilizar.

Proteger de la luz.

No usar después de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.

Período de validez después de abierto el envase primario: 6 meses

11. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Asegúrese de que la ubre y los pezones están limpios y secos antes del ordeño siguiente.

Indicado para el uso en ganado bovino en gestación y en lactancia.

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos veterinarios.

El medicamento veterinario es para aplicación tópica y no hay absorción significativa

Precauciones especiales para su uso en animales

- Únicamente para el tratamiento de animales.
- Sólo para uso externo
- El uso para el tratamiento de pezones con lesiones cutáneas puede retrasar la cicatrización. Se recomienda interrumpir el tratamiento hasta la curación de las lesiones.

Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento a los animales

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Agencia Española de
Medicamentos y
Productos Sanitarios



- Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclare con agua limpia y acuda a un médico.
- En caso de ingestión, beba agua abundantemente y acuda inmediatamente a un médico.
- Mantenga el medicamento lejos del pienso y de alimentos.
- Lave las manos después usar.
- Cuando se utiliza en forma de spray, evitar trabajar en la zona de pulverización. Las personas con hipersensibilidad conocida al yodo deben evitar el uso de este medicamento veterinario.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

13. FECHA EN LA QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

31 de enero de 2012

14. OTRA INFORMACIÓN

FORMA FARMACÉUTICA

Solución para baño y pulverización de pezones
Solución marrón oscuro

Vía de administración

Uso mamario externo

TAMANOS DE LOS ENVASES

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L.

Es posible que no se comercialice todos los formatos.

FECHA DE CADUCIDAD

CAD: {Mes/Año}

NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1804 ESP

Número de lote

Lot: {número}

MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Agencia Española de
Medicamentos y
Productos Sanitarios