

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Karton Box mit Flasche 1000 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Poulvac MG, Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (0,5 ml) :

Mycoplasma gallisepticum, Stamm R-980, inaktiviert, Schutzrate bei Hühnern $\geq 70\%$ **3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1000 Dosen (500 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Hühner.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane oder intramuskuläre Verabreichung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 12 Wochen.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V172724

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett Flasche 1000 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Poulvac MG, Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (0,5 ml) :

Mycoplasma gallisepticum, Stamm R-980, inaktiviert, Schutzrate bei Hühnern $\geq 70\%$

3. ZIELTIERART(EN)

Hühner.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane oder intramuskuläre Verabreichung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 12 Wochen.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}