

ANEXA 1
REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VARACHET FORTE, soluție pentru benzi fumigene la albinele melifere

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare ml de soluție conține:

Substanțe active:

amitraz.....150 mg

taufluvalinat.....60 mg

Excipienti:

Pentru lista completă a excipientilor vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție lăptăoasă, de culoare galben portocaliu pentru benzi fumigene.


4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă

Albine melifere

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor țintă

Produsul medicinal veterinar VARACHET FORTE se folosește în tratamentul varoozei (parazitoză externă a albinelor produsă de acarianul *Varroa destructor*) la albinele melifere.



4.3 Contraindicații

Nu există

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă

Nu există.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Dacă semnele de boala apar după tratament sau persistă, consultați medicul veterinar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale


Produsul medicinal veterinar Varachet Forte va fi manipulat și utilizat doar de personalul sanitar-veterinar specializat sau apicultur.

La nivelul de ardere al benzii de carton se dezvoltă o temperatură de 300-400°C, de aceea produsul se administrează cu deosebită atenție, așezând benzile fumigene aprinse pe plase de sărmă sau bucăți de tablă pentru a nu incendia stupul sau pavilionul. Datorită faptului că se lucrează cu foc, posesorii de stupi trebuie să dispună, în timpul tratamentului, de mijloace de stingere a incendiilor. Incendiul nu se poate produce decât din greșeala utilizatorului.

Apicultorii posesori de pavilioane mobile sau stabile vor intra în pavilion numai după o bună aerisire a acestuia. După administrare, timp de 48 de ore nu se doarme în pavilion.

Pe tot parcursul administrării produsului operatorul trebuie să inhaleze cât mai puțin fum sau deloc.

Produsul medicinal veterinar Varachet Forte poate fi moderat iritant pentru piele și ochi. În caz de răsturnare accidentală a sticlei cu Varachet, dacă substanța a ajuns pe piele se spală abundant cu apă și săpun, iar dacă substanța a pătruns în ochi se fac spălături oculare cu apă curată prin irrigare timp de cel puțin 15



minute. Îmbrăcăminte contaminată cu substanța activă se dezbracă imediat, apoi se spală cu apă și săpun.

În timpul manipularii produsului, utilizatorul nu trebuie să fumeze, să consume alimente sau să bea, apoi la final își va spăla mâinile și fața cu apă și săpun. Nu există antidot pentru substanțele active. În caz de intoxicație accidentală la om, nu se administrează atropină. Atenție deosebită se va acorda funcționării aparatului respirator. Nu se provoacă vomă, ci se fac spălături stomachale cu apă.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate)

Nu se cunosc.

În dozele terapeutice menționate, produsul nu este toxic pentru albine.

4.7 Utilizarea în timpul gestatiei, lactatiei sau ouatului

Nu este aplicabil

4.8 Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu există date disponibile.

Nu se folosește simultan cu alte produse folosite pentru combaterea varroozei.


Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

4.9 Cantități de administrat și calea de administrare.

Administrarea produsului medicinal veterinar Varachet Forte se face numai prin urdiniș, la toți stupii.

Calea de administrare este externă, prin fumigație. Pentru administrare, banda de hartie fumigenă va fi îndoită pe lungime pentru ca prin curentii de aer să se poată întreține arderea completă a benzii.

Cu ajutorul pipetei se ia lichid din sticluță și se picură, cu distanță între picături, pe banda fumigenă. Benzile trebuie aprinse la ambele capete. La nivelul de ardere al benzii de carton se dezvoltă o temperatură de 300-400°C, de aceea produsul se administrează cu deosebită atenție, așezând benzile fumigene



aprinse pe plase de sărmă sau bucăți de tablă pentru a nu incendia stupul sau pavilionul.

Imediat după introducerea benzii aprinse (fără flacără) urdinișul stupului se va închide 15-20 de minute.

Dozarea numărului de picături se raportează la volumul stupului după cum urmează:

2 picături pentru un corp de stup multietajat;

3 picături pentru un corp de stup Dadant de 10 rame;

5 picături pentru un corp de stup orizontal de 20 de rame.


Dacă la ultimele două administrări, familiile de albine au fost deja restrânse pentru iernat cu diafragmă total despărțitoare (etanșă), atunci dozarea numărului de picături se raportează la spațiul nou ocupat de familia de albine, exemplu: 1 picătură pentru o jumătate de corp multietajat; 2 picături pentru două treimi de corp Dadant de 10 rame; 3 picături pentru o jumătate de corp orizontal de 20 de rame; când într-un stup orizontal există două familii, fiecareia i se va administra câte 3 picături.

Pentru o eficacitate maximă, înainte de utilizarea produsului se vor lua măsuri de etanșezare a stupilor.

Produsul se administrează la o temperatură exterioară de peste +12°C, pentru ca albinele să nu se afle strânse în ghem, când majoritatea albinelor se află în stup (dimineața sau în amurg).

Administrarea produsului Varachet Forte se face în tot sezonul activ (în afara perioadelor de cules de producție), cu mențiunea că tratamentele cu cea mai înaltă eficacitate sunt cele de toamnă, când nu mai există puiet căpăcit.

Prima administrare se face primăvara când albinele au început activitatea normală. Următoarele trei administrări se efectuează în luna august, la interval de 7 – 10 zile, după recoltarea mierii pentru comercializare. Toamna se mai fac două administrări la interval de 7 – 10 zile, ultima efectuându-se în absență totală a puietului din stup. Dacă mai există puiet căpăcit, acesta păstrează acarienii Varroa destructor, care odată cu eclozionarea puietului rămân în stup.



majoritatea reușind să paraziteze toată iarna, reproducându-se odată cu prima generație de puiet din primăvară.

4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Mărirea numărului de picături de Varachet Forte determină intoxicația, de diferite grade a albinelor.

În eventualitatea unei supradozări se aerisește stupul.

4.11 Timp de așteptare

Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesurilor de producție.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE


Grupa farmacoterapeutică: ectoparaziticide, insecticide și repelante, ectoparaziticide pentru utilizare topica, inclusiv insecticide, amidine, amitraz combinatii

Cod ATC vet: QP53AD51

5. 1 Proprietăți farmacodinamice

Amitraz face parte din grupa formamidinelor. Excelent acaricid, slab insecticid. Acționează asupra acarienilor *Varroa destructor* prin inhibarea neurotransmițatorului octopamina, având ca rezultat depolarizarea neuronilor acestora. Astfel se amplifică activitatea nervoasă a acarienilor, cu apariția incoordonărilor motoare, comportament anormal, detașarea de pe albina gazdă și în final moarte. Nu este ovocid.

Tau-fluvalinat acționează asupra acarienilor *Varroa destructor* prin contact și eventual prin ingestie, perturbând transmiterea influxului nervos în fibrele senzitive, prin prelungirea fazei de depolarizare, se prelungește permeabilitatea membranei pentru ionii de Na⁺, ce are ca efect creșterea intrărilor ionilor de Na⁺ și scăderea ieșirilor în contracurent a ionilor de K⁺. În final apare blocarea



canalelor pentru ionii de Na⁺ și K⁺, rezultatul acestei acțiuni fiind paralizia acarienilor (knock-down) și moarte.

5. 2 Particularități farmacocinetice

Date specifice privind farmacocinetica și metabolizarea amitrazului în urma administrării la albine nu există până în prezent.

Taufluvalinat actionează prin contact, perturbând transmiterea influxului nervos în fibrele senzitive, ceea ce conduce în final la paralizia artropodelor (knock-down) și moarte.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipientilor

dodecilbenzen sulfonat de calciu (emulgator activ anionic de suprafață)

alcool gras C12 – C15 etoxilat (emulgator neionic etoxilat)

Xilen.

6.2 Incompatibilități

Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

6. 3 Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 1 an.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni


6. 4 Precauții speciale pentru depozitare

A se păstra produsul în ambalajul original, cu sticluța bine închisă cu dop.

A se păstra cutia cu produsul medicinal veterinar bine închisă.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat, la temperaturi sub 25 °C



A se păstra departe de alimente sau surse de apă potabilă.

Produsul medicinal nu se va păstra la un loc cu substanțe pesticide sau otrăvitoare, pentru a nu se contamina și deveni toxic pentru albine.

A se păstra numai la nivelul cabanei apicole sau atelierului apicol, ferit de surse de foc deschis.

Produsul nu se mai utilizeaza dacă în soluția din sticluță s-au format cristale, fiind concentrată prin evaporarea excipientilor din cauza neetanșeității sticluței și a păstrării în condiții necorespunzătoare.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din sticla bruna, de tip II, de capacitate 10 ml, cu un continut de 6,5 ml produs;

Cutie de carton ce contine:

- 1 flacon cu Varachet Forte
- 1 folie de material plastic transparentă, termosudată ce contine 60 benzi fumigene (benzile fumigene sunt din hartie de filtru biologic, au dimensiuni de 15 x 100 mm și sunt impregnate cu azotat de potasiu de concentrație 15%)
- 1 pipeta din polietilena cu picator,

6.6 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinarne neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Varachet Forte nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.


Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeuri provenite din astfel de produse medicinale veterinarne trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultură SA

B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, București

Tel: 021/2325060



Fax: 021/2320287

E-mail: secretariat@icdapicultura.ro

8. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE


9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI / REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

03.02.2004/12.10.2007

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

INTERDICȚII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ȘI/SAU UTILIZARE

Nu este cazul.



INFORMAȚII CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE AMBALAJUL SECUNDAR

cutie de carton x 1 flacon x 1 folie de material plastic ce contine 60 benzi fumigene, 1 pipeta cu picator

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VARACHET FORTE, soluție pentru benzi fumigene la albinele melifere
amitraz, taufluvalinat

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR SUBSTANȚE

Fiecare ml de solutie contine:

Substanțe active:

amitraz.....150 mg

taufluvalinat.....60 mg

Excipienți: dodecilbenzen sulfonat de calciu, alcool gras C12 – C15 etoxilat, xilen

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție pentru benzi fumigene.

4. DIMENSIUNEA AMBALAJULUI

cutie de carton x 1 flacon x 1 folie de material plastic ce contine 60 benzi fumigene, 1 pipeta cu picator

5. SPECII ȚINTĂ

Albine melifere



6. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Produsul medicinal veterinar VARACHET FORTE se folosește în tratamentul varoozei (parazitoză externă a albinelor produsă de acarianul *Varroa destructor*) la albinele melifere.

7. MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Citiți prospectul înainte de utilizare.

8. TEMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesurilor de producție.

9. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE), DUPĂ CAZ

Citiți prospectul înainte de utilizare.

10. DATA EXPIRĂRII

Exp, luna/ an:

Dupa desigilare/deschidere se va utiliza pana la: 6 luni

11. CONDIȚII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra produsul în ambalajul original, cu sticluța bine închisă cu dop.

A se păstra cutia cu produsul medicinal veterinar bine închisă.


A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat, la temperaturi sub 25°C.

A se păstra departe de alimente sau surse de apă potabilă.

Produsul medicinal nu se va păstra la un loc cu substanțe pesticide sau otrăvitoare, pentru a nu se contamina și deveni toxic pentru albine.

A se păstra numai la nivelul cabanei apicole sau atelierului apicol, ferit de surse de foc deschis.



Produsul nu se mai utilizeaza dacă în soluția din sticluță s-au format cristale, fiind concentrată prin evaporarea excipientilor din cauza neetanșeității sticluței și a păstrării în condiții necorespunzătoare.

12. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Varachet Forte nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeuri provenite din astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

13. MENTIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR” ȘI CONDIȚII SAU RESTRICȚII PRIVIND ELIBERAREA ȘI UTILIZAREA, după caz

Numai pentru uz veterinar. Se elibereaza numai cu prescriptie veterinara.

14. MENTIUNEA „A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

15. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

S.C. Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultură SA

B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, București

Tel: 021/2325060


Fax: 021/2320287

E-mail: secretariat@icdapicultura.ro

16. NUMĂRUL (NUMERELE) AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE

17. NUMĂRUL DE FABRICAȚIE AL SERIEI DE PRODUS

Serie



INFORMAȚII MINIME CARE TREBUIE ÎNSCRISE PE UNITĂȚILE MICI DE AMBALAJ PRIMAR

flacon din sticla bruna, de tip II x 6,5 ml produs;

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VARACHET FORTE, soluție pentru benzi fumigene la albinele melifere
amitraz, taufluvalinat

2. CANTITATEA DE SUBSTANȚĂ (SUBSTANȚE) ACTIVĂ (ACTIVE)

amitraz 150 mg/ml, taufluvalinat.60 mg/ml

3. CONȚINUT PE UNITATE DE GREUTATE, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE

Flacon x 6,5 ml

4. CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE

Calea de administrare este externă, prin fumigație

5. TEMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.

Nu se utilizează în timpul culesurilor de producție.

6. NUMĂRUL SERIEI

Serie


7. DATA EXPIRĂRII

Exp,luna/an

Dupa desigilare/deschidere,se va utiliza pana la: 6 luni

8. MENȚIUNEA „NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”

Numai pentru uz veterinar.



B. PROSPECT

VARACHET FORTE, soluție pentru benzi fumigene la albinele melifere

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

S.C. Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultură SA

B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, București

Tel: 021/2325060

Fax: 021/2320287

E-mail: secretariat@icdapicultura.ro

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

VARACHET FORTE, soluție pentru benzi fumigene la albinele melifere
amitraz, taufluvalinat

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDENȚI)

Fiecare ml de solutie contine:

Substanțe active:

amitraz.....150 mg

taufluvalinat.....60 mg

Excipienți: dodecilbenzen sulfonat de calciu, alcool gras C12 – C15 etoxilat, xilen

4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Produsul medicinal veterinar VARACHET FORTE se folosește în tratamentul varoozei (parazitoză externă a albinelor produsă de acarianul *Varroa destructor*) la albinele melifere.



5. CONTRAINDICAȚII

Nu există

6. REACȚII ADVERSE

Nu se cunosc.

În dozele terapeutice menționate, produsul nu este toxic pentru albine. Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Albine melifere

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrarea produsului medicinal veterinar Varachet Forte se face numai prin urdiniș, la toti stupii.


Calea de administrare este externă, prin fumigație. Pentru administrare, banda de hartie fumigenă va fi îndoită pe lungime pentru ca prin curentii de aer să se poată întreține arderea completă a benzii.

Cu ajutorul pipetei se ia lichid din sticluță și se picură, cu distanță între picături, pe banda fumigenă. Benzile trebuie aprinse la ambele capete. La nivelul de ardere al benzii de carton se dezvoltă o temperatură de 300-400°C, de aceea produsul se administreză cu deosebită atenție, așezând benzile fumigene aprinse pe plase de sârmă sau bucăți de tablă pentru a nu incendia stupul sau pavilionul.

Imediat după introducerea benzii aprinse (fără flacără) urdinișul stupului se va închide 15-20 de minute.

Dozarea numărului de picături se raportează la volumul stupului după cum urmează:

2 picături pentru un corp de stup multietajat;



3 picături pentru un corp de stup Dadant de 10 rame;

5 picături pentru un corp de stup orizontal de 20 de rame.

Dacă la ultimele două administrări familiile de albine au fost deja restrânse pentru iernat cu diafragmă total despărțitoare (etanșă), atunci dozarea numărului de picături se raportează la spațiul nou ocupat de familia de albine, exemplu: 1 picătură pentru o jumătate de corp multietajat; 2 picături pentru două treimi de corp Dadant de 10 rame; 3 picături pentru o jumătate de corp orizontal de 20 de rame; când într-un stup orizontal există două familii, fiecareia î se va administra câte 3 picături.

Administrarea produsului Varachet Forte se face în tot sezonul activ (în afara perioadelor de cules de producție), cu mențiunea că tratamentele cu cea mai înaltă eficacitate sunt cele de toamnă, când nu mai există puiet căpăcit.

Prima administrare se face primăvara când albinele au început activitatea normală. Următoarele trei administrări se efectuează în luna august, la interval de 7 – 10 zile, după recoltarea mierii pentru comercializare.

Toamna se mai fac două administrări la interval de 7 – 10 zile, ultima efectuându-se în absență totală a puietului din stup. Dacă mai există puiet căpăcit, acesta păstrează acarienii *Varroa destructor*, care odată cu eclozionarea puietului rămân în stup, majoritatea reușind să paraziteze toată iarna, reproducându-se odată cu prima generație de puiet din primăvară.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ


Respectați dozele recomandate.

Pentru o eficacitate maximă, înainte de utilizarea produsului se vor lua măsuri de etanșezare a stupilor.

Produsul se administrează la o temperatură exterioară de peste +12°C, pentru ca albinele să nu se afle strânse în ghem, când majoritatea albinelor se află în stup (dimineața sau în amurg).

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Zero zile.



Nu se utilizează în timpul culesurilor de producție.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lasa la indemana copiilor

A se păstra produsul în ambalajul original, cu sticluța bine închisă cu dop.

A se păstra cutia cu produsul medicinal veterinar bine închisă.

A se proteja de lumină.

A se păstra în loc uscat, la temperaturi sub 25°C

A se păstra departe de alimente sau surse de apă potabilă.

Produsul medicinal nu se va păstra la un loc cu substanțe pesticide sau otrăvitoare, pentru a nu se contamina și deveni toxic pentru albine.

A se pastra numai la nivelul cabanei apicole sau atelierului apicol, ferit de surse de foc deschis.

Produsul nu se mai utilizeaza dacă în soluția din sticluță s-au format cristale, fiind concentrată prin evaporarea excipientilor din cauza neetanșeității sticluței și a păstrării în condiții necorespunzătoare.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe cutie.

Perioada de valabilitate dupa prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Precauții speciale pentru utilizare la animale

Daca semnele de boala apar dupa tratament sau persista, consultati medicul veterinar.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Produsul medicinal veterinar Varachet Forte va fi manipulat și utilizat doar de personalul sanitar-veterinar specializat sau apicoltor.

La nivelul de ardere al benzii de carton se dezvoltă o temperatură de 300-400°C, de aceea produsul se administrează cu deosebită atenție, așezând benzile fumigene aprinse pe plase de sărmă sau bucăți de tablă pentru a nu incendia stupul sau pavilionul. Datorită faptului că se lucrează cu foc, posesorii de stupi



trebuie să dispună, în timpul tratamentului, de mijloace de stingere a incendiilor. Incendiul nu se poate produce decât din greșeala utilizatorului.

Apicultorii posesori de pavilioane mobile sau stabile vor intra în pavilion numai după o bună aerisire a acestuia. După administrare, timp de 48 de ore nu se doarme în pavilion.

Pe tot parcursul administrării produsului operatorul trebuie să inhaleze cât mai puțin fum sau deloc.

Produsul medicinal veterinar Varachet Forte poate fi moderat iritant pentru piele și ochi. În caz de răsturnare accidentală a sticletei cu Varachet, dacă substanța a ajuns pe piele se spală abundant cu apă și săpun, iar dacă substanța a pătruns în ochi se fac spălături oculare cu apă curată prin irigare timp de cel puțin 15 minute. Îmbrăcământea contaminată cu substanța activă se dezbracă imediat, apoi se spală cu apă și săpun.

În timpul manipularii produsului, utilizatorul nu trebuie să fumeze, să consume alimente sau să bea, apoi la final își va spăla mâinile și fața cu apă și săpun.

Nu există antidot pentru substanțele active. În caz de intoxicație accidentală la om, nu se administreză atropină. Atenție deosebită se va acorda funcționării aparatului respirator. Nu se provoacă vomă, ci se fac spălături stomachale cu apă.

Utilizarea în timpul gestatiei, lactatiei sau ouatului

Nu este aplicabil

Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune

Nu există date disponibile.

Nu se folosesc simultan cu alte produse folosite pentru combaterea varroozei.


Acest produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz

Mărirea numărului de picături de Varachet Forte determină intoxicația, de diferite grade a albinelor.

În eventualitatea unei supradozări se aerisește stupul.

Incompatibilități



'Acet produs medicinal veterinar nu trebuie amestecat cu alte produse medicinale veterinare.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Varachet Forte nu trebuie să fie eliminat în cursuri de apă, datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeuri provenite din astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.


14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Proprietăți farmacodinamice

Amitraz face parte din grupa formamidinelor. Excelent acaricid, slab insecticid. Acționează asupra acarienilor *Varroa destructor* prin inhibarea neurotransmițatorului octopamina, având ca rezultat depolarizarea neuronilor acestora. Astfel se amplifică activitatea nervoasă a acarienilor, cu apariția incoordonărilor motoare, comportament anormal, detasarea de pe albina gazdă și în final moarte. Nu este ovocid.

Tau-fluvalinat acționează asupra acarienilor *Varroa destructor* prin contact și eventual prin ingestie, perturbând transmiterea influxului nervos în fibrele senzitive, prin prelungirea fazei de depolarizare, se prelungește permeabilitatea membranei pentru ionii de Na⁺, ce are ca efect creșterea intrărilor ionilor de Na⁺ și scăderea ieșirilor în contracurent a ionilor de K⁺. În final apare blocarea canalelor pentru ionii de Na⁺ și K⁺, rezultatul acestei acțiuni fiind paralizia acarienilor (knock-down) și moarte.



Particularități farmacocinetice

Date specifice privind farmacocinetica și metabolizarea amitrazului în urma administrării la albine nu există până în prezent.

Taufluvalinat actionează prin contact, perturbând transmiterea influxului nervos în fibrele senzitive, ceea ce conduce în final la paralizia arthropodelor (knock-down) și moarte.

Cutie de carton x 1 flacon cu Varachet Forte x 1 folie de material plastic, termosudată ce conține 60 benzi fumigene și 1 pipetă cu picator,

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare sau producătorul:

România

S.C. Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Apicultură SA

B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1, București

Tel: 021/2325060

Fax: 021/2320287

E-mail: secretariat@icdapicultura.ro

