

## **Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben (Gebrauchsinformation)**

### **Gebrauchsinformation Bronheel ad us. vet.**

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221-50100  
Telefax: 07221-501210  
E-Mail: info@heel.de

#### **Bezeichnung des Tierarzneimittels**

Bronheel ad us. vet.  
Tabletten

Homöopathisches Arzneimittel

Für Tiere  
Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

#### **Zusammensetzung**

Jede Tablette zu 301,5 mg enthält:

##### **Wirkstoffe:**

Atropa bella-donna Trit.	D4	30,0 mg
Bryonia Trit.	D4	60,0 mg
Hyoscyamus niger Trit.	D4	60,0 mg
Kalium stibyltartaricum Trit.	D4	30,0 mg
Kreosotum Trit.	D5	30,0 mg
Lobaria pulmonaria Trit.	D4	30,0 mg
Lobelia inflata Trit.	D4	30,0 mg
Psychotria ipecacuanha Trit.	D4	30,0 mg

Die Bestandteile 1 bis 8 werden über die letzten 2 Stufen gemäß HAB, Vorschrift 40c gemeinsam potenziert.

Sonstiger Bestandteil:  
Magnesiumstearat

#### **Anwendungsgebiet(e)**

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

### **Gegenanzeigen**

Nicht anwenden bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe des Arzneimittels.

### **Nebenwirkungen**

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese bitte dem Tierarzt mit.

### **Zieltierart(en)**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze

### **Dosierung, Art und Dauer der Anwendung**

Standarddosierung:

Die Tagesdosis beträgt entsprechend der Tierart:

Pferd, Rind (über 500 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 10 Tabletten

Pferd, Rind (bis zu 500 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 6-8 Tabletten

Schwein: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 4 Tabletten

Schaf, Ziege: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3-4 Tabletten

Großer Hund (über 25 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 3 Tabletten

Mittelgroßer Hund (15-25 kg): 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 2 Tabletten

Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze: 2-3 mal täglich die Einzeldosis von 1 Tablette

Initial-/Akutdosierung:

Bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe bis ganze Stunde über einen Zeitraum von bis zu 2 Stunden die angegebene Einzeldosis verabreichen, dann mit der Standarddosierung fortfahren.

Dosierung zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen:

Zur Langzeitbehandlung bei chronischen Erkrankungen die Einzeldosis jeweils in Abständen von 1 bis 4 Tagen verabreichen.

Hinweis: Bronheel ad us. vet. sollte ohne tierärztlichen Rat nicht über einen längeren Zeitraum angewendet werden.

### **Wartezeit(en)**

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: Null Tage

Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: Null Tage

### **Besondere Lagerungshinweise**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.  
Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Das Arzneimittel ist nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

### **Besondere Warnhinweise**

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Vor der Anwendung sollte eine tierärztliche Untersuchung erfolgen.

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Keine.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Anwender:

Keine bekannt.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Zur Verträglichkeit von Bronheel ad us. vet. bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Bronheel ad us. vet. gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie Ihren Tierarzt.

### **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage**

Dezember 2021

### **Weitere Angaben**

Packungsgrößen

100 und 500 Tabletten

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr. 402299.00.00