

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Albadry plus intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH) UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

1 intramamarni injektor z 10 ml suspenzije vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

prokainijev benzilpenicilat

200.000 IU

natrijev novobiocinat

400,0 mg

Pomožne snovi:

Aluminijev monostearat, Arašidovo olje

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 injektorjev

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramamarna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Mleko: 84 ur po telitvi, če je od zdravljenja do telitve minilo vsaj 30 dni.

V primeru predčasne telitve je treba mleko testirati.

Meso: 30 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri sobni temperaturi.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0008/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Intramamarni injektor 10 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Albadry plus intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. KOLIČINA ZDRAVILNIH UČINKOVIN

prokainijev benzilpenicilat	200.000 IU
natrijev novobiocinat	400,0 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i/mam

5. KARENCA

Karenca: **Mleko:** 84 ur po telitvi, če je od zdravljenja do telitve minilo vsaj 30 dni.
V primeru predčasne telitve je treba mleko testirati.
Meso: 30 dni

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serijska

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.