


HASZNÁLATI UTASÍTÁS egyben CÍMKE
250 ml és 500 ml flakon papírdobozának



1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK VÉGFELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Virbac S. A. (1ère Avenue L.I.D. 2065 m 06516 Carros, Franciaország).

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Duowin permet kutyák részére A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag: Permetrin (cis:trans 40:60) (94 %) 1,88 g, piriproxifen 0,02 g
Segéd-, és vivőanyagok: filmképző organikus kopolimer, propilén glikol metiléter, parfüm, tisztított víz ad 100 ml. A hatóanyagok koncentrációja: permetrin 2 %, a piriproxifen 0,02 %.

4. JAVALLAT(OK)

Kutyák bolha- (Ctenocephalides felis) és kullancs (Ixodes, Rhipicehalus fajok) fertőzöttségének kezelésére és megelőzésére. A Duowin permet 6 hetes védelmet biztosít a bolha imágók és 4 hetes védelmet a kullancsok ellen. A bolhák ivaréretté válását a fejlődési alakokra gyakorolt gátló hatással 10 hétig akadályozza meg.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható macskákon. Nem alkalmazható 2 hónaposnál fiatalabb kutyakölykökön.
Ne használjuk a készítményt, ha az állatokon bőrsérülések vannak. Nem alkalmazható beteg vagy lábadozó állatokon.

6. MELLÉKHATÁSOK

Ritkán izgatottság, vakaródzás vagy hányás, hasmenés, levertség előfordult. Ezek a tünetek kezelés nélkül elmúltak.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) ÉS MÓDSZEREK CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Alkalmazás módja: külsőleges.

A kutya testtömege	3 kg	7 kg	10 kg	15 kg	20 kg	30 kg	40 kg
A szórófejjel végzett permetezések száma	5	12	17	25	34	50	67

Az állat teljes testfelületét permetezzük le a szőr növekedésével ellentétes irányból. Borzoljuk fel a szőrt, főleg a hosszú szőrű állatoknál, hogy a hatóanyag eljusson a bőrig. A mellékelt szórófejjel 5 ml oldat adagoljunk ttkg-onként, ami egyenértékű 94 mg (100 mg technikai minőségű) permetrin / ttkg-mal, és 1mg piriproxifén/ttkg-mal. Öt pumpa nyomást alkalmazzunk 3 ttkg-ra, az adagolást a táblázatnak megfelelően végezzük. A pumpa egy nyomással 3,2 ml permetet juttat ki. Hatékony védelem akkor érhető el, ha a teljes szőrtakaró átázik. Vigyázzunk, hogy a permet ne kerüljön a kutya szemébe, szájába, és ne lélegezze be. Hagyjuk a szőrzetet természetes módon megszáradni, ne öblítsük le, ne töröljük meg. A készítményt tiszta, száraz állatra permetezzük, ezzel növeljük a szer hatékonyságát. A kezelés napján ne engedjük a kutyákat tavakba, folyókba. Kezelés után az állatokat ne mossuk le, ne samponozzuk, ha ez elkerülhetetlen, akkor ismételten permetezzük le az állatot a bolha és kullancs elleni védelem fenntartása miatt. Az újr fertőződés megakadályozása végett az együtt tartott kutyák egyidejűleg kezelendők. A bolhák és petéik megtalálhatók a kutya közvetlen környezetében, ezért a kutya tartózkodási és fekvőhelyét, a szőnyeget, kárpitozott bútorokat rendszeresen takarítsuk, porszívózzuk. Az állatok kezelésével egyidejűleg a környezetükben a bolhák irtására alkalmazzunk inszekticid hatású biocid terméket. Évente három alkalommal biztonságosan alkalmazható készítmény.

9. TANÁCSOK A MEGFELELŐ ALKALMAZÁSHOZ

Gyúlékony, ezért a szabadban, vagy jól szellőző helyiségben végezzük a kezelést. Akadályozzuk meg, hogy az állatok a kezelést követően nyalják a bőrüket, szőrtüket. Más állatokat a szőrzet megszáradásáig ne engedjük a kezelt állatok közelébe. A kezelt kutyákat tűztől, vagy más hőforrástól a kezelést követően legalább 30 percig, vagy a szőrzet megszáradásáig tartuk távol. Ne adagoljunk több permetet a megállapított dózishoz. Pontosan mérjük meg az állat testsúlyát mielőtt a szükséges dózist, a pumpálások számát meghatározzuk.

Ne alkalmazzuk akváriumok közelében.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

GYÚLÉKONY! 25 °C alatti hőmérsékleten, sugárzó hőtől védve tartandó. Ha a szórófejet felszereltük, a készítmény csak függőlegesen felállítva tartható. Élelmiszerektől, italoktól távol tartandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Vemhesség idején történő alkalmazás:

Nem alkalmazható szoptató szukákon. A szoptató szukák és 2 hónap alatti kutyakölykök bolha- és kullancs elleni kezeléséről érdeklődjön az állatorvosától.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Más inszekticid hatású készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

Túladagolás, tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok:

Az esetleges túladagolás tünetei a túlérzékenység, a mozgás koordinációjának hiánya, erőteljes bőrpír, hosszan tartó reszketés. Túladagolás esetén samponos vízben fürdesse meg a kutyát, hogy lemossa a készítményt. A hatóanyagoknak nincs speciális ellenszertük.

Az állatok kezelését végző személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok:

A kezelést végző személy viseljen át nem eresztő védőkesztyűt (gumi, neoprén vagy vinil). Ne lélegezze be a permetet. Kerülje el a permet bőrre, vagy szembejutását. Ha szembe jut, vagy bőrre kerül, folyóvízzel bőségesen öblíteni szükséges. A szabadban, vagy jól szellőző helyiségben végezzük a kezelést.

A készítmény gyúlékony! Ne permetezzünk nyílt lángra vagy izzó anyagra. A permetezéskor tilos a dohányzás, az evés, ivás. Ételtől, italtól távol kell tartani. A készítmény használata után alaposan kezelt kell mosni!

Ne engedjük, hogy a gyermekek a kezelést követően a kutyával érintkezzenek.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni. A készítmény és maradéka nem kerülhet folyó és élővizekbe, mert mérgező a halakra, rákokra és más vízi élőlényekre.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2014. augusztus 27.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabadon forgalmazható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

Törzskönyvi szám: 2827/1/10 MgSzH ÁTI (250 ml)

2827/2/10 MgSzH ÁTI (500 ml)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

BN: {szám}

18. LEJÁRATI IDŐ

A gyártás ideje a gyártási tétel száma (nap/hónap/év)

