

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

XYLAZIN 2 %, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

ksilazino hidrochlorido, atitinkančio 20 mg ksilazino, 23,32 mg;

pagalbinės medžiagos:

metilhidroksibenzoato 1 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, šunys, katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliams sedacijai sukelti ir raumenims atpalaiduoti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai ir anestezijai.

Galvijams sedacijai sukelti, raumenims atpalaiduoti ir analgezijai nesudėtingų operacijų metu.

Derinyje su kitais vaistais anestezijai.

Šunims ir katėms sedacijai sukelti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai, anestezijai ir raumenims atpalaiduoti.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti, esant plaučių, širdies ligoms, ypač skilvelių aritmijai, sutrikus kepenų ir inkstų veiklai, kartu su simpatikomimetiniais vaistais, pvz., epinefrinu, esant traukulių, spazmų, mėšlungio tikimybei, hipotenzijai, šokui.

Negalima naudoti šunims ir katėms, sergančioms cukriniu diabetu bei ligomis susijusiomis su vėmimu, stemplės obstrukcija, skrandžio užsisukimu.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Siekiant išvengti aspiracijos pašaru ar seilėmis, galvijų galva ir kaklas turi būti nuleisti žemiau. Jei atrajotojams pasireiškia timpanija, gyvulį reikėtų paguldyti ant krūtinės. Jei yra įmanoma, rekomenduotina likus 24 val. iki ksilazino naudojimo galvijui neduoti pašaro ir vandens.

Dėl vėmimo tikimybės šunys ir katės turi būti alkinami 12 val. prieš Xylazin 2 % švirkštimą.

Šunims ksilazino naudojimas visuomet skatina dujų kaupimąsi virškinimo trakte. Todėl sedacija ksilazinu gali būti nepageidautina atliekant rentgenografiją, nes gali trukdyti vertinant tyrimo rezultatus.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Manipuliacijos su gyvūnais, seduotais ksilazinu, turi būti atliekamos apdairiai, nes jie gali pabusti dėl išorinių dirgiklių ir staiga imtis gynybos judesių. Seduotų arklių, gynimosi judesiai galimi, kai yra manipuliojama užpakalinėje kūno dalyje.

Jei prieš Xylazin 2 % injekciją buvo atlikta premedikacija kitais vaistais, pvz., sedacinė/ analgezinė premedikacija, ksilazino dozė turi būti sumažinta.

Rekomenduotina sulaukti sedacinio ksilazino poveikio prieš švirkščiant ketaminą šunims ir katėms.

Gydyti gyvūnai turi būti stebimi (kvėpavimo ir širdies veikla, taip pat pooperaciniu metu) kol visiškai baigsis vaisto veikimas.

Pooperacinio miego metu reikia apsaugoti gyvūną nuo kūno temperatūros mažėjimo ir stiprios saulės šviesos.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Nėra.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Arkliams ir galvijams galimas gimdos susitraukimas, praeinantis varpos iškritimas, galvijams – padidėjęs seilėtekis, prieskrandžių motorikos nusilpimas, timpanija, liežuvio paralyžius, regurgitacija.

Arkliams, galvijams, šunims ir katėms gali susilpnėti kvėpavimas (ypač katėms), pakilti, o po to sumažėti kraujo spaudimas, pasireikšti bradikardija, širdies ritmo sutrikimai, termoreguliacijos slopinimas ir kūno temperatūros mažėjimas, galvijams būdingas laikinas temperatūros pakilimas prieš jos nukritimą, stiprus sujaudinimas, hiperglikemija ir poliurija, vietinis audinių sudirginimas, šunims ir katėms – vėmimas.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Ksilazino negalima naudoti patelėms paskutinį vaikingumo trečdalį.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Ksilazino negalima naudoti kartu su epinefrinu, nes gali pasireikšti širdies skilvelių aritmija.

Ksilazinas stiprina CNS slopinančių (barbituratų, narkotizuojamųjų, analgetinių) vaistų veikimą, todėl gali tekti mažinti kiekvieno medikamento dozę. Pagrindinis, o kartais ir šalutinis ksilazino poveikis silpnėja panaudojus α_2 -adrenoreceptorių antagonistus.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Arkliui vaistą reikia švirkšti į veną, po 0,6–1 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 3–5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio sedacijai, įvairaus stiprumo analgezijai ir raumenų relaksacijai stovinčiam gyvūnui, atliekant kaustymą, tyrimus, apdorojant žaizdas, akušerinių manipuliacijų ir nelabai skausmingų operacijų metu.

Galviui vaistą galima švirkšti į veną ar į raumenis:

– 0,05 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,25 ml tirpalo 100 kg kūno svorio sedacijai, silpnai raumenų relaksacijai ir analgezijai reikalingai pervežant, keičiant tvarsčius, išsivertusiai ar užsisukusiai gimdai atstatyti ir sedacijai, norint atlikti vietinę ar infiltracinę anesteziją;

– 0,1 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio vidutinei sedacijai, raumenų relaksacijai ir analgezijai, reikalingai atliekant smulkias spenių, nagų operacijas, esant stemplės obstrukcijai (kai nenorima, kad gyvulys gulėtų, jį galima priverstinai pastatyti);

– 0,2 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 1 ml tirpalo 100 kg kūno svorio stipriai sedacijai, raumenų relaksacijai ir analgezijai, reikalingai atliekant dideles chirurgines operacijas, jei būtina derinyje su vietine ar laidine anestezija (ragų, nagų ir spenių amputacija, kastracija, sterilizacija, cezario pjūvis

gulinčiam gyvūnui (kartu su gimdos relaksantais), dantų traukimui ir kt.). Stovėjimo galimybė yra dažniausiai sumažėjusi;

– 0,3 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 1,5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio gali būti naudojama tik specialiais atvejais, esant labai skausmingoms arba ilgai trunkančioms operacijoms ir norint sukelti ilgai trunkančią sedaciją arba labai stiprią raumenų relaksaciją. Prieš operaciją kelias valandas gyvūnas turi būti alkinamas.

Švirkščiant ksilazina galvijui į veną, dozę reikia sumažinti $\frac{1}{2}$ ar $\frac{1}{3}$, priklausomai nuo individualios gyvūno reakcijos. Į veną turi būti švirkščiamas labai lėtai.

Šuniui vaistą galima švirkšti į veną ar į raumenis, po 1–3 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,5–1,5 ml tirpalo 10 kg kūno svorio.

Katei švirkščiamas į raumenis ar po oda po 2–4 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,1–0,2 ml tirpalo 1 kg kūno svorio.

Norint pailginti ar pagilinti efektą, vaistą galima švirkšti pakartotinai, bet negalima viršyti didžiausios rekomenduotinos dozės.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Perdozavus gali pasireikšti aritmija, hipotenzija, sunkus CNS ir kvėpavimo centro slopinimas, galimi traukuliai. Tokiu atveju būtina taikyti dirbtinį kvėpavimą bei naudoti centrinius analeptikus.

Jei medicininio požiūriu yra reikalingas ksilazino efekto sutrumpinimas ar nutraukimas šunims ir katėms galima naudoti medžiagas su α_2 -antagonistiniu veikimu (johimbina, tolazolina, atipamezoli).

4.11. Išlauka

Arkliai, galvijai, subproduktams ir pienui – 1 para.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: kitos hipnozinių ir sedacinių medžiagų.

ATCvet kodas: QN05CM92.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Ksilazinas yra tiazino darinys, kuris ramina, migdo, vietiskai anestezuoja, mažina kraujo spaudimą, skausmą (priklausomai nuo gyvūno rūšies) ir atpalaiduoja raumenis. Gyvūnų jautrumas ksilazinui yra labai skirtingas. Smarkiai analgetiskai veikia tik su kitais vaistais.

Ksilazinas slopina kvėpavimą, termoreguliaciją, sukelia hipoinsulinemiją bei hiperglikemiją.

Stimuliuodamas vėmimo centrą, šunims ir katėms sukelia vėmimą.

Ksilazinas yra α_2 -adrenoreceptorių agonistas ir veikia centrines ir periferines nervų sistemos presinapsinius ir posinapsinius receptorių.

Panašiai kaip klonidinas, ksilazinas, stimuliuodamas α_2 -adrenoreceptorius, ramina ir veikia analgetiskai. Dalies nepalankių reakcijų (kraujo spaudimo mažėjimo) atsiradimas yra dėl to paties veikimo mechanizmo. Vietinio anestezuojamojo veikimo mechanizmas nėra pakankamai išaiškintas.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Sušvirkštas ksilazinas, būdamas silpnu šarmu, greitai rezorbuojasi ir pasiskirsto. Švirkštus į raumenis, didžiausia koncentracija kraujo plazmoje susidaro po 12–14 min. Šunų organizme švirkšto į raumenis ksilazino biologinis prieinamumas yra 52–90 %. Ksilazinas organizme greitai biotransformuojamas, susidarant metabolitams. Sušvirkšto į raumenis ar veną ksilazino pusinės eliminacijos iš kraujo plazmos laikas yra 23–60 min, bendras pusinio išsiskyrimo iš organizmo laikas, priklausomai nuo dozės bei gyvūno rūšies, yra 2–3 val. Didžiausia vaisto koncentracija susidaro kepenyse ir inkstuose.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Metilhidroksibenzoatas, injekcinis vanduo.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 36 mėn.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 28 d.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

I tipo bespalvio stiklo buteliukai po 25 ml ir II tipo bespalvio stiklo buteliukai po 50 ml, užkimšti brombutilinės gumos kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais, kartoninėse dėžutėse ar lizdinėse pakuotėse po 1, 5, 6, 10 arba 12 vnt.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bela-Pharm GmbH & Co.KG,
Lohner Str. 19,
49377 Vechta,
Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIAI

LT/2/98/0744/001

LT/2/98/0744/003

9. REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA

Registracijos data: 1998-09-18

Perregistracijos data: 2004-04-23, 2009-04-29

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2010-09-16

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

XYLAZIN 2 %, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

ksilazino hidrochlorido, atitinkančio 20 mg ksilazino, 23,32 mg;

pagalbinės medžiagos:

metilhidroksibenzoato 1 mg.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

25 ml

50 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, šunys, katės.

6. INDIKACIJOS

Arkliams sedacijai sukelti ir raumenims atpalaiduoti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai ir anestezijai.

Galvijams sedacijai sukelti, raumenims atpalaiduoti ir analgezijai nesudėtingų operacijų metu.

Derinyje su kitais vaistais anestezijai.

Šunims ir katėms sedacijai sukelti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai, anestezijai ir raumenims atpalaiduoti.

7. NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Vaistą reikia švirkšti į veną, raumenis ar po oda.

8. IŠLAUKA

Išlauka: arklienai, galvijai, subproduktams ir pienui – 1 para.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki... {mėnuo/metai}
Atidarius būtina sunaudoti iki...

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bela-Pharm GmbH & Co.KG,
Lohner Str. 19,
49377 Vechta,
Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/98/0744/001
LT/2/98/0744/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
BUTELIUKAS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

XYLAZIN 2 %, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

1 ml tirpalo yra:
ksilazino hidrochlorido, atitinkančio 20 mg ksilazino, 23,32 mg.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

25 ml
50 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Vaistą reikia švirkšti į veną, raumenis ar po oda.

5. IŠLAUKA

Išlauka: arklienai, galvijienai, subproduktams ir pienui – 1 para.

6. SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

7. TINKAMUMO DATA

TINKA IKI {mėnuo/metai}
Atidarius būtina sunaudoti iki...

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
XYLAZIN 2 %, injekcinis tirpalas

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

Bela-Pharm GmbH & Co.KG,
Lohner Str. 19,
49377 Vechta,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

XYLAZIN 2 %, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliosios medžiagos:

ksilazino hidrochlorido, atitinkančio 20 mg ksilazino, 23,32 mg;

pagalbinės medžiagos:

metilhidroksibenzoato 1 mg.

4. INDIKACIJOS

Arkliams sedacijai sukelti ir raumenims atpalaiduoti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai ir anestezijai.

Galvijams sedacijai sukelti, raumenims atpalaiduoti ir analgezijai nesudėtingų operacijų metu.

Derinyje su kitais vaistais anestezijai.

Šunims ir katėms sedacijai sukelti. Derinyje su kitais vaistais analgezijai, anestezijai ir raumenims atpalaiduoti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti, esant plaučių, širdies ligoms, ypač skilvelių aritmijai, sutrikus kepenų ir inkstų veiklai, kartu su simpatikomimetiniais vaistais, pvz., epinefrinu, esant traukulių, spazmų, mėšlungio tikimybei, hipotenzijai, šokui.

Negalima naudoti šunims ir katėms, sergančioms cukriniu diabetu bei ligomis susijusiomis su vėmimu, stemplės obstrukcija, skrandžio užsisukimu.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Arkliams ir galvijams galimas gimdos susitraukimas, praeinantis varpos iškritimas, galvijams – padidėjęs seilėtekis, prieskrandžių motorikos nusilpimas, timpanija, liežuvio paralyžius, regurgitacija. Arkliams, galvijams, šunims ir katėms gali susilpnėti kvėpavimas (ypač katėms), pakilti, o po to sumažėti kraujo spaudimas, pasireikšti bradikardija, širdies ritmo sutrikimai, termoreguliacijos slopinimas ir kūno temperatūros mažėjimas, galvijams būdingas laikinas temperatūros pakilimas prieš

jos nukritimą, stiprus sujaudinimas, hiperglikemija ir poliurija, vietinis audinių sudirginimas, šunims ir katėms – vėmimas.

Pastebėjus bet kokių sunkių poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, šunys, katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Arkliui vaistą reikia švirkšti į veną, po 0,6–1 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 3–5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio sedacijai, įvairaus stiprumo analgezijai ir raumenų relaksacijai stovinčiam gyvūnui, atliekant kaustymą, tyrimus, apdorojant žaizdas, akušerinių manipuliacijų ir nelabai skausmingų operacijų metu.

Galvijui vaistą galima švirkšti į veną ar į raumenis:

– 0,05 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,25 ml tirpalo 100 kg kūno svorio sedacijai, silpnai raumenų relaksacijai ir analgezijai reikalingai pervežant, keičiant tvarsčius, išsivertusius ar užsisukusius gimdai atstatyti ir sedacijai, norint atlikti vietinę ar infiltracinę anesteziją;

– 0,1 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio vidutinei sedacijai, raumenų relaksacijai ir analgezijai, reikalingai atliekant smulkias spenių, nagų operacijas, esant stemplės obstrukcijai (kai nenorima, kad gyvulys gulėtų, jį galima priverstinai pastatyti);

– 0,2 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 1 ml tirpalo 100 kg kūno svorio stipriai sedacijai, raumenų relaksacijai ir analgezijai, reikalingai atliekant dideles chirurgines operacijas, jei būtina derinyje su vietine ar laidine anestezija (ragų, nagų ir spenių amputacija, kastracija, sterilizacija, cezario pjūvis gulinčiam gyvūnui (kartu su gimdos relaksantais), dantų traukimui ir kt.). Stovėjimo galimybė yra dažniausiai sumažėjusi;

– 0,3 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 1,5 ml tirpalo 100 kg kūno svorio gali būti naudojama tik specialiais atvejais, esant labai skausmingoms arba ilgai truncančioms operacijoms ir norint sukelti ilgai truncančią sedaciją arba labai stiprią raumenų relaksaciją. Prieš operaciją kelias valandas gyvūnas turi būti alkinamas.

Švirkščiant ksilaziną galvijui į veną, dozę reikia sumažinti $\frac{1}{2}$ ar $\frac{1}{3}$, priklausomai nuo individualios gyvūno reakcijos. Į veną turi būti švirkščiamas labai lėtai.

Šuniui vaistą galima švirkšti į veną ar į raumenis, po 1–3 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,5–1,5 ml tirpalo 10 kg kūno svorio.

Katei švirkščiamas į raumenis ar po oda po 2–4 mg ksilazino 1 kg kūno svorio arba 0,1–0,2 ml tirpalo 1 kg kūno svorio.

Norint pailginti ar pagilinti efektą, vaistą galima švirkšti pakartotinai, bet negalima viršyti didžiausios rekomenduotinos dozės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Siekiant išvengti aspiracijos pašaru ar seilėmis, galvijų galva ir kaklas turi būti nuleisti žemiau. Jei atrajotojams pasireiškia timpanija, gyvulį reikėtų paguldyti ant krūtinės. Jei yra įmanoma, rekomenduotina likus 24 val. iki ksilazino naudojimo galvijui neduoti pašaro ir vandens.

Dėl vėmimo tikimybės šunys ir katės turi būti alkinami 12 val. prieš Xylazin 2 % švirkštimą.

Šunims ksilazino naudojimas visuomet skatina dujų kaupimąsi virškinimo trakte. Todėl sedacija ksilazinu gali būti nepageidautina atliekant rentgenografiją, nes gali trukdyti vertinant tyrimo rezultatus.

Manipuliacijos su gyvūnais, seduotais ksilazinu, turi būti atliekamos apdairiai, nes jie gali pabusti dėl išorinių dirgiklių ir staiga imtis gynybos judesių. Seduotų arklių, gynimosi judesiai galimi, kai yra manipuliuojama užpakalinėje kūno dalyje.

Jei prieš Xylazin 2 % injekciją buvo atlikta premedikacija kitais vaistais, pvz., sedacinė/ analgezinė premedikacija, ksilazino dozė turi būti sumažinta.

Rekomenduotina sulaukti sedacinio ksilazino poveikio prieš švirkščiant ketaminą šunims ir katėms. Gydyti gyvūnai turi būti stebimi (kvėpavimo ir širdies veikla, taip pat pooperaciniu metu) kol visiškai baigsis vaisto veikimas.

Pooperacinio miego metu reikia apsaugoti gyvūną nuo kūno temperatūros mažėjimo ir stiprios saulės šviesos.

Ksilazino negalima naudoti patelėms paskutinį vaikingumo trečdalį.

Ksilazino negalima naudoti kartu su epinefrinu, nes gali pasireikšti širdies skilvelių aritmija.

Ksilazinas stiprina CNS slopinančių (barbituratų, narkotizuojamųjų, analgetinių) vaistų veikimą, todėl gali tekti mažinti kiekvieno medikamento dozę. Pagrindinis, o kartais ir šalutinis ksilazino poveikis silpnėja panaudojus α_2 -adrenoreceptorių antagonistus.

Perdozavus gali pasireikšti aritmija, hipotenzija, sunkus CNS ir kvėpavimo centro slopinimas, galimi traukuliai. Tokiu atveju būtina taikyti dirbtinį kvėpavimą bei naudoti centrinius analeptikus.

Jei medicininio požiūriu yra reikalingas ksilazino efekto sutrumpinimas ar nutraukimas šunims ir katėms galima naudoti medžiagas su α_2 -antagonistiniu veikimu (johimbina, tolazolina, atipamezoli).

10. IŠLAUKA

Arklienai, galvijienai, subproduktams ir pienui – 1 para.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus buteliuką, – 28 d.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-09-16

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.