

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/94/0151
Tetra-Delta suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Laboratories Ltd.
Station Works
Newry
Co Down BT35 6JP
Lielbritānija

vai

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Beļģija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Tetra-Delta suspensija ievadīšanai tesmenī laktējošām govīm

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

10 ml suspensijas satur:

Aktīvās vielas:

Novobiocīna nātrija sāls, kas atbilst novobiocīnam	100 mg
Neomicīna sulfāts, kas atbilst neomicīnam	105 mg
Prokaīna penicilīns	100 mg
Dihidrostreptomicīna sulfāts, kas atbilst dihidrostreptomicīnam	100 mg
Prednizolons	10 mg

4. INDIKĀCIJA(-S)

Mastīta ārstēšanai govīm laktācijas periodā.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Laktējošas govīs.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Ievadīšanai tesmenī.

Viena injektoru saturu infūzijas veidā ievadīt inficētajā ceturksnī caur pupa kanālu tūlīt pēc slaukšanas.

Pirms lietošanas injektoru saskalināt.

Pirms infūzijas rūpīgi notīrīt un dezinficēt pupu, un uzmanīties, lai novērstu piesārņojuma nokļūšanu uz injektoru gala. Pēc infūzijas ir ieteicams izmantot šķīdumu pupu iemērkšanai vai aerosolu.

Ja nepieciešams, smagos gadījumos infūziju atkārtot pēc 24 vai 48 stundām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8. punktā.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 108 stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Penicilīni un cefalosporīni var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju) pēc injekcijas, inhalācijas, norīšanas vai saskares ar ādu. Pastiprināta jutība pret penicilīniem var izraisīt krustenisko rezistenci pret cefalosporīniem un otrādi. Alerģiskās reakcijas pret šīm vielām dažreiz var būt smagas.

Izvairīties no rīkošanās ar šīm veterinārajām zālēm, ja Jums ir zināma pastiprināta jutība pret tām vai ja Jums ir ieteikts nestrādāt ar šādām zālēm. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāievēro piesardzība, lai izvairītos no saskares ar tām, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

Ja pēc saskares ar šīm veterinārajām zālēm Jums attīstās tādi simptomi, kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja rodas tādi

nopietni simptomi kā sejas, lūpu un acu pietūkums vai apgrūtināta elpošana, nekavējoties meklēt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

04/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Kartona kaste ar 20, 24 vai 200 injektoriem.
Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.