

I PIELIKUMS
VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

EVICTO 15 mg šķīdums pilināšanai kaķiem un suņiem ≤2,5 kg
EVICTO 30 mg šķīdums pilināšanai suņiem 2,6–5,0 kg
EVICTO 45 mg šķīdums pilināšanai kaķiem 2,6–7,5 kg
EVICTO 60 mg šķīdums pilināšanai kaķiem 7,6–10 kg
EVICTO 60 mg šķīdums pilināšanai suņiem 5,1–10,0 kg
EVICTO 120 mg šķīdums pilināšanai suņiem 10,1–20,0 kg
EVICTO 240 mg šķīdums pilināšanai suņiem 20,1–40,0 kg
EVICTO 360 mg šķīdums pilināšanai suņiem 40,1–60,0 kg

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra vienreizējas devas (pipete) satur:

Aktīvās vielas:

EVICTO 15 mg kaķiem un suņiem	60 mg/ml šķīdums	Selamektīns	15 mg
EVICTO 30 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	30 mg
EVICTO 45 mg kaķiem	60 mg/ml šķīdums	Selamektīns	45 mg
EVICTO 60 mg kaķiem	60 mg/ml šķīdums	Selamektīns	60 mg
EVICTO 60 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	60 mg
EVICTO 120 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	120 mg
EVICTO 240 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	240 mg
EVICTO 360 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	360 mg

Palīgvielas:

Palīgvielu un citu sastāvdaļu kvalitatīvais sastāvs	Kvantitatīvais sastāvs, ja šī informācija ir būtiska veterināro zāļu pareizai ievadīšanai
Butilhidroksitoluols	0,8 mg/ml
Dipropilēna glikolmetilēteris	
Izopropilspirts	

Bezkrāsains līdz dzeltens šķīdums.

3. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

3.1. Mērķsugas

Suņi un kaķi.

3.2. Lietošanas indikācijas katrai mērķsugai

Kaķiem un suņiem:

- *Ctenocephalides* spp. izraisītas blusu invāzijas ārstēšanai un novēršanai vienu mēnesi pēc vienreizējas šo veterināro zāļu lietošanas. Tas ir rezultāts šo veterināro zāļu adulticīdai, larvicīdai un ovocīdai iedarbībai. Šīs veterinārās zāles ovocīdi darbojas 3 nedēļas pēc lietošanas. Samazinot blusu populāciju, grūsnu un laktējošu dzīvnieku ikmēneša ārstēšana palīdzēs novērst blusu invāziju metienā līdz septiņu nedēļu vecumam. Šīs veterinārās zāles var lietot kā daļu no blusu izraisītā alergiskā dermatīta ārstēšanas stratēģijas un savas ovocīdās un larvicīdās darbības dēļ var palīdzēt kontrolēt apkārtējā vidē esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.

- *Dirofilaria immitis* izraisītas sirdstārpu slimības novēršanai, lietojot reizi mēnesī. Šīs veterinārās zāles var droši lietot dzīvniekiem, kuri invadējušies ar pieaugušiem sirdstārpiem, tomēr saskaņā ar labu veterinārmedicīnisko praksi valstīs, kur ir sastopami slimību pārnēsātāji, pirms šo veterināro zāļu lietošanas visus dzīvniekus no 6 mēnešu vecuma ieteicams pārbaudīt uz pieaugušo sirdstārpu invāzijas esamību. Ieteicams suņus regulāri izmeklēt uz pieaugušo sirdstārpu invāziju kā neatņemamu daļu no sirdstārpu profilakses stratēģijas pat tad, ja šīs veterinārās zāles lieto reizi mēnesī. Šīs veterinārās zāles neiedarbojas uz pieaugušām *D. immitis*.
- Ausu ērcīšu (*Otodectes cynotis*) invāzijas ārstēšanai.

Kaķiem:

- Grauzējutu (*Felicola subrostratus*) invāzijas ārstēšanai.
- Pieaugušu zarnu apaļtārpu (*Toxocara cati*) invāzijas ārstēšanai.
- Pieaugušu zarnu āķtārpu (*Ancylostoma tubaeforme*) invāzijas ārstēšanai.

Suņiem:

- Grauzējutu (*Trichodectes canis*) invāzijas ārstēšanai.
- Kašķa ērcu invāzijas (izraisītāja *Sarcoptes scabiei*) ārstēšanai.
- Pieaugušu zarnu apaļtārpu (*Toxocara canis*) invāzijas ārstēšanai.

3.3. Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem līdz 6 nedēļu vecumam.

Nelietot kaķiem, kuri vienlaikus slimo ar kādu citu slimību vai kuri ir novājināti un ar samazinātu ķermeņa svaru (atbilstoši lielumam un vecumam).

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret jebkuru no palīgvielām.

3.4. Īpaši brīdinājumi

Dzīvniekus drīkst mazgāt 2 stundas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, nezaudējot to iedarbīgumu.

Nelietot, ja dzīvnieka apmatojums ir mitrs. Tomēr dzīvnieka mazgāšana ar šampūnu vai ūdeni 2 vai vairāk stundas pēc šo veterināro zāļu lietošanas nemazinās šo veterināro zāļu iedarbīgumu.

Ausu ērcīšu invāzijas gadījumā šķīdumu neievadīt tieši auss kanālā.

3.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Lietot šīs veterinārās zāles tikai uz ādas virsmas. Nelietot iekšķīgi vai parenterāli.

Ārstētos dzīvniekus sargāt no uguns un citiem aizdegšanās avotiem vismaz 30 minūtes vai kamēr dzīvnieka apmatojums ir izžuvis.

Svarīgi lietot šo veterināro zāļu devu atbilstoši norādījumiem, lai līdz minimumam samazinātu šķīduma daudzumu, ko dzīvnieks varētu ielaizīt. Ja kaķi sāk sevi izteikti laizīt, reti var novērot īslaicīgu, pastiprinātu siekalu izdalīšanos.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles ir viegli uzliesmojošas; sargāt no karstuma avotiem, dzirkstelēm, atklātas liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem. Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm nesmēķēt, neēst vai nedzert.

Šīs veterinārās zāles kairina ādu un acis. Pēc rīkošanās mazgāt rokas, un pēc veterināro zāļu saskares ar ādu, to nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja veterinārās zāles nejauši nonākušas acīs,

nekavējoties skalot acis ar ūdeni un meklēt medicīnisko palīdzību, un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Izvairīties no tiešas saskares ar ārstētiem dzīvniekiem, līdz lietošanas vieta ir sausa. Ārstēšanas dienā sargāt bērnus no piekļūšanas ārstētiem dzīvniekiem un neļaut dzīvniekiem gulēt pie saviem saimniekiem, jo īpaši pie bērniem. Izlietotos aplikatorus nekavējoties izmest, un tos nedrīkst atstāt bērniem redzamā vai pieejamā vietā.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret selamektīnu jāievada šīs veterinārās zāles piesardzīgi.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Neļaut ārstētiem dzīvniekiem peldēties ūdenstilpēs vismaz divas stundas pēc šo veterināro zāļu aplicēšanas.

3.6. Blakusparādības

Kaķi:

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):	Alopēcija lietošanas vietā ^{1,2} Apmatojuma izmaiņas lietošanas vietā ³ Hipersalivācija ⁴
Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Kairinājums lietošanas vietā ^{1,5} Neiroloģiskas pazīmes ⁶ (piemēram, krampji)

Suņi:

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):	Apmatojuma izmaiņas lietošanas vietā ³
Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):	Neiroloģiskas pazīmes ⁶ (piemēram, krampji)

¹ Parasti izzūd, taču dažos gadījumos var būt nepieciešama simptomātiska ārstēšana.

² Viegla un pārejoša.

³ Lokāla, īslaicīga apmatojuma savelšanās un/vai neliela daudzuma balta pulvera parādīšanās lietošanas vietā, kas parasti izzūd 24 stundu laikā pēc šo veterināro zāļu lietošanas, tas neietekmē šo veterināro zāļu drošumu vai iedarbīgumu.

⁴ Īslaicīga, ja dzīvnieks sāk sevi izteikti laizīt.

⁵ Pārejošs un lokāls.

⁶ Atgriezeniski, tāpat kā citiem makrocikliskajiem laktoniem.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ziņojumus vēlams nosūtīt ar veterinārārsta starpniecību vai nu tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim vai valsts kompetentajai iestādei, izmantojot nacionālo ziņošanas sistēmu. Attiecīgo kontaktinformāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

3.7. Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā

Auglība:

Drīkst lietot vaislas dzīvniekiem.

3.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

3.9. Lietošanas veids un devas

Uzpilināšanai.

Šīs veterinārās zāles lietot vienreizējas aplikācijas veidā vienā devā, kas nodrošina vismaz 6 mg/kg selamektīna. Ja ar šīm veterinārajām zālēm vienam un tam pašam dzīvniekam ir jāārstē vienlaikus vairākas dažādas izcelsmes invāzijas vai infekcijas, vienā reizē lietot tikai vienu ieteikto 6 mg/kg devu. Piemērotais ārstēšanas ilgums dažādu parazītu invāzijas gadījumā ir norādīts zemāk.

Lietot saskaņā ar šādu tabulu:

Kaķi (kg)	Veterinārās zāles	Selamektīna daudzums mg	Stiprums (mg/ml)	Lietotais tilpums (pipetes nominālais lielums, ml)
≤ 2,5	1 pipete Evicto 15 mg kaķiem un suņiem ≤2,5 kg	15	60	0,25
2,6-7,5	1 pipete Evicto 45 mg kaķiem 2,6-7,5 kg	45	60	0,75
7,6-10,0	1 pipete Evicto 60 mg kaķiem 7,6-10 kg	60	60	1,0
> 10	Atbilstoša pipešu kombinācija	Atbilstoša pipešu kombinācija	60	Atbilstoša pipešu kombinācija

Suņi (kg)	Veterinārās zāles	Lietotā selamektīna deva mg	Stiprums (mg/ml)	Lietotais tilpums (pipetes nominālais izmērs, ml)
≤ 2,5	1 pipete Evicto 15 mg kaķiem un suņiem ≤2,5 kg	15	60	0,25
2,6-5,0	1 pipete Evicto 30 mg suņiem 2,6-5 kg	30	120	0,25
5,1-10,0	1 pipete Evicto 60 mg suņiem 5,1-10 kg	60	120	0,5
10,1-20,0	1 pipete Evicto 120 mg suņiem 10,1-20 kg	120	120	1,0
20,1-40,0	1 pipete Evicto 240 mg suņiem 20,1-40 kg	240	120	2,0
40,1-60,0	1 pipete Evicto 360 mg suņiem 40,1-60 kg	360	120	3,0
> 60	Atbilstoša pipešu kombinācija	Atbilstoša pipešu kombinācija	60/120	Atbilstoša pipešu kombinācija

Blusu invāzijas ārstēšanai un novēršanai (kaķiem un suņiem):

Pēc šo veterināro zāļu aplikācijas, pieaugušās blusas uz dzīvnieka tiek nogalinātas, vairs netiek dētas dzīvotspējīgas olaņas, un tiek nogalināti arī kāpuri (kas atrodami tikai apkārtējā vidē). Tas aptur blusu vairošanos un pārtrauc blusu attīstības ciklu un var palīdzēt kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.

Blusu invāzijas novēršanai lietot šīs veterinārās zāles ar mēneša intervālu visas blusu aktivitātes sezonas garumā, sākot vienu mēnesi pirms blusu aktivitātes sākšanās. Samazinot blusu populāciju, grūsnu un

laktējošu dzīvnieku ikmēneša ārstēšana palīdzēs novērst blusu invāziju metienā līdz septiņu nedēļu vecumam.

Lai izmantotu šīs veterinārās zāles kā daļu no blusu izraisīta alerģiskā dermatīta ārstēšanas stratēģijas, tās jālieto ar mēneša intervālu.

Sirdstārpu slimības novēršanai (kaķiem un suņiem):

Šīs veterinārās zāles var lietot visa gada garumā vai vismaz vienu mēnesi pirms dzīvnieka pirmās saskares ar odiem, un turpmāk reizi mēnesī līdz odu sezonas beigām.

Lietot pēdējā devu viena mēneša laikā pēc pēdējās saskares ar odiem. Ja viena šo veterināro zāļu deva ir izlaista un ir pārsniegts ikmēneša intervāls, šo veterināro zāļu tūlītēja aplicēšana un ikmēneša lietošanas atsākšana samazinās pieaugušo sirdstārpu attīstības iespēju. Ja sirdstārpu slimības novēršanai šīs veterinārās zāles tiek aizvietotas ar citu sirdstārpu profilakses līdzekli, tā pirmo devu lietot viena mēneša laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas.

Zarnu apaltārpu invāzijas ārstēšanai (kaķiem un suņiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Grauzējutu invāzijas ārstēšanai (kaķiem un suņiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai (kaķiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai (suņiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu. Ārstēšanas laikā uzmanīgi iztīrīt netīrumus no ārējās auss kanāla. Tā kā dažiem dzīvniekiem var būt nepieciešam atkārtota ārstēšana, ieteicama turpmāka veterinārā izmeklēšana 30 dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.


Āktārpu invāzijas ārstēšanai (kaķiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Kašķa ērcu invāzijas ārstēšanai (suņiem):

Lai pilnībā likvidētu ērcītes, divus mēnešus pēc kārtas lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Uzpilināt uz ādas skausta apvidū pirms lāpstiņām.



Kā lietot:

Izņemiet veterināro zāļu pipeti no aizsargājošā iepakojuma.

1. Turot pipeti vertikāli, noņemiet vāciņu.
2. Apgrieziet vāciņu otrādi un uzlieciet atpakaļ uz pipetes gala. Spiediet vāciņu uz leju, lai pārdurtu pipetes izolējošo materiālu.

Pirms zāļu aplicēšanas noņemiet vāciņu.

3. Pašķiriet dzīvnieka apmatojumu uz skausta apvidū pirms lāpstiņām, lai atsegtu nelielu ādas laukumu.

Pielieciet veterināro zāļu pipetes galu tieši pie ādas neiemasējot.

Stingri saspiediet pipeti tā, lai viss pipetes saturs pilnībā nonāk tieši uz ādas vienā vietā. Izvairieties no veterināro zāļu saskares ar pirkstiem.

3.10. Pārdozēšanas simptomi (ārkārtas procedūras un antidoti, ja piemērojami)

Pēc 10 reizes pārsniegtas ieteiktās selamektīna devas lietošanas blakusparādības netika novērotas.

Lietojot trīskāršu ieteikto selamektīna devu kaķiem un suņiem ar pieaugušu sirdstārpu invāziju, blakusparādības netika novērotas. Lietojot trīskāršu ieteikto selamektīnu devu arī sieviešu un vīriešu kārtas vaislas kaķiem un suņiem, tostarp grūsnēm un laktējošiem sieviešu kārtas dzīvniekiem, kas zīdīja savus jaundzimušos, un pieckāršu ieteikto devu pret ivermektīnu jutīgiem kollijiem, blakusparādības netika novērotas.

3.11. Īpaši lietošanas ierobežojumi un īpaši lietošanas nosacījumi, tostarp antimikrobiālo un pretparazītu veterināro zāļu lietošanas ierobežojumi, lai ierobežotu rezistences veidošanās risku

Nav piemērojami.

3.12. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

4. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

4.1. ATKĶ vet kods: QP54AA05

4.2. Farmakodinamiskās īpašības

Selamektīns ir pussintētisks avermektīna klases savienojums. Selamektīns paralizē un/vai nonāvē plašu bezmugurkaulnieku parazītu klāstu, ietekmējot hlorīda kanālu vadītspēju un izraisot normālu impulsu pārvades traucējumus starp nervu šūnām. Tas kavē apaļtārpu nervu šūnu elektrisko aktivitāti un posmkāju muskuļu šūnu darbību, izraisot to paralīzi un/vai nāvi.

Selamektīnam piemīt adulticīda, ovocīda un larvicīda aktivitāte pret blusām. Tādējādi tas efektīvi pārtrauc blusu dzīves ciklu, nonāvējot pieaugušas blusas (uz dzīvnieka), novēršot olniņu izšķilšanos (uz dzīvnieka un tā apkārtējā vidē) un nonāvējot larvas (tikai apkārtējā vidē). Ar selamektīnu ārstētu lolojumdzīvnieku atmirusī āda, spalvas un citi atkritumi bojā blusu olniņas un kāpurus, kas iepriekš nav pakļauti selamektīna iedarbībai, tādējādi palīdzot kontrolēt apkārtējā vidē esošo blusu invāziju vietās, kur atrodas dzīvnieki. Pierādīta arī aktivitāte pret sirdstārpu kāpuriem.

4.3. Farmakokinētiskās īpašības

Pēc lietošanas uz ādas selamektīns uzsūcas caur ādu, kaķiem un suņiem maksimālo koncentrāciju plazmā sasniedzot attiecīgi aptuveni pēc 1 un 3 dienām.

Pēc uzsūkšanās caur ādu selamektīns izplatās sistēmiski un lēni izdalās no plazmas, par ko liecina nosakāma selamektīna koncentrācija plazmā suņiem un kaķiem 30 dienas pēc vienreizējas 6 mg/kg devas ārīgas lietošanas. Par selamektīna ilgstošu saglabāšanos un lēnu izdalīšanos no plazmas liecina

arī eliminācijas pusperioda vērtības, kas kaķiem un suņiem ir attiecīgi 8 un 11 dienas. Selamektīna sistēmiskā saglabāšanās plazmā un ekstensīvas vielmaiņas neesamība nodrošina efektīvu selamektīna koncentrāciju visā laikā starp šo veterināro zāļu devu lietošanas reizēm (30 dienas).

5. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

5.1. Būtiska nesaderība

Nav piemērojama.

5.2. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētajā iepakojumā: 3 gadi.

5.3. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt neatvērtu paciņu sausā vietā, lai pasargātu no gaismas un mitruma. Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.

5.4. Tiešā iepakojuma veids un saturs

Veterinārās zāles pieejamas iepakojumā pa vienai, četrām un divdesmit četrām pipetēm (visi pipešu lielumi).

Šīs veterinārās zāles iepildītas vienreizējas devas polipropilēna pipetēs, kas ievietotas alumīnija paciņās.

1 pipete EVICTO 15 mg kaķiem un suņiem satur 0,25 ml 60 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 45 mg kaķiem satur 0,75 ml 60 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 60 mg kaķiem satur 1,0 ml 60 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 30 mg suņiem satur 0,25 ml 120 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 60 mg suņiem satur 0,5 ml 120 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 120 mg suņiem satur 1,0 ml 120 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 240 mg suņiem satur 2,0 ml 120 mg/ml šķīduma.

1 pipete EVICTO 360 mg suņiem satur 3,0 ml 120 mg/ml šķīduma.

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

5.5. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo selamektīns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm.

6. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

VIRBAC

7. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURS(-I)

8. PIRMĀS TIRDZniecības ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS DATUMS

Pirmās tirdzniecības atļaujas piešķiršanas datums: : 19/07/2019

9. VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

{DD/MM/GGGG}

10. VETERINĀRO ZĀĻU KLASIFIKĀCIJA

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

II PIELIKUMS

CITI TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS

Nav.

III PIELIKUMS

MARKĒJUMS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

A. MARKĒJUMS

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA**KASTĪTE 15 MG (1, 4 VAI 24 PIPETES)****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

Evicto 15 mg šķīdums pilināšanai

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Selamektīns 15 mg/pipete

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

1 pipete
4 pipetes
24 pipetes

x 0,25 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi un suņi $\leq 2,5$ kg

5. INDIKĀCIJAS**6. LIETOŠANAS VEIDI**

Uzpilināšanai.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS**8. DERĪGUMA TERMIŅŠ**

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt neatvērtu paciņu sausā vietā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--

VIRBAC

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

EU/2/19/242/001

EU/2/19/242/002

EU/2/19/242/003

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

KASTĪTE 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (1, 4 UN 24 PIPETES)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Evicto 30 mg šķīdums pilināšanai
Evicto 60 mg šķīdums pilināšanai
Evicto 120 mg šķīdums pilināšanai
Evicto 240 mg šķīdums pilināšanai
Evicto 360 mg šķīdums pilināšanai

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Selamektīns 30 mg/pipete
Selamektīns 60 mg/pipete
Selamektīns 120 mg/pipete
Selamektīns 240 mg/pipete
Selamektīns 360 mg/pipete

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

1 pipete
4 pipetes
24 pipetes

x 0,25 ml
x 0,5 ml
x 1,0 ml
x 2,0 ml
x 3,0 ml

4. MĒRĶSUGAS

Suņi 2,6–5,0 kg
Suņi 5,1–10,0 kg
Suņi 10,1–20,0 kg
Suņi 20,1–40,0 kg
Suņi 40,1–60,0 kg

5. INDIKĀCIJAS

6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt neatvērtu paciņu sausā vietā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS

VIRBAC

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI

EU/2/19/242/010

EU/2/19/242/011

EU/2/19/242/012

EU/2/19/242/013

EU/2/19/242/014

EU/2/19/242/015

EU/2/19/242/016

EU/2/19/242/017

EU/2/19/242/018

EU/2/19/242/019

EU/2/19/242/020

EU/2/19/242/021

EU/2/19/242/022

EU/2/19/242/023

EU/2/19/242/024

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

KASTĪTE 45 mg, 60 mg (1, 4 UN 24 PIPETES)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Evicto 45 mg šķīdums pilināšanai

Evicto 60 mg šķīdums pilināšanai

2. INFORMĀCIJA PAR AKTĪVAJĀM VIELĀM

Selamektīns 45 mg/pipete

Selamektīns 60 mg/pipete

3. IEPAKOJUMA LIELUMS

1 pipete

4 pipetes

24 pipetes

x 0,75 ml

x 1,0 ml

4. MĒRĶSUGAS

Kaķi 2,6-7,5 kg

Kaķi 7,6-10,0 kg

5. INDIKĀCIJAS

6. LIETOŠANAS VEIDI

Uzpilināšanai.

7. IEROBEŽOJUMU PERIODS

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mēnesis/gads}

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt neatvērtu paciņu sausā vietā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

10. VĀRDI “PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU”

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

11. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

12. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

13. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS TURĒTĀJS
--

VIRBAC

14. TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS NUMURI
--

EU/2/19/242/004

EU/2/19/242/005

EU/2/19/242/006

EU/2/19/242/007

EU/2/19/242/008

EU/2/19/242/009

15. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

Pacinas 15 mg, 30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Evicto



≤ 2,5 kg

2,6–5,0 kg

2,6–7,5 kg

7,6–10,0 kg

5,1–10,0 kg

10,1–20,0 kg

20,1–40,0 kg

40,1–60,0 kg

2. AKTĪVO VIELU KVANTITATĪVIE DATI

15 mg

30 mg

45 mg

60 mg

120 mg

240 mg

360 mg

3. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Exp. {mm/gggg}

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Veterināro zāļu nosaukums

Evicto 15 mg šķīdums pilināšanai kaķiem un suņiem $\leq 2,5$ kg
Evicto 30 mg šķīdums pilināšanai suņiem 2,6–5,0 kg
Evicto 45 mg šķīdums pilināšanai kaķiem 2,6–7,5 kg
Evicto 60 mg šķīdums pilināšanai kaķiem 7,6–10,0 kg
Evicto 60 mg šķīdums pilināšanai suņiem 5,1–10,0 kg
Evicto 120 mg šķīdums pilināšanai suņiem 10,1–20,0 kg
Evicto 240 mg šķīdums pilināšanai suņiem 20,1–40,0 kg
Evicto 360 mg šķīdums pilināšanai suņiem 40,1–60,0 kg

2. Sastāvs

Katra vienreizējas devas (pipete) satur:

Aktīvās vielas:

Evicto 15 mg kaķiem un suņiem	60 mg/ml šķīdums	Selamektīns	15 mg
Evicto 30 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	30 mg
Evicto 45 mg kaķiem	60 mg/ml šķīdums	Selamektīns	45 mg
Evicto 60 mg kaķiem	60 mg/ml šķīdums	Selamektīns	60 mg
Evicto 60 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	60 mg
Evicto 120 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	120 mg
Evicto 240 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	240 mg
Evicto 360 mg suņiem	120 mg/ml šķīdums	Selamektīns	360 mg

Palīgvielas:

Butilhidroksitoluols 0,8 mg/ml

Bezkrāsains līdz dzeltens šķīdums.

3. Mērķsugas

Suņi un kaķi.



4. Lietošanas indikācijas

Kaķiem un suņiem:

- *Ctenocephalides* spp. izraisītas blusu invāzijas ārstēšana un novēršanai vienu mēnesi pēc vienreizējas šo veterināro zāļu lietošanas. Tas ir rezultāts šo veterināro zāļu adulticīdai, larvicīdai un ovocīdai iedarbībai. Šīs veterinārās zāles ovocīdi darbojas 3 nedēļas pēc lietošanas. Samazinot blusu populāciju, grūsnu un laktējošu dzīvnieku ikmēneša ārstēšana palīdzēs novērst blusu invāziju metienā līdz septiņu nedēļu vecumam. Šīs veterinārās zāles var lietot kā daļu no blusu izraisītā alerģiskā dermatīta ārstēšanas stratēģijas un savas ovocīdās un larvicīdās darbības dēļ var palīdzēt kontrolēt apkārtējā vidē esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.

- *Dirofilaria immitis* izraisītas sirdstārpu slimības novēršanai, lietojot reizi mēnesī. Šīs veterinārās zāles var droši lietot dzīvniekiem, kuri invadējušies ar pieaugušiem sirdstārpiem, tomēr saskaņā ar labu veterinārmedicīnisko praksi valstīs, kur ir sastopami slimību pārnēsātāji, pirms šo veterināro zāļu lietošanas visus dzīvniekus no 6 mēnešu vecumaieteicams pārbaudīt uz pieaugušo sirdstārpu invāzijas esamību. Ieteicams suņus regulāri izmeklēt uz pieaugušo sirdstārpu invāziju kā neatņemamu daļu no sirdstārpu profilakses stratēģijas pat tad, ja šīs veterinārās zāles lieto reizi mēnesī. Šīs veterinārās zāles neiedarbojas uz pieaugušām *D. immitis*.
- Ausu ērcīšu (*Otodectes cynotis*) invāzijas ārstēšanai.

Kaķiem:

- Grauzējutu (*Felicola subrostratus*) invāzijas ārstēšanai.
- Pieaugušu zarnu apaļtārpu (*Toxocara cati*) invāzijas ārstēšanai.
- Pieaugušu zarnu āķtārpu (*Ancylostoma tubaeforme*) invāzijas ārstēšanai.

Suņiem:

- Grauzējutu (*Trichodectes canis*) invāzijas ārstēšanai.
- Kašķa ērcu invāzijas (kura izraisītājs ir *Sarcoptes scabiei*) ārstēšanai.
- Pieaugušu zarnu apaļtārpu (*Toxocara canis*) invāzijas ārstēšanai.

5. Kontrindikācijas

Nelietot dzīvniekiem līdz 6 nedēļu vecumam.

Nelietot kaķiem, kuri vienlaikus slimo ar kādu citu slimību vai kuri ir novājināti un ar samazinātu ķermeņa svaru (atbilstoši lielumam un vecumam).

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, vai pret jebkuru no palīgvielām.

6. Īpaši brīdinājumi

Īpaši brīdinājumi:

Dzīvniekus drīkst mazgāt 2 stundas pēc šo veterināro zāļu lietošanas, nezaudējot to iedarbīgumu.

Nelietot, ja dzīvnieka apmatojums ir mitrs. Tomēr dzīvnieka mazgāšana ar šampūnu vai ūdeni 2 vai vairāk stundas pēc šo veterināro zāļu lietošanas nemazinās to iedarbīgumu.

Ausu ērcīšu invāzijas gadījumā šķīdumu neievadīt tieši auss kanālā.

Īpaši piesardzības pasākumi drošai lietošanai mērksugām:

Lietot šīs veterinārās zāles tikai uz ādas virsmas. Nelietot iekšķīgi vai parenterāli.

Dzīvniekiem, kuriem lietotas šīs veterinārās zāles, vismaz 30 minūtes vai līdz brīdim, kad apmatojums ir nožuvis, jāatrodas atstatu no uguns un citiem aizdegšanās avotiem.

Svarīgi lietot šo veterināro zāļu devu atbilstoši norādījumiem, lai līdz minimumam samazinātos šķīduma daudzums, ko dzīvnieks varētu ielaizīt. Ja kaķi sāk sevi izteikti laizīt, reti var novērot īslaicīgu, pastiprinātu siekalu izdalīšanos.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura ievada veterinārās zāles dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles ir ļoti viegli uzliesmojošas; sargāt no karstuma avotiem, dzirkstelēm, atklātās liesmas vai citiem aizdegšanās avotiem.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm nesmēķēt, neēst vai nedzert.

Šīs veterinārās zāles kairina ādu un acis. Pēc rīkošanās mazgāt rokas, pēc veterināro zāļu saskares ar ādu, to nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja veterinārās zāles nejauši nonākušas acīs,

nekavējoties skalot acis ar ūdeni un meklēt medicīnisko palīdzību, un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Izvairīties no tiešas saskares ar ārstētiem dzīvniekiem, līdz lietošanas vieta ir sausa. Ārstēšanas dienā sargāt bērnus no piekļūšanas ārstētiem dzīvniekiem un neļaut dzīvniekiem gulēt pie saviem saimniekiem, jo īpaši pie bērniem. Izlietotos aplikatorus nekavējoties izmest, un tos nedrīkst atstāt bērniem redzamā vai pieejamā vietā.

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret selamektīnu jāievada šīs veterinārās zāles piesardzīgi.

Īpaši piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:

Neatļaut ārstētiem dzīvniekiem peldēties ūdenstilpēs vismaz divas stundas pēc šo veterināro zāļu aplicēšanas.

Grūsnība un laktācija:

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

Auglība:

Drīkst lietot vaislas dzīvniekiem.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav zināma.

Pārdozēšana:

Pēc 10 reizes pārsniegtas ieteiktās selamektīna devas lietošanas blakusparādības netika novērotas. Lietojot trīskāršu ieteikto selamektīna devu kaķiem un suņiem ar pieaugušu sirdstārpu invāziju, blakusparādības netika novērotas. Lietojot trīskāršu ieteikto selamektīnu devu arī sievietēm un vīriešu kārtas vaislas kaķiem un suņiem, tostarp grūsnēm un laktējošiem sievietēm kārtas dzīvniekiem, kas zīdīja savus jaundzimušos, un pieckāršu ieteikto devu pret ivermektīnu jutīgiem kollijiem, blakusparādības netika novērotas.

7. Blakusparādības

Kaķi:

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):
Alopēcija lietošanas vietā (apmatojuma izkrišana) ^{1,2}
Apmatojuma izmaiņas lietošanas vietā ³
Hipersalivācija (pastiprināta siekalošanās) ⁴
Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):
Kairinājums lietošanas vietā ^{1,5}
Neiroloģiskas pazīmes ⁶ (piemēram, krampji)

Suņi:

Reti (1 līdz 10 dzīvniekiem / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem):
Apmatojuma izmaiņas lietošanas vietā ³
Ļoti reti (<1 dzīvniekam / 10 000 ārstētajiem dzīvniekiem, tostarp atsevišķi ziņojumi):
Neiroloģiskas pazīmes ⁶ (piemēram, krampji)

¹ Parasti izzūd, taču dažos gadījumos var būt nepieciešama simptomātiska ārstēšana.

² Viegla un pārejoša.

³ Lokāla, īslaicīga apmatojuma savelšanās un/vai neliela daudzuma balta pulvera parādīšanās lietošanas vietā, kas parasti izzūd 24 stundu laikā pēc šo veterināro zāļu lietošanas, tas neietekmē šo veterināro zāļu drošumu vai iedarbīgumu.

⁴ Īslaicīga, ja dzīvnieks sāk sevi izteikti laizīt.

⁵ Pārejošs un lokāls.

⁶ Atgriezeniski, tāpat kā citiem makrocikliskajiem laktoniem.

Ir svarīgi ziņot par blakusparādībām. Tas ļauj pastāvīgi uzraudzīt veterināro zāļu drošumu. Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu. Jūs varat ziņot par jebkurām blakusparādībām arī tirdzniecības atļaujas turētājam vai tā vietējam pārstāvim, izmantojot kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās vai nacionālo ziņošanas sistēmu: {informācija par nacionālo ziņošanas sistēmu}

8. Deva katrai dzīvnieku sugai, lietošanas veids un metode

Uzpilināšanai.

Uzpilināt uz ādas skausta apvidū pirms lāpstiņām.

Šīs veterinārās zāles lietot vienreizējas aplikācijas veidā vienā devā, kas nodrošina vismaz 6 mg/kg selamektīna. Ja ar šīm veterinārajām zālēm vienam un tam pašam dzīvniekam ir jāārstē vienlaikus vairākas dažādas izcelsmes invāzijas vai infekcijas, vienā reizē lietot tikai vienu ieteikto 6 mg/kg devu. Piemērotais ārstēšanas ilgums dažādu parazītu invāzijas gadījumā ir norādīts zemāk.

Lietot veterinārās zāles saskaņā ar šādu tabulu:

Kaķi (kg)	Veterinārās zāles	Lietotā selamektīna deva mg	Stiprums (mg/ml)	Lietotais tilpums (pipetes nominālais izmērs, ml)
≤ 2,5	1 pipete Evicto 15 mg kaķiem un suņiem ≤2,5 kg	15	60	0,25
2,6-7,5	1 pipete Evicto 45 mg kaķiem 2,6-7,5 kg	45	60	0,75
7,6-10,0	1 pipete Evicto 60 mg kaķiem 7,6-10 kg	60	60	1,0
> 10	Atbilstoša pipešu kombinācija	Atbilstoša pipešu kombinācija	60	Atbilstoša pipešu kombinācija

Suņi (kg)	Veterinārās zāles	Lietotā selamektīna deva mg	Stiprums (mg/ml)	Lietotais tilpums (pipetes nominālais izmērs, ml)
≤ 2,5	1 pipete Evicto 15 mg kaķiem un suņiem ≤2,5 kg	15	60	0,25
2,6-5,0	1 pipete Evicto 30 mg suņiem 2,6-5 kg	30	120	0,25
5,1-10,0	1 pipete Evicto 60 mg suņiem 5,1-10 kg	60	120	0,5
10,1-20,0	1 pipete Evicto 120 mg suņiem 10,1-20 kg	120	120	1,0
20,1-40,0	1 pipete Evicto 240 mg suņiem 20,1-40 kg	240	120	2,0
40,1-60,0	1 pipete Evicto 360 mg suņiem 40,1-60 kg	360	120	3,0
> 60	Atbilstoša pipešu kombinācija	Atbilstoša pipešu kombinācija	60/120	Atbilstoša pipešu kombinācija

Blusu invāzijas ārstēšanai un novēršanai (kaķiem un suņiem):

Dzīvniekiem pēc sešu nedēļu vecuma:

Pēc šo veterināro zāļu aplikācijas, pieaugušās blusas un kāpuri uz dzīvnieka tiek nogalinātas, vairs netiek dētas dzīvotspējīgas olīņas. Tas aptur blusu vairošanos un pārtrauc blusu attīstības ciklu un var palīdzēt kontrolēt esošo blusu invāziju dzīvniekiem pieejamās vietās.

Blusu invāzijas novēršanai lietot šīs veterinārās zāles ar mēneša intervālu visas blusu aktivitātes sezonas garumā, sākot vienu mēnesi pirms blusu aktivitātes sākšanās. Tādējādi tiek nogalinātas uz dzīvnieka esošās blus, tās vairs nedēļ dzīvotspējīgas olīņas, un tiek nogalināti arī kāpuri (kas atrodami tikai apkārtējā vidē). Tas pārtrauc blusu dzīves ciklu un novērš jaunu blusu invāziju.

Lai izmantotu šīs veterinārās zāles kā daļu no blusu izraisītā alergiskā dermatīta ārstēšanas stratēģijas, tās jālieto ar mēneša intervālu.

Grūsnu un laktējošu dzīvnieku ārstēšana, lai novērstu blusu invāziju kucēniem un kaķēniem:

Samazinot blusu populāciju, grūsnu un laktējošu dzīvnieku ikmēneša ārstēšana palīdzēs novērst blusu invāziju metienā līdz septiņu nedēļu vecumam.

Sirdstārpu slimības novēršanai (kaķiem un suņiem):

Šīs veterinārās zāles var lietot visa gada garumā vai vismaz vienu mēnesi pirms dzīvnieka pirmās saskares ar odiem, un turpmāk reizi mēnesī līdz odu sezonas beigām.

Lietot pēdējā devu viena mēneša laikā pēc pēdējās saskares ar odiem. Ja viena šo veterināro zāļu deva ir izlaista un ir pārsniegts ikmēneša intervāls, šo veterināro zāļu tūlītēja aplicēšana un ikmēneša lietošanas atsākšana samazinās pieaugušo sirdstārpu attīstības iespēju. Ja sirdstārpu slimības novēršanai šīs veterinārās zāles tiek aizvietotas ar citu sirdstārpu profilakses līdzekli, tā pirmo devu lietot viena mēneša laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas.

Zarnu apaltārpu invāzijas ārstēšanai (kaķiem un suņiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Grauzējutu invāzijas ārstēšanai (kaķiem un suņiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšanai (kaķiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Ausu ērcīšu invāzijas ārstēšana (suņiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu. Ārstēšanas laikā uzmanīgi iztīrīt netīrumus no ārējās auss kanāla. Tā kā dažiem dzīvniekiem var būt nepieciešam atkārtota ārstēšana, ieteicama turpmāka veterinārā izmeklēšana 30 dienas pēc šo veterināro zāļu lietošanas.


Āktārpu invāzijas ārstēšanai (kaķiem):

Lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

Kašķa ērcu invāzijas ārstēšanai (suņiem):

Lai pilnībā likvidētu ērcītes, divus mēnešus pēc kārtas lietot vienreizēju šo veterināro zāļu devu.

9. Ieteikumi pareizai lietošanai



Izņemiet veterināro zāļu pipeti no aizsargājošā iepakojuma

1. Turot pipeti vertikāli, noņemiet vāciņu.
 2. Apgrieziet vāciņu otrādi un uzlieciet atpakaļ uz pipetes gala. Spiediet vāciņu uz leju, lai pārdurtu pipetes izolējošo materiālu. Pirms zāļu lietošanas noņemiet uzgali.
 3. Pašķiriet dzīvnieka apmatojumu uz skausta apvidū pirms lāpstiņām, lai atsegta nelielu ādas laukumu.
- Pielieciet veterināro zāļu pipetes galu tieši pie ādas neiemasējot.
Stingri saspiediet pipeti tā, lai viss pipetes saturs pilnībā nonāk tieši uz ādas vienā vietā.
Izvairieties no veterināro zāļu saskares ar pirkstiem.

10. Ierobežojumu periods

Nav piemērojams.

11. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt neatvērtu paciņu sausā vietā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešama īpaša uzglabāšanas temperatūra.
Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz pipetes, paciņas un uz kastītes pēc Exp. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

12. Īpaši norādījumi atkritumu iznīcināšanai

Neizmest veterinārās zāles kanalizācijā vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

Šīs veterinārās zāles nedrīkst nonākt ūdenstilpēs, jo selamektīns var būt bīstams zivīm un citiem ūdens organismiem.

Visu neizlietoto veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai izmantot nevajadzīgo veterināro zāļu nodošanas shēmas saskaņā ar nacionālajām prasībām un jebkurām valsts atkritumu savākšanas sistēmām, kas piemērojamas attiecīgajām veterinārajām zālēm. Šādi pasākumi palīdzēs aizsargāt vidi.

Jautājiet savam veterinārārstam vai farmaceitam, kā atbrīvoties no nevajadzīgām veterinārajām zālēm.

13. Veterināro zāļu klasifikācija

Recepšu veterinārās zāles.

14. Tirdzniecības atļaujas numuri un iepakojuma lielumi

EU/2/19/242/001-024

1 pipete Evicto 15 mg kaķiem un suņiem satur 0,25 ml 60 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 45 mg kaķiem satur 0,75 ml 60 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 60 mg kaķiem satur 1,0 ml 60 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 30 mg suņiem satur 0,25 ml 120 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 60 mg suņiem satur 0,5 ml 120 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 120 mg suņiem satur 1,0 ml 120 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 240 mg suņiem satur 2,0 ml 120 mg/ml šķīduma.
1 pipete Evicto 360 mg suņiem satur 3,0 ml 120 mg/ml šķīduma.

Veterinārās zāles pieejamas iepakojumā pa vienai, četrām un divdesmit četrām pipetēm (visi pipešu lielumi).

Ne visi iepakojuma lielumi var tikt izplatīti.

15. Datums, kad lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

{DD/MM/GGGG}

Sīkāka informācija par šīm veterinārajām zālēm ir pieejama Savienības zāļu datubāzē (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktinformācija:

Tirdzniecības atļaujas turētājs un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

VIRBAC
1^{ère} Avenue 2065 m LID
06516 Carros
Francija

Vietējie pārstāvji un kontaktinformācija, lai ziņotu par iespējamām blakusparādībām:

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar tirdzniecības atļaujas turētāja vietējo pārstāvi.

België/Belgique/Belgien
VIRBAC BELGIUM NV
Esperantolaan 4
BE-3001 Leuven
Tél/Tel : +32-(0)16 387 260
phv@virbac.be

Република България

Lietuva
OŪ ZOOVETVARU
Uusaru 5
EE-76505 Saue/Harjumaa
Estija
Tel: + 372 56480207
pv@zoovet.eu

Luxembourg/Luxemburg
VIRBAC BELGIUM NV

VIRBAC
1ère avenue 2065m LID
FR-06516 Carros
Франция
Тел: +33-(0)4 92 08 73 00

Česká republika
VIRBAC Czech Republic s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: +420 608 836 529

Danmark
VIRBAC Danmark A/S
Profilvej 1
DK-6000 Kolding
Tlf: +45 75521244
virbac@virbac.dk

Deutschland
VIRBAC Tierarzneimittel GmbH
Rögen 20
DE-23843 Bad Oldesloe
Tel: 49 (4531) 805 111

Eesti
OÜ ZOOVETVARU
Uusaru 5
EE-76505 Saue/Harjumaa
Tel: + 372 56480207
pv@zoovet.eu

Ελλάδα
VIRBAC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
13° χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
EL-14452, Μεταμόρφωση
Τηλ.: +30 210 6219520
info@virbac.gr

España
VIRBAC ESPAÑA, S.A.
Angel Guimerá 179-181
ES-08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel: + 34 93 470 79 40

France
VIRBAC France
13° rue LID
FR-06517 Carros
Tél : 0 800 73 09 10

Esperantolaan 4
BE-3001 Leuven
Belgique / Belgien
Tél/Tel: +32-(0)16 387 260
info@virbac.be

Magyarország
VIRBAC HUNGARY KFT
Dózsa György út 84. B épület
HU-1068 Budapest
Tel: +36703387177
akos.csoman@virbac.hu

Malta
VIRBAC
1ère avenue 2065 m LID
FR-06516 Carros
Franza
Tel: + 33-(0)4 92 08 73 00

Nederland
VIRBAC NEDERLAND BV
Hermesweg 15
NL-3771 ND-Barneveld
Tel: 31-(0) 342 427 127
phv@virbac.nl

Norge
VIRBAC Danmark A/S
Profilvej 1
DK-6000 Kolding
Danmark
Tlf: + 45 75521244
virbac@virbac.dk

Österreich
VIRBAC Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
AT-1180 Wien
Tel: +43-(0)1-218 34 26-0

Polska
VIRBAC Sp. z o.o.
ul. Puławska 314
PL 02-819 Warszawa
Tel.: + 48 22 855 40 46

Portugal
VIRBAC de Portugal Laboratórios, Lda.
Rua do Centro Empresarial
Edif.13-Piso 1- Escrit.3
Quinta da Beloura
2710-693 Sintra (Portugal)

Tel: +351 219 245 020

Hrvatska

CENTRALNA VETERINARSKA AGENCIJA
d.o.o. (CVA)
Prve Ravnice 2e, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel: + 385 91 46 55 115
cva@cva.hr

România

Altius SA
Str. Zăgazului nr. 21-25, Corp A, et 8 si 8A
Ap. A.8.2, sect 1, cod 014261, București,
Romania
Tel: + 40 021 310 88 80

Ireland

VIRBAC IRELAND
McInerney & Saunders
38, Main Street
Swords, Co Dublin
K67E0A2
Republic Of Ireland
Tel: +44 (0)-1359 243243

Slovenija

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
Brodišče 12, 1236 Trzin
Slovenija
Tel: + 386 1 2529 113
farmakovigilanca@medical-intertrade.si

Ísland

VIRBAC
1^{ère} avenue 2065 m LID
FR-06516 Carros
Frakkland
Simi: + 33-(0)4 92 08 73 00

Slovenská republika

VIRBAC Czech Republic s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: +420 608 836 529

Italia

VIRBAC S.r.l
Via Ettore Bugatti, 15
IT-20142 Milano
Tel: +39 02 40 92 47 1

Suomi/Finland

BIOFARM OY
Yrittäjäntie 20
FI-03600 Karkkila
Puh/Tel: +358-9-225 2560
haittavaikutukset@biofarm.fi

Κύπρος

VET2VETSUPPLIES LTD
Γαλιλαιου 60
3011 Λεμεσος
Κύπρος
Τηλ: + 357 96116730
info@vet2vetsupplies.com

Sverige

VIRBAC Danmark A/S Filial Sverige
Box 1027
SE-171 21 Solna
Tel: +45 75521244
virbac@virbac.dk

Latvija

OÜ ZOOVETVARU
Uusaru 5
EE-76505 Saue/Harjumaa
Igaunija
Tel: + 372 56480207
pv@zoovet.eu

United Kingdom (Northern Ireland)

VIRBAC IRELAND
McInerney & Saunders
38, Main Street
Swords, Co Dublin
K67E0A2
Republic Of Ireland
Tel: +44 (0)-1359 243243