

PRILOG I.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA PROIZVODA

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

STARTVAC emulzija za injekciju za goveda

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza (2 ml) sadrži:

Djelatne tvari:

Escherichia coli J5 inaktivirana > 50 RED₆₀*
Staphylococcus aureus (CP8) soj SP 140 inaktiviran, koji izražava antigenski kompleks povezan sa sluzi (SAAC) > 50 RED₈₀**
* RED₆₀: djelotvorna doza u kunića, u 60% životinja (serološki nalaz).
** RED₈₀: djelotvorna doza u kunića, u 80% životinja (serološki nalaz).

Adjuvans:

Parafin, tekući 18,2 mg

Pomoćne tvari:

Kvalitativni sastav pomoćnih tvari i drugih sastojaka	Kvantitativni sastav ako su te informacije bitne za pravilnu primjenu veterinarsko-medicinskog proizvoda
Benzilni alkohol	21 mg
Sorbitan monooleat	
Polisorbat 80	
Natrijev alginat	
Kalcijev klorid dihidrat	
Simetikon	
Voda za injekcije	

Homogena emulzija boje slonovače.

3. KLINIČKI PODATCI

3.1 Ciljne vrste životinja

Goveda (krave i junice).

3.2 Indikacije za primjenu za svaku ciljnu vrstu životinja

Imunizacija stada zdravih krava i junica, u stadima mliječnih krava gdje se opetovano javlja problem mastitisa, da bi se umanjila učestalost subkliničkog mastitisa te učestalost i težina kliničkih znakova kliničkog mastitisa, koje uzrokuju *Staphylococcus aureus*, koliformne bakterije i koagulaza-negativni stafilokoki.

Provedbom cjelovitog programa imunizacije potiče se imunost od oko 13-og dana nakon prve injekcije do otprilike 78-og dana nakon treće injekcije.

3.3 Kontraindikacije

Nema.

3.4 Posebna upozorenja

Treba imunizirati cijelo stado.

Imunizaciju treba smatrati jednim od sastavnih dijelova kompleksnog programa kontrole mastitisa, koji uključuje sve čimbenike važne za zdravo vime (npr. tehnika mužnje, upravljanje zasušivanjem i uzgojem, higijena, hranidba, nastambe, ležišta, udobnost krava, kvaliteta zraka i vode, nadzor zdravstvenog stanja) i druge načine upravljanja.

Cijepite samo zdrave životinje.

3.5 Posebne mjere opreza prilikom primjene

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:

Nije primjenjivo.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod u životinja:

Korisniku:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Nehotična injekcija/samo injiciranje može prouzročiti jaku bol i oticanje, naročito ako se injicira u zglobov prsta, a u rijetkim slučajevima može rezultirati gubitkom zahvaćenog prsta ukoliko nije pružena hitna medicinska pomoć. Ukoliko ste nehotično injicirani ovim veterinarsko-medicinskim proizvodom, potražite hitnu medicinsku pomoć čak ako je injicirana vrlo mala količina i sa sobom ponesite uputu o VMP.

Ako bol potraje više od 12 sati nakon liječničkog pregleda, ponovo potražite pomoć liječnika.

Liječniku:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i ako su ubrizgane male količine, slučajno ubrizgavanje ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda može uzrokovati intenzivno oticanje, što može, na primjer, rezultirati ishemijskom nekrozom, pa čak i gubitkom prsta. Potrebna je stručna, HITNA, kirurška pomoć i može zahtijevati ranu inciziju i ispiranje ubrizganog područja, osobito tamo gdje je zahvaćena pulpa prsta ili tetiva.

Posebne mjere opreza za zaštitu okoliša:

Nije primjenjivo.

3.6 Štetni događaji

Goveda (krave i junice):

Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Otekline u mjestu injiciranja ¹ , bol u mjestu injiciranja ² Povišena temperatura ³ Reakcija anafilaktičkog tipa ⁴
--	--

¹Nakon ubrizgavanja jedne doze mogu se pojaviti lake do srednje ozbiljne prolazne lokalne reakcije (u promjeru do 5 cm²), koje će nestati tijekom 1 ili maksimalno dva tjedna.

²Blage do srednje ozbiljne prolazne lokalne reakcije koje se spontano povuku maksimalno unutar 4 dana.

³Tijekom prva 24 sata nakon injekcije može doći do prosječnog prolaznog povećanja tjelesne temperature za otprilike 1°C, kod nekih krava čak za 2°C.

⁴Takve reakcije mogu se pojaviti kod nekih osjetljivih životinja koje mogu biti opasne po život. U tim okolnostima potrebno je primijeniti odgovarajuće i brzo simptomatsko liječenje.

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti veterinarsko-medicinskog proizvoda. Prijave treba poslati, po mogućnosti putem veterinara, nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili njegovom lokalnom predstavniku ili nacionalnom nadležnom tijelu putem nacionalnog sustava za prijavljivanje. Odgovarajuće podatke za kontakt možete pronaći uputi o VMP-u.

3.7 Primjena tijekom graviditeta, laktacije ili nesenja

Graviditet i laktacija:

Može se primijeniti tijekom graviditeta.

3.8 Interakcija s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcije

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i učinkovitosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Odluku o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi od slučaja do slučaja.

3.9 Putovi primjene i doziranje

Intramuskularna primjena.

Po mogućnosti, injiciranje treba obaviti naizmjenično na obje strane vrata. Prije primjene pričekajte da cjepivo dostigne temperaturu od 15 °C do 25 °C. Protresti prije primjene.

Primijeniti jednu dozu (2 ml) dubokom intramuskularnom injekcijom u vratne mišiće 45 dana prije očekivanog termina poroda i još jednu dozu po proteku 1 mjeseca (a najmanje 10 dana prije teljenja). Treću dozu treba dati nakon 2 mjeseca.

Cjelovit program imunizacije treba ponoviti kod svakog graviditeta.

3.10 Simptomi predoziranja (i, ako je primjenjivo, hitni postupci i antidoti)

Nakon primjene dvostruke doze cjepiva nisu zapažene nuspojave osim onih navedenih u dijelu 3.6.

3.11 Posebna ograničenja za primjenu i posebni uvjeti primjene, uključujući ograničenja primjene antimikrobnih i antiparazitskih veterinarsko-medicinskih proizvoda kako bi se ograničio rizik od razvoja rezistencije

Nije primjenjivo.

3.12 Karencije

Nula dana.

4. IMUNOLOŠKI PODATCI

4.1 ATCvet kôd: QI02AB17.

Poticanje aktivne imunosti protiv *Staphylococcus aureus*, koliformnih bakterija i koagulaze-negativnih stafilokoka.

5. FARMACEUTSKI PODATCI

5.1 Glavne inkompatibilnosti

Ne miješati s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.

5.2 Rok valjanosti

Rok valjanosti veterinarsko-medicinskog proizvoda kad je zapakiran za prodaju: 18 mjeseci.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakiranja: 10 sati čuvano između 15 °C i 25 °C.

5.3 Posebne mjere čuvanja

Čuvati i prevoziti na hladnom.

Zaštititi od svjetla.

Ne zamrzavati.

5.4 Vrsta i sastav unutarnjeg pakiranja

Ampule od bezbojnog stakla tipa I od 3, 10 i 50 ml.

Polietilenske (PET) ampule od 10, 50 i 250 ml.

Ampule su zatvorene gumenim čepom i aluminijskim prstenom.

Veličine pakiranja:

Kartonska kutija s 1 staklenom bočicom, s 1 dozom.

Kartonska kutija s 10 staklenih bočica, s 1 dozom.

Kartonska kutija s 20 staklenih bočica, s 1 dozom.

Kartonska kutija s 1 staklenom bočicom, s 5 doza.

Kartonska kutija s 10 staklenih bočica, s 5 doza.

Kartonska kutija s 1 staklenom bočicom, s 25 doza.

Kartonska kutija s 10 staklenih bočica s 25 doza.

Kartonska kutija s 1 PET bočicom, s 5 doza.

Kartonska kutija s 1 PET bočicom, s 25 doza.

Kartonska kutija s 1 PET bočicom, s 125 doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

5.5 Posebne mjere opreza u pogledu zbrinjavanja neiskorištenih veterinarsko-medicinskih proizvoda ili otpadnih materijala nastalih primjenom takvih proizvoda

Veterinarsko-medicinski proizvodi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarsko-medicinske proizvode ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja primjenjivima na dotični veterinarsko-medicinski proizvod.

6. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

7. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/092/001-010

8. DATUM PRVOG ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 11/02/2009

9. DATUM POSLJEDNJE REVIZIJE SAŽETKA OPISA SVOJSTAVA

{DD/MM/GGGG}

10. KLASIFIKACIJA VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA

Veterinarsko-medicinski proizvod izdaje se na veterinarski recept.

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su u Unijinoj bazi podataka o proizvodima (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr>).

PRILOG II.

OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

Nema

PRILOG III.
OZNAČIVANJE I UPUTA O VMP-u

A. OZNAČIVANJE

PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kartonske kutije, PET bočica (250 ml)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

STARTVAC emulzija za injekcije za goveda

2. DJELATNE TVARI

Jedna doza (2 ml) sadrži:

E. coli J5 inaktivirana > 50 RED₆₀ (djelotvorna doza u kunića, u 60% životinja (serološki nalaz)).

S. aureus (CP8) soj SP 140 inaktiviran, koji izražava antigenski kompleks povezan sa sluzi (SAAC) > 50 RED₈₀ (u 80% životinja).

parafin, tekući: 18,2 mg

benzilni alkohol: 21 mg

3. VELIČINA PAKIRANJA

1 bočica s 1 dozom (2 ml)

10 bočica s 1 dozom (2 ml)

20 bočica s 1 dozom (2 ml)

1 bočica s 5 doza (10 ml)

10 bočica s 5 doza (10 ml)

1 bočica s 25 doza (50 ml)

10 bočica s 25 doza (50 ml)

1 bočica s 125 doza (250 ml)

125 doza (250 ml)

4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Goveda (krave i junice).

5. INDIKACIJE

6. PUTOVI PRIMJENE

Intramuskularna primjena.

7. KARENCIJE

Karencija: nula dana.

8. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

Nakon otvaranja upotrijebiti u roku od 10 sati, čuvati između 15 °C - 25 °C.

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom.

Zaštititi od svjetla.

Ne zamrzavati.

10. RIJEČI „PRIJE PRIMJENE PROČITAJTE UPUTU O VMP-u”

Prije primjene pročitajte uputu o VMP-u.

11. RIJEČI „SAMO ZA PRIMJENU NA ŽIVOTINJAMA ”

Samo za primjenu na životinjama.

12. RIJEČI „ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE”

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

13. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET

EU/2/08/092/001 1 staklena bočica s 1 dozom
EU/2/08/092/002 10 staklenih bočica s 1 dozom
EU/2/08/092/003 20 staklenih bočica s 1 dozom
EU/2/08/092/004 1 staklena bočica s 5 doza
EU/2/08/092/005 10 staklenih bočica s 5 doza
EU/2/08/092/006 1 staklena bočica s 25 doza
EU/2/08/092/007 10 staklenih bočica s 25 doza
EU/2/08/092/008 1 PET bočica s 5 doza
EU/2/08/092/009 1 PET bočica s 25 doza
EU/2/08/092/010 1 PET bočica s 125 doza

15. BROJ SERIJE

Lot {broj}

**OSNOVNI PODATCI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA MALIM UNUTARNJIM
PAKIRANJIMA**

PET bočice (10 ml, 50 ml) i staklene bočice (2 ml, 10 ml, 50 ml)

1. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

STARTVAC

2. KVANTITATIVNI PODATCI O DJELATNIM TVARIMA

Jedna doza sadrži:

E.coli J5 inaktivirana; *S.aureus* (CP8) soj SP 140 inaktiviran.

3. BROJ SERIJE

Lot {broj}

4. ROK VALJANOSTI

Exp. {mm/gggg}

Nakon otvaranja upotrijebiti u roku od 10 sati, čuvati između 15 °C - 25 °C.

5. VELIČINA PAKIRANJA

1 doza (2 ml)

5 doza (10 ml)

25 doza (50 ml)

B. UPUTA O VMP-u

UPUTA O VMP-u

1. Naziv veterinarsko-medicinskog proizvoda

STARTVAC emulzija za injekciju za goveda

2. Sastav

Jedna doza (2 ml) sadrži:

Escherichia coli (J5) inaktivirana

> 50 RED₆₀*

Staphylococcus aureus (CP8) soj SP 140 inaktiviran, koji izražava antigenski kompleks

povezan sa sluzi (SAAC)

> 50 RED₈₀**

* RED₆₀: djelotvorna doza u kunića, u 60% životinja (serološki nalaz).

** RED₈₀: djelotvorna doza u kunića, u 80 % životinja (serološki nalaz).

parafin, tekući: 18,2 mg

benzilni alkohol: 21 mg

Homogena emulzija boje slonovače.

3. Ciljne vrste životinja

Goveda (krave i junice).

4. Indikacije za primjenu

Imunizacija stada zdravih krava i junica, u stadima mliječnih krava gdje se opetovano javlja problem mastitisa, da bi se umanjila učestalost subkliničkog mastitisa te učestalost i težina kliničkih znakova kliničkog mastitisa, koje uzrokuju *Staphylococcus aureus*, koliformne bakterije i koagulaza-negativni stafilocoki.

Provedbom cjelovitog programa imunizacije potiče se imunost od oko 13-og dana nakon prve injekcije do otprilike 78-og dana nakon treće injekcije.

5. Kontraindikacije

Nema.

6. Posebna upozorenja

Posebna upozorenja:

Treba imunizirati cijelo stado.

Imunizaciju treba smatrati jednim od sastavnih dijelova kompleksnog programa kontrole mastitisa, koji uključuje sve čimbenike važne za zdravo vime (npr. tehnika mužnje, upravljanje zasušivanjem i uzgojem, higijena, hranidba, nastambe, ležišta, udobnost krava, kvaliteta zraka i vode, nadzor zdravstvenog stanja) i druge načine upravljanja.

Cijepiti samo zdrave životinje.

Posebne mjere opreza za neškodljivu primjenu u ciljnih vrsta životinja:
Nije primjenjivo.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod u životinja:

Korisniku:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Nehotična injekcija/samo injiciranje može prouzročiti jaku bol i otjecanje, naročito ako se injicira u zglobov prsta, a u rijetkim slučajevima može rezultirati gubitkom zahvaćenog prsta ukoliko nije pružena hitna medicinska pomoć. Ukoliko ste nehotično injicirani ovim veterinarsko-medicinskim proizvodom, potražite hitnu medicinsku pomoć čak ako je injicirana vrlo mala količina i sa sobom ponesite uputu o VMP.
Ako bol potraje više od 12 sati nakon liječničkog pregleda, ponovo potražite pomoć liječnika.

Liječniku:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i ako su ubrizgane male količine, slučajno ubrizgavanje ovog veterinarsko-medicinskog proizvoda može uzrokovati intenzivno oticanje, što može, na primjer, rezultirati ishemijskom nekrozom, pa čak i gubitkom prsta. Potrebna je stručna, HITNA, kirurška pomoć i može zahtijevati ranu inciziju i ispiranje ubrizganog područja, osobito tamo gdje je zahvaćena pulpa prsta ili tetiva.

Graviditet i laktacija:

Može se primijeniti tijekom graviditeta i laktacije.

Interakcija s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcije:

Ne postoje dostupni podaci o neškodljivosti i djelotvornosti ovog cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. Stoga se odluka o primjeni ovog cjepiva prije, odnosno poslije primjene bilo kojeg drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda mora donositi od slučaja do slučaja.

Predoziranje:

Nakon primjene dvostruke doze cjepiva nisu zapažene nuspojave osim onih navedenih u dijelu "Štetni događaji".

Glavne inkompatibilnosti:

Ne miješati s bilo kojim drugim cjepivom ili veterinarsko-medicinskim proizvodom.

7. Štetni događaji

Goveda (krave i junice):

Vrlo rijetko (< 1 životinja / 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolirane slučajeve):	Otekлина u mjestu injiciranja ¹ , bol u mjestu injiciranja ² Povišena temperatura ³ Reakcija anafilaktičkog tipa ⁴
--	--

¹Nakon ubrizgavanja jedne doze mogu se pojaviti lake do srednje ozbiljne prolazne lokalne reakcije (u promjeru do 5 cm²), koje će nestati tijekom 1 ili maksimalno dva tjedna.

²Blage do srednje ozbiljne prolazne lokalne reakcije koje se spontano povuku maksimalno unutar 4 dana.

³Tijekom prva 24 sata nakon injekcije može doći do prosječnog prolaznog povećanja tjelesne temperature za otprilike 1°C, kod nekih krava čak za 2°C.

⁴Takve reakcije mogu se pojaviti kod nekih osjetljivih životinja koje mogu biti opasne po život. U tim okolnostima potrebno je primijeniti odgovarajuće i brzo simptomatsko liječenje.

Važno je prijaviti štetne događaje. Time se omogućuje kontinuirano praćenje neškodljivosti proizvoda. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, čak i onu koja nije navedena u ovoj uputi o VMP-u, ili mislite da

VMP nije djelovao, obratite se prvo veterinaru. Štetne događaje možete prijaviti i nositelju odobrenja za stavljanje u promet ili lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet koristeći se podacima za kontakt na kraju ove upute ili putem nacionalnog sustava za prijavljivanje: {podatci o nacionalnom sustavu}.

8. Doziranje za svaku ciljnu vrstu životinja, putovi i način primjene

Intramuskularna primjena. Po mogućnosti, injiciranje treba obaviti naizmjenično na obje strane vrata.

Primijeniti jednu dozu (2 ml) dubokom intramuskularnom injekcijom u vratne mišiće 45 dana prije očekivanog termina poroda i još jednu dozu po proteku 1 mjeseca (a najmanje 10 dana prije teljenja). Treću dozu treba dati nakon 2 mjeseca.

Cjelovit program imunizacije treba ponoviti kod svakog graviditeta.

9. Savjeti za ispravnu primjenu

Prije primjene pričekajte da cjepivo dosegne temperaturu od 15 °C do 25 °C. Protresti prije primjene.

10. Karencije

Nula dana.

11. Posebne mjere čuvanja

Čuvati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvati i prevoziti rashlađeno (2 °C – 8 °C).

Zaštiti od svjetla.

Čuvati od zamrzavanja.

Ne koristite ovaj veterinarsko-medicinski proizvod nakon isteka roka valjanosti navedenog na kartonskoj kutiji i naljepnici iza Exp. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja unutarnjeg pakiranja: 10 sati čuvano između 15 °C do 25 °C.

12. Posebne mjere za zbrinjavanje

Veterinarsko-medicinski proizvodi ne smiju se odlagati u otpadne vode ili kućni otpad.

Koristite programe vraćanja proizvoda za sve neiskorištene veterinarsko-medicinske proizvode ili otpadne materijale nastale njihovom primjenom u skladu s lokalnim propisima i svim nacionalnim sustavima prikupljanja. Te bi mjere trebale pomoći u zaštiti okoliša.

Pitajte svog veterinara kako zbrinuti lijekove koji vam više nisu potrebni.

13. Klasifikacija veterinarsko-medicinskih proizvoda

Veterinarsko-medicinski proizvod izdaje se na veterinarski recept.

14. Brojevi odobrenja za stavljanje u promet i veličine pakiranja

Brojevi odobrenja za stavljanje u promet: EU/2/08/092/001-010

Veličine pakiranja:

- Kartonska kutija s 1, 10 i 20 staklenih bočica s 1 dozom.
- Kartonska kutija s 1 i 10 staklenih bočica s 5 doza.
- Kartonska kutija s 1 i 10 staklenih bočica s 25 doza.
- Kartonska kutija s 1 PET bočicom s 5 doza.
- Kartonska kutija s 1 PET bočicom s 25 doza.
- Kartonska kutija s 1 PET bočicom s 125 doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

15. Datum posljednje revizije upute o VMP-u

{DD/MM/GGGG}

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu dostupne su u Unijinoj bazi podataka o proizvodima (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary/hr>).

16. Podatci za kontakt:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet i podatci za kontakt za prijavu sumnji na nuspojave:

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona) Španjolska
TEL: +34 972 43 06 60

Za sve informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu možete se obratiti lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje u promet.

Lokalni predstavnici i podatci za kontakt za prijavu sumnji na nuspojave:

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIUM
Tel: +32 09 2964464

Lietuva

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ISPANIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Република България

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ИСПАНИЈА
Тел: +34 972 43 06 60

Luxembourg/Luxemburg

HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIUM
Tel: +32 09 2964464

Česká republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Magyarország

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANYOLORSZÁG
Tel: +34 972 43 06 60

Danmark

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel: +34 972 43 06 60

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Eesti

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
HISPAANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Ελλάδα

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 80 & Μηριόνη 2-4,
104 41 Κολωνός - ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ
Τηλ: +30 210 4978660

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPAÑA
Tel: +34 972 43 06 60

France

HIPRA FRANCE
7 rue Roland Garros, Batiment H
44700 - Orvault -
FRANCE
Tél: +33 02 51 80 77 91

Hrvatska

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANJOLSKA
Tel: +34 972 43 06 60

Ireland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60

Malta

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANJA
Tel: +34 972 43 06 60

Nederland

HIPRA BENELUX NV
Nieuwewandeling 62
9000 Gent
BELGIUM
Tel: +32 09 2964464

Norge

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tlf: +34 972 43 06 60

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Am Wehrhahn 28-30
40211 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel: +49 211 698236 – 0

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Ul. Wincentego Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa - POLSKA
Tel: +48 22 642 33 06

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários
De Uso Animal, Lda
Portela de Mafra e Fontainha - Abrunheira
2665 – 191 Malveira - PORTUGAL
Tel: +351 219 663 450

România

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIA
Tel: +34 972 43 06 60

Slovenija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANIJA
Tel: +34 972 43 06 60

Ísland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPÁNN
Sími: +34 972 43 06 60

Italia

Hipra Italia S.r.l.
Enrico Mattei, 2
25030 Coccaglio (BS)
ITALIA
Tel: +39 030 7241821

Κύπρος

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Τηλ: +34 972 43 06 60

Latvija

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPĀNIJA
Tel. +34 972 43 06 60

Slovenská republika

HIPRA SLOVENSKO, s.r.o.
Zochova 5,
811 03 Bratislava,
SLOVENSKO
Tel: +421 02 32 335 223

Suomi/Finland

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
ESPANJA
Puh/Tel: +34 972 43 06 60

Sverige

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPANIEN
Tel. +34 972 43 06 60

United Kingdom (Northern Ireland)

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. La Selva 135
17170 Amer (Girona)
SPAIN
Tel: +34 972 43 06 60