

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Kartonska škatla
Steklenica 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Interflox-100, 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce, koze in prašiče
enrofloxacin

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

1 ml vsebuje:
enrofloxacin 100,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce, koze in prašiči.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Uporablja se intravensko (govedo), subkutano (govedo, ovce, koze) ali intramuskularno (prašiči).
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo: *Po intravenskem injiciranju:*
Meso in organi: 5 dni.
Mleko: 3 dni.
Po subkutanem injiciranju:
Meso in organi: 12 dni.
Mleko: 4 dni.

Ovce: Meso in organi: 4 dni.
Mleko: 3 dni.

Koze: Meso in organi: 6 dni.
Mleko: 4 dni.

Prašiči: Meso in organi: 13 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Po prvem odpiranju stične ovojnine ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi
Harju County 74013
Estonija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

MR/V/0661/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {število}