

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield, 0,77 g, vaistinis antkaklis mažiems ir vidutinio dydžio šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename 48 cm ilgio (19,2 g) antkaklyje yra:

Veiklioji (-iosios) medžiaga (-os): 0,77 g deltametrino

pagalbinė (-s) medžiaga (-os):

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Juodoji anglis
Epoksiduotas sojų pupelių aliejus
Diizonilo adipatas
Trifenilfosfatas
Polivinilchloridas
Kalcio stearatas
Cinko stearatas
Stearino rūgštis

Juodas vaistinis antkaklis, išskiriantis baltus miltelius.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys

3.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šis veterinarinis vaistas pasižymi:

- 16 savaičių trunkančiu žudomuoju poveikiu blusoms (*Ctenocephalides felis*);
- 6 mėnesius trunkančiu žudomuoju poveikiu erkėms (*Ixodes ricinus*);
- 5,5 mėnesio trunkančiu maitinimosi slopinamuoju ir žudomuoju poveikiu smėlinėms blusoms (*Phlebotomus perniciosus*).

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti jaunesniems kaip 7 sav. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti šunims, turintiems odos pažeidimų.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms. Deltametrinas yra kenksmingas katėms.

3.4. Specialieji įspėjimai

Kadangi antkaklio poveikis galutinai pasireiškia po savaitės, rekomenduojama užsegti antkaklį 1 savaitę iki galimo gyvūnų užsikrėtimo.

Paprastai erkės ir smėlinės blusos žūva ir nukrenta nuo antkaklį seginčio gyvūno atitinkamai per 48 ir 24 valandas, nes negali misti krauju. Negalima atmesti pavienių erkių įsisiurbimo ar smėlinių blusų įkandimo galimybės po gydymo. Todėl, esant nepalankioms sąlygoms, negalima visiškai atmesti infekcinių ligų perdavimo per erkes ar smėlines blusas.

Norint užtikrinti optimalią kontrolę, kad gyvūnai neužsikrėstų blusomis, rekomenduojama vienu metu gydyti visus šunis, laikomus tuose pačiuose namuose. Blusų dažnai gali būti gyvūnų krepšyje, guolyje, įprastose poilsio vietose, pvz., ant kilimų arba minkštų baldų. Jeigu blusų labai daug, kontrolės priemonių taikymo pradžioje šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu ir po to reguliariai valyti dulkių siurbliu.

Nebuvo tirta, kokią įtaką veiksmingumo trukmei turi kailio plovimas šampūnu. Atsitiktinis sąlytis su vandeniu nesumažina apykaklės veiksmingumo.

Nebūtinai antiparazitinių vaistų naudojimas arba naudojimas nukrypstant nuo PCS pateiktų nurodymų gali padidinti atsparumo atrankos spaudimą ir lemti mažesnį preparato veiksmingumą. Sprendimas dėl preparato naudojimo turėtų būti priimtas patvirtinus parazitų rūšį ir jos naštą arba užsikrėtimo riziką, remiantis epidemiologiniais požymiais, kiekvienam šuniui individualiai.

Buvo pranešta apie šunų blusų (*C. felis*) ir erkių (*Rhipicephalus sanguineus*) atsparumą piretroidams, ypač deltametrinui. Naudojant šį preparatą reikėtų atsižvelgti į vietinę informaciją apie tikslinių parazitų jautrumą, jei tokia yra.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Atsiradus odos pažeidimų, reikia nusegti antkaklį ir palaukti, kol išnyks simptomai.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus šio veterinarinio vaisto, gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos, įskaitant neurotoksinį poveikį.

Iki naudojimo antkaklį laikykite pakelyje. Dedant antkaklį negalima rūkyti, valgyti ar gerti. Negalima leisti mažiems vaikams žaisti su antkakliu arba dėti jo į burną. Antkaklio likučius ar nukirptus galiukus reikia nedelsiant išmesti. Užsegus antkaklį, reikia kruopščiai nusiplauti rankas šaltu vandeniu. Vengti ilgesnį laiką liesti antkaklį arba šunį, kuris dėvi šį antkaklį. Negalima leisti gyvūnų, seginčių antkaklį miegoti vienoje lovoje su šeimininkais, o ypač vaikais.

Atsitiktinai prarijus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Jautriems žmonėms deltametrinas gali sukelti padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidintas jautrumas deltametrinui, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistiniu preparatu ir juo gydomu gyvūnu. Esant padidėjusio jautrumo reakcijoms, kreiptis medicininės pagalbos.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Deltametrinas yra toksiškas vandens organizmams. Negalima leisti šį antkaklį dėvintiems šunims plaukioti vandens telkiniuose.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Šunys

Reta	Vietinės odos reakcijos (niežulys, eritema, plaukų slinkimas) ¹
------	--

(1–10 gyvūnų iš 10 000 gydytų gyvūnų)	
Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Pakitęs elgesys (mieguistumas, hiperaktyvumas) ² Virškinamojo trakto sutrikimai (vėmimas, viduriavimas, padidėjęs seilėtekis) Nervų ir raumenų sutrikimai (pvz., ataksija, raumenų drebulys) ³

¹ susijusios su kaklu arba oda apskritai

² dažnai siejamas su odos sudirginimu

³ simptomai paprastai išnyksta per 48 valandas po antkaklio nuėmimo

Pasireiškus bent vienam iš minėtų simptomų, antkaklį reikia nusegti ir kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba jo vietiniam atstovui, arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelio galiniame skyriuje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas.

Vaikingumas ir laktacija

Šį vaistą vaikingumo ir laktacijos metu galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

Laboratoriniais tyrimais nenustatyta jokių teratogeninio ar embriotoksinio poveikio požymių.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Negalima naudoti su kitomis ektoparaziticidinėmis medžiagomis (piretroidais, organofosfatais).

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Išoriniam naudojimui ant odos. Vieną antkaklį užsegti ant kaklo vienam gyvūnui. Antkaklį iš apsauginio pakelio reikia išimti tik prieš naudojimą. Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad nebūtų per laisvas ir kad neveržtų: tarp antkaklio ir kaklo turi likti dviejų pirštų pločio tarpas. Reikia nukirpti nereikalingą jo dalį, jei ji ilgesnė nei 5 cm. Būtina periodiškai patikrinti antkaklį ir sureguliuoti užveržimą paspaudžiant sagtį ir nustatant tinkamą padėtį.



3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Mažai tikėtina atveju, šuniui suėdus antkaklį, gali pasireikšti šie simptomai: nekoordinuoti judesiai, drebulys, seilėtekis, vėmimas, užpakalinių kojų sąstingis. Šie simptomai paprastai išnyksta per 48 val. Daugiau informacijos apie simptominių gydymą jums suteiks veterinarijos gydytojas.

3.11 Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinį ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Netaikytina.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1 ATCvet kodas: QP53AC11.

4.2. Farmakodinaminės savybės

Deltametrinas piretroidų klasės ektoparazitocidas.

Deltametrinas veikia vabzdžius ir erkes kontakto būdu. Veikimo mechanizmas pagrįstas ilgalaikiu vabzdžio nervų membranų natrio kanalų pralaidumo padidėjimu. Tai sukelia hiperaktyvumą, o po jo paralyžių (šoko efektą), drebulį ir parazito žūtį.

4.3. Farmakokinetinės savybės

Deltametrinas nepertraukiamai išsiskiria iš antkaklio į šuns kailį. Veiklioji medžiaga iš tiesioginio kontakto vietos pasiskirsto po visą odos paviršių per lipidus ir patenka į kailį. Gyvūnas neabsorbuoja deltametrino sistemiškai.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Netaikytina.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 30 mėn.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Pakelius laikyti kartoninėje dėžutėje.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Pirminės pakuotės medžiaga:

PET / PE / aliumininis / polimerinis pakelis, kuriame yra vienas antkaklis.

Pakuotės dydžiai:

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 ar 2 vaikų neatidaromi pakeliai.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarinis vaistas neturi patekti į vandens telkinius, nes deltametrinas gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Beaphar B.V.

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/18/2475/001-002

8. REGISTRAVIMO DATA

2018-07-02

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2023-03-06

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama be recepto.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield 0,77 g vaistinis antkaklis

2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS)

Viename 48 cm (19,2 g) antkaklyje yra:
deltametrino 0,77 g.

3. PAKUOTĖS DYDIS

1 antkaklis
2 antkakliai

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Mažų ir vidutinio dydžio veislių šunys

5. INDIKACIJA (-OS)

Šis veterinarinis vaistas pasižymi:

- 16 savaičių trunkančiu žudomuoju poveikiu blusoms (*Ctenocephalides felis*);
- 6 mėnesius trunkančiu žudomuoju poveikiu erkėms (*Ixodes ricinus*);
- 5,5 mėnesio trunkančiu maitinimosi slopinamuoju ir žudomuoju poveikiu smėlinėms blusoms (*Phlebotomus perniciosus*).

6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Tik išoriniam naudojimui ant odos.

7. IŠLAUKA

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Šiam veterinariniam vaistui nereikia jokių specialių laikymo temperatūrinių sąlygų.
Pakelį (-ius) laikyti kartoninėje dėžutėje.

10. NUORODA „PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ PRIEŠ NAUDOJIMĄ“

Prieš naudojimą būtina perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“
--

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

beaphar

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/18/2475/001-002

15. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
PAKELIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Canishield antkaklis



1 x 48 cm

beaphar

Neprivalomas logotipas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Deltametrinas 0,77 g

3. SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Canishield, 0,77 g, vaistinis antkaklis mažų ir vidutinio dydžio veislių šunims

2. Sudėtis

Kiekviename 48 cm ilgio (19,2 g) antkaklyje yra:

Veikliosios medžiagos: deltametrino 0,77 g

Vienas juodos spalvos vaistinis antkaklis, išskiriantis baltus miltelius.

3. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys

4. Naudojimo indikacijos

Šis veterinarinis vaistas pasižymi:

- 16 savaičių trunkančiu žudomuoju poveikiu blusoms (*Ctenocephalides felis*);
- 6 mėnesius trunkančiu žudomuoju poveikiu erkėms (*Ixodes ricinus*);
- 5,5 mėnesio trunkančiu maitinimosi slopinamuoju ir žudomuoju poveikiu smėlinėms blusoms (*Phlebotomus perniciosus*).

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti jaunesniems kaip 7 sav. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti šunims, turintiems odos pažeidimų.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms. Deltametrinas yra kenksmingas katėms.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Kadangi antkaklio poveikis galutinai pasireiškia po savaitės, rekomenduojama užsegti antkaklį 1 savaitę prieš galimą gyvūnų užsikrėtimą.

Paprastai erkės ir smėlinės blusos žūva ir nukrenta nuo antkaklį seginčio gyvūno atitinkamai per 48 ir 24 valandas, nes negali misti krauju. Negalima atmesti pavienių erkių įsisiurbimo ar smėlinių musių įkandimo galimybės po gydymo. Todėl, esant nepalankioms sąlygoms, negalima visiškai atmesti infekcinių ligų perdavimo per erkes ar smėlines blusas, tikimybės.

Norint užtikrinti optimalią kontrolę, kad gyvūnai neužsikrėstų blusomis rekomenduojama vienu metu gydyti visus šunis, laikomus tuose pačiuose namuose.

Blusų dažnai gali būti gyvūnų krepšyje, guolyje, įprastose poilsio vietose, pvz., ant kilimų arba minkštų baldų. Jeigu blusų labai daug, kontrolės priemonių taikymo pradžioje šias vietas reikia apdoroti tinkamu insekticidu ir po to reguliariai valyti dulkių siurbliu.

Nebuvo tirta, kokią įtaką veiksmingumo trukmei turi kailio plovimas šampūnu.

Atsitiktinis sąlytis su vandeniu nesumažina apykaklės veiksmingumo.

Nebūtinas antiparazitinių vaistų naudojimas arba naudojimas nukrypstant nuo PCS pateiktų nurodymų gali padidinti atsparumo atrankos spaudimą ir lemti mažesnę preparato veiksmingumą. Sprendimas dėl

preparato naudojimo turėtų būti priimtas patvirtinus parazitų rūšį ir jos naštą arba užsikrėtimo riziką, remiantis epidemiologiniais požymiais, kiekvienam šuniui individualiai.

Buvo pranešta apie šunų blusų (*C. felis*) ir erkių (*Rhipicephalus sanguineus*) atsparumą piretroidams, ypač deltametrinui. Naudojant šį preparatą reikėtų atsižvelgti į vietinę informaciją apie tikslinių parazitų jautrumą, jei tokia yra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims
Atsiradus odos pažeidimų, reikia nusegti antkaklį ir palaukti, kol išnyks simptomai.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Atsitiktinai prarijus gali pasireikšti nepageidaujamos reakcijos, įskaitant neurotoksinį poveikį. Vaistą laikyti originalioje dėžutėje. Iki naudojimo antkaklį laikyti pakelyje. Dedant antkaklį negalima rūkyti, valgyti ar gerti. Negalima leisti mažiems vaikams žaisti su antkakliu arba dėti jo į burną. Antkaklio likučius ar nukirptus galiukus reikia nedelsiant išmesti. Užsegus antkaklį, reikia kruopščiai nusiplauti rankas šaltu vandeniu. Vengti ilgesnį laiką liesti antkaklį arba šunį, kuris dėvi šį antkaklį. Negalima leisti gyvūnų, seginčių antkaklį miegoti vienoje lovoje su šeimininkais, o ypač vaikais. Atsitiktinai prarijus, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Jautriems žmonėms deltametrinas gali sukelti padidėjusio jautrumo (alergines) reakcijas. Žmonės, kuriems nustatytas padidintas jautrumas deltametrinui, turi vengti kontakto su veterinariniu vaistiniu preparatu ir juo gydomu gyvūnu. Esant padidėjusio jautrumo reakcijoms, kreiptis medicininės pagalbos.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės
Deltametrinas yra toksiškas vandens organizmams. Negalima leisti šį antkaklį dėvintiems šunims plaukioti vandens telkiniuose.

Vaikingumas ir laktacija
Laboratoriniais tyrimais nenustatyta jokių poveikio vystymuisi ar embriotoksinio poveikio požymių. Tačiau veterinarinio vaisto saugumas nėščioms kalėms nenustatytas. Šį vaistą vaikingumo ir laktacijos metu galima naudoti tik atsakingam veterinarijos gydytojui įvertinus naudą ir riziką.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos
Negalima naudoti su kitomis ektoparaziticidinėmis medžiagomis, kurių sudėtyje yra organofosfatų.

Perdozavimas
Mažai tikėtina atveju, šuniui suėdus antkaklį, gali pasireikšti šie simptomai: nekoordinuoti judesiai, drebulys, seilėtekis, vėmimas, užpakalinių kojų stingimas. Šie simptomai paprastai išnyksta per 48 val. Daugiau informacijos apie simptominių gydymą jums suteiks veterinarijos gydytojas.

Esminiai nesuderinamumai
Netaikytina.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Šunys

Reta (1–10 gyvūnų iš 10 000 gydytų gyvūnų)	Vietinės odos reakcijos (niežulys, eritema, plaukų slinkimas) ¹
Labai reta	Pakitęs elgesys (mieguistumas, hiperaktyvumas) ²

(<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Virškinamojo trakto sutrikimai (vėmimas, viduriavimas, padidėjęs seilėtekis) Nervų ir raumenų sutrikimai (pvz., ataksija, raumenų drebulys) ³
---	---

¹ susijusios su kaklu arba oda apskritai

² dažnai siejamas su odos sudirginimu

³ simptomai paprastai išnyksta per 48 valandas po antkaklio nuėmimo

Pasireiškus bent vienam iš minėtų simptomų, antkaklį reikia nusegti ir kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokia nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą {nacionalinės sistemos duomenys}.

8. Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai

Tik išoriniam naudojimui ant odos. Vieną antkaklį užsegti ant kaklo vienam gyvūnui.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo



Antkaklį iš apsauginio pakelio antkaklį reikia išimti tik prieš pat naudojimą. Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad nebūtų per laisvas ir kad neveržtų: tarp antkaklio ir kaklo turi likti dviejų pirštų pločio tarpas. Reikia nukirpti nereikalingą jo dalį, jei ji ilgesnė nei 5 cm. Būtina periodiškai patikrinti antkaklį ir sureguliuoti užveržimą paspaudžiant sagtį ir nustatant tinkamą padėtį.

10. Išlauka

Netaikytina.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Pakelį laikyti kartoninėje dėžutėje.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės po Exp. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Šio veterinarinio vaisto neturi patekti į vandens telkinius, nes deltametrinas gali būti pavojingas žuvisms ir kitiems vandens organizmams.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas. Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama be recepto.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/18/2475/001-002

Pakuotės dydžiai:

kartoninė dėžutė, kurioje yra 1 arba 2 paketėliai, apsaugoti nuo vaikų

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2023-03-06

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Registruotojas:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX Raalte

Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Beaphar B.V.

Oude Lindertseweg 9

8102 EV Raalte

Nyderlandai

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas:

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

17. Kita informacija