

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

és címke 500 ml-es polipropilén üvegnek

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn
Németország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Calciveyrol 38 infúzió A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:

Kalcium-glükonát	380mg/ml
Magnézium klorid hexahidrát	60 mg/ml
Bórsav	50mg/ml

Vivóanyagok:

Víz parenterális célra	710mg/ml
------------------------	----------

4. JAVALLAT(OK)

Heveny hypocalcaemiás állapotok kezelésére. Kiegészítő terápiaként allergiák, csalánkiütés, vérzéses diathesis, gyenge méhösszehúzódások esetén.

5. ELLENJAVALLATOK

Hypercalcaemia és hypermagnesaemia, szarvasmarhák és juhok calcinosis, magas D₃-vitamin dózisok utáni használat, krónikus veseelégtelenség, májbetegség, szervetlen foszfáttal való intravénás kezelésekkkel egyidejű vagy röviddel azokat követő alkalmazás.

Szív és érrendszeri megbetegedésekben alkalmazása fokozott óvatosságot igényel.

6. MELLÉKHATÁSOK

A készítmény kalciumtartalma folytán a terápiás dózisban való adás esetén is kialakulhat átmeneti hypercalcaemia, ami a következőkben nyilvánul meg: kezdeti bradycardia, izgatottság, izomremegések, nyálzás, a légzésfrekvencia fokozódása. A kezdeti bradycardia, majd a szívfrekvencia növekedése a túlادagolás első jeleinek tekintendők. Ilyen esetben az infúziót le kell állítani. A késői mellékhatások az általános állapot rendellenességeként, illetve az infúzió után akár 6-10 órával jelentkező hypercalcaemiás tünetekben nyilvánulhatnak meg, amit nem szabad tévesen kiújuló hypocalcaemiaként diagnosztizálni.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, az alkalmazási utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, juh, sertés

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Lassú intravénás alkalmazásra.

Szarvasmarha

Heveny hypocalcaemiás állapotok:

20-30 ml Calciveyrol 38 / 50 testsúlykilogramm intravénásan

Kiegészítő terápiaként allergiák, csalánkiütés, vérzéses diathesis és méhatónia esetén:


15-20 ml Calciveyrol 38 / 50 testsúlykilogramm intravénásan

Juh, borjú, sertés

3-4 ml Calciveyrol 38 / 10 testsúlykilogramm intravénásan

Az intravénás infúziót lassan, 20-30 perc alatt kell beadni. A dózisok szabványos értékek, amelyek illeszkednek a hiány mértékéhez és az érrendszer adott állapotához.

A kezelést először legkorábban 6 óra elteltével szabad megismételni. További ismételt kezelés 24 órás időközzel adható, ha bizonyított, hogy a fennálló tünetek a továbbra is fennálló hypocalcaemiás körülményekkel függenek össze.



9. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐSzarvasmarha, juh:

Ehető szövetek: 0 nap

Tej: 0 nap

Sertés:

Ehető szövetek: 0 nap

10. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Fagyástól óvni kell.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

11. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Az intravénás infundálást lassan kell végezni. Az infúzió során folyamatosan ellenőrizni kell a szívműködést és a vérkeringést. Túladagolásra utaló tünetek (elsősorban szívritmuszavarok, vérnyomáscsökkenés, izgatottság) jelentkezésekor az infúziót azonnal le kell állítani.

Az általános munkavédelmi óvórendszabályokat be kell tartani.

12. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges gyógyszereket!

Ezek az intézkedések a környezetet védik.

13. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2010. december 14.

14. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Állatorvosi rendvényre.

Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Tk.sz.: 2124/1/06 ÁOGYTI (500 ml)

Gy.sz.:

Lejárati idő:

