

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTONSCHACHTEL 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Flodoex 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)Jeder ml enthält:
Florfenicol 300 mg**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**100 ml
250 ml**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf und Schwein.

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ARTEN DER ANWENDUNG**Rinder: Zur intramuskulären oder subkutanen Anwendung.
Schafe: Zur intramuskulären Anwendung.
Schweine: Zur intramuskulären Anwendung.**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit

Rinder:Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 30 Tage
s.c. Injektion: 44 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schafe:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 39 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen..

Schweine:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 18 Tage

8. VERFALLDATUMExp. {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen
Nach Anbrechen verwendbar bis ...**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Unter 30°C lagern.
Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LIVISTO Int'l, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V519546

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot.

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**FLASCHEN 100 ml und 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Flodoex 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:
Florfenicol 300 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf und Schwein.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: Zur intramuskulären oder subkutanen Anwendung.
Schafe: Zur intramuskulären Anwendung.
Schweine: Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 30 Tage
s.c. Injektion: 44 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schafe:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 39 Tage

Milch: Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist. Nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die Milch für den menschlichen Verzehr produzieren sollen.

Schweine:

Essbare Gewebe: i.m. Injektion: 18 Tage

6. VERFALLDATUM

EXP. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.
Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LIVISTO Int'l, S.L.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot.