

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

50 ml viala

100 ml viala

250 ml viala

10 x 100 ml viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Prokainijev klorid 40 mg

(kar ustreza 34,65 mg prokaina)

Adrenalinijev tartrat 0,036 mg

(kar ustreza 0,02 mg adrenalina)

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

250 ml

10 x 100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Subkutana in perinevralna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: nič dni.

Mleko: nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp {mm/llll}

Odrpito zdravilo uporabite v 28 dneh.

Odrpito zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

FATRO S.p.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0536/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml nalepka
250 ml nalepka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pronestesic 40 mg/ml + 0,036 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Prokainijev klorid 40 mg

(kar ustreza 34,65 mg prokaina)

Adrenalinijev tartrat 0,036 mg

(kar ustreza 0,02 mg adrenalina).

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



4. POTI UPORABE

Subkutana in perinevralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: nič dni.

Mleko: nič ur.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpito zdravilo uporabite v 28 dneh.

Odrpito zdravilo uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjajte pri temperaturi nad 25 °C.

Vialo shranjajte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

FATRO S.p.A.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

50 ml nalepka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Pronestesic



2. KOLIČINA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:
Prokainijev klorid 40 mg
(kar ustreza 34,65 mg prokaina)
Adrenalinijev tartrat 0,036 mg
(kar ustreza 0,02 mg adrenalina).

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 28 dneh.
Odprto zdravilo uporabite do ...