

ANEXO III

ETIQUETADO

Envase de 500 ml.

Mantener a temperatura ambiente Especialidad de uso veterinario Sin receta veterinaria <i>Lote</i> <i>Cad.</i> 500 ml Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes	Registro N°: 1374 ESP Titular de la autorización de comercialización:  Laboratorio Veterinario N°: 514 Química de Murguía S.A. Zabalondo, 44. 48100 Murguía, Spain Tel: +34 94 674 10 85 Fax: +34 94 674 48 29 email: info@quimurga.com www.quimurga.com   8 421341 202052	(E) Especies de destino: Perros Indicaciones: Dixie Suspensión antiparasitaria está indicada para el tratamiento y la prevención de parasitosis externas en perros producidas por piojos (<i>Lignonathus spp.</i>) y pulgas (<i>Ctenocephalides canis</i>, <i>C. felix</i> y <i>Pulex irritans</i>). Modo de empleo: Dixie Suspensión antiparasitaria debe administrarse por vía tópica, de la siguiente forma: Agitar siempre antes de cada aplicación. Aplicar sobre la piel de la totalidad del cuerpo, a contrapelo, para que el producto penetre hasta la base capilar y la epidermis, evitando el contacto con los ojos, hocico y boca del animal. Se recomienda la aplicación del tratamiento cada 6-8 semanas. Contraindicaciones: No se debe aplicar cuando haya heridas abiertas o la piel esté dañada. Efectos secundarios: Si se pone en contacto con las mucosas, se puede producir dermatitis de contacto, y en el caso de los ojos, conjuntivitis. Si el producto es ingerido, puede generar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y diarreas. Si la dosis ingerida ha sido alta, puede causar dolor de cabeza, espasmos intestinales, mareo, disnea, sudores y contracción. Sobredosisificación: En caso de ingestión accidental, como tratamiento, pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital. Debe impedirse la ingestión de aceites y grasas porque se favorecería la absorción a nivel intestinal. Precauciones especiales: La persona que administre el producto deberá: -durante su utilización, tener cuidado de que el producto no entre en contacto con sus mucosas, especialmente ojos, nariz, boca o heridas abiertas. - inmediatamente después de su utilización, lavarse las manos con agua abundante. En caso de reacción cutánea de sensibilización u otro tipo de efecto adverso, lavar abundantemente con agua y consultar al médico o con el S. N. de Toxicología tño. 91.562.04.02. En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, acudir directamente al médico. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.	DIXIE Suspensión antiparasitaria Tetrametrina Vía Tópica	Composición: Tetrametrina (cis,trans, 20:80), 2,1g. Conservantes. Excipientes: parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-216), 1,0 g. Parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-218), 1,0 g. y otros excipientes, c.s.p. 1 L.
---	---	--	--	--

Envase de 5 l.

Mantener a temperatura ambiente

Especialidad de uso veterinario
Sin receta veterinaria

Lote

Cad.

5 l

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes

Composición: Tetrametrina (cis,trans, 20:80), 2,1g
Conservantes: Excipientes: parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E-216), 1,0 g. Parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E-218), 1,0 g. y otros excipientes, c.s.p. 1 L.

Química de Margul S.A.
Laboratorio
48900 Margul, Spain
Tel: +34 94 74 44 10 80
Fax: +34 94 74 44 10 79
www.chemimargul.com
www@chemimargul.com

Tiene la autorización de
venta en España

LABORATORIO
VETERINARIO N° 314



Cod. barras

E Especies de destino: Perros

Indicaciones: Dixie Suspensión antiparasitaria está indicada para el tratamiento y la prevención de parasitosis externas en perros producidas por piojos (*Lignonathus spp.*) y pulgas (*Ctenocephalides canis*, *C. felix* y *Pulex irritans*).

Modo de empleo: Dixie Suspensión antiparasitaria debe administrarse por vía tópica, de la siguiente forma: Agitar siempre antes de cada aplicación. Aplicar sobre la piel de la totalidad del cuerpo, a contrapelo, para que el producto penetre hasta la base capilar y la epidermis, evitando el contacto con los ojos, hocico y boca del animal. Se recomienda la aplicación del tratamiento cada 6-8 semanas.

Contraindicaciones: No se debe aplicar cuando haya heridas abiertas o la piel esté dañada.

Efectos secundarios: Si se pone en contacto con las mucosas, se puede producir dermatitis de contacto, y en el caso de los ojos, conjuntivitis. Si el producto es ingerido, puede generar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y diarreas. Si la dosis ingerida ha sido alta, puede causar dolor de cabeza, espasmos intestinales, mareo, disnea, sudores y contracción.

Sobredosisificación: En caso de ingestión accidental, como tratamiento, pueden administrarse catárticos salinos o una suspensión de carbón activado. En caso de aparición de síntomas nerviosos, el antídoto recomendado es el pentobarbital. Debe impedirse la ingestión de aceites y grasas porque se favorecería la absorción a nivel intestinal.

Precauciones especiales: La persona que administre el producto deberá: -durante su utilización, tener cuidado de que el producto no entre en contacto con sus mucosas, especialmente ojos, nariz, boca o heridas abiertas. - inmediatamente después de su utilización, lavarse las manos con agua abundante.

En caso de reacción cutánea de sensibilización u otro tipo de efecto adverso, lavar abundantemente con agua y consultar al médico o con el S. N. de Toxicología tlfno. 91.562.04.02. En caso de ingestión accidental no inducir el vómito, acudir directamente al médico.

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.



Tetrametrina Via Tópica