

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

**Faltschachtel**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Recudon 5,0 mg/ml + 0,25 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

Levomethadonhydrochlorid	5,0 mg/ml
Fenpipramidhydrochlorid	0,25 mg/ml

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 ml  
10 ml  
30 ml  
50 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd und Hund

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur langsamen intravenösen Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Pferd

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Alfasan Nederland B.V.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: V7009071.00.00  
AT:

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

Durchstechflaschen zu 5 ml, 10 ml, 30 ml oder 50 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Recudon

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Levomethadonhydrochlorid	5,0 mg/ml
Fenpipramidhydrochlorid	0,25 mg/ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

