

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

INTERTRIM LA, 200 mg/ml + 40 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Sulfadoxine 200.0 mg/ml
Trimethoprim 40.0 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml
50 ml
250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, свине и коне

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на първични и вторични бактериални инфекции при говеда, свине и коне.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интравенозно, интрамускулно (препоръчително) или подкожно приложение.

Свине: интрамускулно или подкожно приложение.

Конне: бавно интравенозно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Говеда и свине: 10 дни.

Мляко: По време на третирането млякото не трябва да бъде използвано за консумация от хора. За крави, доени два пъти дневно, млякото може да бъде използвано за консумация от хора след 4-я ден (96 часа) след последното третиране.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. :

След първо отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °С.

Да не се замразява.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ
ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-1499

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони от 50, 100 и 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

INTERTRIM LA, 200 mg/ml + 40 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Sulfadoxine 200.0 mg/ml

Trimethoprim 40.0 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, свине и коне

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интравенозно, интрамускулно (препоръчително) или подкожно приложение.

Свине: интрамускулно или подкожно приложение.

Конне: бавно интравенозно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Говеда и свине: 10 дни.

Мляко: По време на третирането млякото не трябва да бъде използвано за консумация от хора. За крави, доени два пъти дневно, млякото може да бъде използвано за консумация от хора след 4-я ден (96 часа) след последното третиране.

Не се разрешава за употреба при коне, чието месо е предназначено за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След отваряне на опаковката използвайте в рамките на 2 седмици.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от светлина.

Веднъж отворен, флаконът да се съхранява в хладилник при температура 2 – 8 °С.

Да не се замразява.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП