

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA 100 ml in 250 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVINVsak ml vsebuje:
florfenikol ... 300 mg**3. VELIKOST PAKIRANJA**100 ml
250 ml**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, ovce in prašiči.

5. INDIKACIJA(E)**6. POTI UPORABE**Govedo: intramuskularna ali subkutana uporaba
Ovce: intramuskularna uporaba
Prašiči: intramuskularna uporaba**7. KARENCA**

Karenca:

Govedo:

Meso in organi:	po i.m. poti:	30 dni
	po s.c. poti:	44 dni

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi:	po i.m. poti:	39 dni
-----------------	---------------	--------

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:

Meso in organi:	po i.m. poti:	18 dni
-----------------	---------------	--------

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mesec/leto}

Po prvem odpiranju porabite v 28 dneh.
Odprto zdravilo uporabite do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C.
Ne zamrzujte.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**13.
IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

LIVISTO Int'l, S.L.

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0572/001

17. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**VIALA 100 ml in 250 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje
florfenikol

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsak ml vsebuje:
florfenikol..... 300 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce in prašiči.

4. POTI UPORABE

Govedo: intramuskularna ali subkutana uporaba
Ovce: intramuskularna uporaba
Prašiči: intramuskularna uporaba
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Govedo:

Meso in organi:	po i.m. poti:	30 dni
	po s.c. poti:	44 dni

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ovce:

Meso in organi:	po i.m. poti:	39 dni
-----------------	---------------	--------

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Ne uporabite pri brejih živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:

Meso in organi:	po i.m. poti:	18 dni
-----------------	---------------	--------

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mesec/leto}

Po prvem odpiranju porabite v 28 dneh.

Odprto zdravilo uporabite do

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte pri temperaturi pod 30 °C.
Ne zamrzujte.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

LIVISTO Int'l, S.L.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}