

**NOTICE**

**Dronspot 30 mg / 7,5 mg solution pour spot-on pour petits chats  
Dronspot 60 mg / 15 mg solution pour spot-on pour chats moyens  
Dronspot 96 mg / 24 mg solution pour spot-on pour grands chats**

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Vetoquinol S.A.  
Magny-Vernois  
70200 Lure  
France

Fabricant responsable de la libération des lots :

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324  
24106 Kiel  
Allemagne

VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o.  
Żwirowa 140  
66-400 Gorzów Wlkp.  
Poland

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Dronspot 30 mg / 7,5 mg solution pour spot-on pour petits chats  
Dronspot 60 mg / 15 mg solution pour spot-on pour chats moyens  
Dronspot 96 mg / 24 mg solution pour spot-on pour grands chats

Praziquantel / émodepside

**3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS**

Par pipette :

	<b>Substances actives :</b>		<b>Excipient:</b>
<b>Uni-dose</b>	<b>Émodepside</b>	<b>Praziquantel</b>	<b>Butylhydroxyanisole (E 320)</b>
0,35 ml	7,5 mg	30 mg	1,89 mg
0,70 ml	15 mg	60 mg	3,78 mg
1,12 ml	24 mg	96 mg	6,05 mg

Solution pour spot-on.  
Solution limpide, jaune à brune.

**4. INDICATIONS**

Pour le traitement des infections parasitaires mixtes chez les chats causées par les vers ronds et les vers plats des espèces suivantes :

Vers ronds (nématodes)

*Toxocara cati* (stade adulte mature, stade adulte immature et stades larvaires L3 et L4)

*Toxocara cati* (stade larvaire L3) – traitement des femelles en fin de gestation en prévention d'une transmission à la portée via l'allaitement.

*Toxascaris leonina* (stade adulte mature, stade adulte immature et stade larvaire L4)

*Ancylostoma tubaeforme* (stade adulte mature, stade adulte immature et stade larvaire L4)

#### Vers plats (cestodes)

*Dipylidium caninum* (stade adulte mature et stade adulte immature)

*Taenia taeniaeformis* (stade adulte)

*Echinococcus multilocularis* (stade adulte)

### **5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez les chatons de moins de 8 semaines ou pesant moins de 0,5 kg.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.

### **6. EFFETS INDÉSIRABLES**

Le produit peut provoquer de la salivation (l'animal bave), des vomissements et de la diarrhée dans de très rares cas. Des troubles neurologiques légers et transitoires comme de l'ataxie (démarche instable ou trébuchante) ou des tremblements peuvent apparaître dans de très rares cas. Ces symptômes résulteraient du léchage du site d'application par le chat immédiatement après le traitement. Dans de très rares cas après administration du médicament vétérinaire, une alopecie transitoire (chute de poils), du prurit (démangeaisons) et/ou une inflammation ont été observés au site d'application. Dans de très rares cas, des troubles du comportement tels que l'hyperactivité, l'anxiété et la vocalisation peuvent survenir. L'anorexie et la léthargie ont été rapportées dans de très rares cas.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- Très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- Fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- Peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- Rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- Très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

### **7. ESPÈCES CIBLES**

Chat.

### **8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION**

Spot-on pour une application externe sur la peau.

#### Posologie et calendrier du traitement

Le chat doit être pesé avec précision avant le traitement pour s'assurer que la taille de pipette correcte est utilisée.

Les doses minimales recommandées sont de 3 mg d'émodespide/kg de poids corporel et 12 mg de praziquantel/kg de poids corporel, soit 0,14 ml de Dronspot/kg de poids corporel.


Poids corporel du chat (kg)	Taille de pipette à utiliser	Volume (ml)	Émodepside (mg/kg pc)	Praziquantel (mg/kg pc)
≥0,5 - 2,5	Dronspot pour petits chats	0,35 (1 pipette)	3 - 15	12 - 60
> 2,5 - 5	Dronspot pour chats moyens	0,70 (1 pipette)	3 - 6	12 - 24
> 5 - 8	Dronspot pour grands chats	1,12 (1 pipette)	3 - 4,8	12 - 19,2
> 8	Utiliser une combinaison appropriée de pipettes			

Pour le traitement des vers ronds et des vers plats, une seule administration est efficace.


Pour le traitement des femelles gestantes en prévention de la contamination avec *Toxocara cati* (stade larvaire L3) via l'allaitement aux chatons, une administration unique approximativement sept jours avant la date estimée de mise-bas est efficace.

## 9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Sortir une pipette de l'emballage. Tenir la pipette en position verticale, tourner et tirer le capuchon. Utiliser l'extrémité opposée du capuchon pour perforez le sceau.



Écarter les poils dans la nuque du chat, à la base du crâne, de façon à voir la peau. Placer l'extrémité de la pipette sur la peau et presser fermement plusieurs fois pour en vider le contenu directement sur la peau. L'application à la base du crâne permettra de minimiser les possibilités de léchage du médicament vétérinaire par le chat. Appliquer seulement sur la surface de la peau et sur une peau intacte.



## 10. TEMPS D'ATTENTE

Non applicable.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver dans l'emballage d'origine de façon à protéger le produit de l'humidité.

À conserver en dessous de 25°C.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette et la boîte. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

## 12. MISES EN GARDE PARTICULIÈRES

### Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Un shampoing ou une immersion de l'animal dans l'eau directement après le traitement peut réduire l'efficacité du médicament vétérinaire. C'est pourquoi les chats traités ne doivent pas être baignés jusqu'à ce que la solution ait complètement séché.

La résistance d'un parasite à une classe particulière d'anthelminthiques, quelle qu'elle soit, peut se développer suite à l'usage fréquent et répété d'un anthelminthique de cette classe.

### Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

Appliquer seulement sur la surface de la peau et sur une peau intacte. Ne pas faire avaler et ne pas administrer par voie parentérale.

Éviter que le chat traité ou les autres chats de la famille lèchent le site d'application tant qu'il est humide.

L'expérience est limitée en ce qui concerne l'utilisation du médicament vétérinaire chez les animaux malades ou affaiblis. Par conséquent, le médicament vétérinaire ne doit pas être administré à ces animaux.

### Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Ce produit peut être irritant pour la peau et les yeux.

Veiller à ce que le contenu de la pipette n'entre pas en contact avec la peau, les yeux et la bouche, et éviter de toucher la bouche ou les yeux avec les mains.

Éviter tout contact direct avec la zone d'application tant qu'elle est humide. Veiller à tenir les enfants éloignés des animaux traités pendant cette période.

En cas de contact accidentel avec la peau ou les yeux, laver immédiatement la peau à l'eau et au savon, et rincer abondamment les yeux à l'eau claire.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue au praziquantel doivent éviter tout contact avec le produit.

Si les symptômes cutanés ou oculaires persistent, ou en cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquetage.

Il faut veiller à ce que les enfants n'aient pas de contact intensif prolongé (par exemple, en dormant) avec les chats traités pendant les premières 24 heures suivant l'application du médicament vétérinaire. Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Se laver les mains après l'application.

Le solvant contenu dans ce médicament vétérinaire pourrait tacher certains matériaux tels que le cuir, les tissus, plastiques et surfaces laquées. S'assurer que le site d'application est sec avant de permettre tout contact avec de tels matériaux.

L'échinococcose représente un danger pour l'homme. L'échinococcose est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'OIE (World Organisation for Animal Health) ; les instructions spécifiques de traitement, de suivi et de protection des personnes sont à demander aux autorités compétentes concernées.

### Gestation et lactation

Ce médicament vétérinaire peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Voir aussi rubrique 8.

### Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

L'émodepside est un substrat pour la glycoprotéine P. Des traitements simultanés avec d'autres médicaments qui sont des substrats/inhibiteurs de la glycoprotéine P (par exemple, l'ivermectine et

autres lactones macrocycliques antiparasitaires, l'érythromycine, la prednisolone ou la ciclosporine) pourraient conduire à des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques. Les conséquences cliniques potentielles de telles interactions n'ont pas été évaluées. Si votre chat reçoit des médicaments, quels qu'ils soient, veuillez contacter votre vétérinaire pour en discuter avant d'appliquer le médicament vétérinaire. De même, veuillez informer votre vétérinaire que vous utilisez ce médicament vétérinaire s'il prescrit des médicaments à votre chat.

**Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :**

Une salivation, des vomissements et des tremblements ont été observés de façon occasionnelle après application de doses du médicament vétérinaire allant jusqu'à 10 fois la dose recommandée chez des chats adultes et jusqu'à 5 fois la dose recommandée chez des chatons. Ces symptômes résulteraient du léchage du site d'application par le chat. Les symptômes étaient totalement réversibles.  
Il n'y a pas d'antidote spécifique connu.

**Incompatibilités :**

Aucune connue.

**13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Le médicament vétérinaire ne doit pas être déversé dans les cours d'eau car cela pourrait être dangereux pour les poissons et les organismes aquatiques.

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVEÉ**

Février 2025

**15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Présentations : 0,35 ml, 0,70 ml et 1,12 ml par pipette ; plaquettes thermoformées contenant 1, 2 ou 20 pipettes uni-doses.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**MODE DE DÉLIVRANCE :**

Sur délivrance libre

BE-V543120 (Dronspot 30 mg / 7,5 mg)  
BE-V543137 (Dronspot 60 mg / 15 mg)  
BE-V543146 (Dronspot 96 mg / 24 mg)