

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

NOBILIS® RT+IBmulti+ND+EDS  
Emulsion voor/pour/für Inj.

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)**

Form.: pro dos. (0,5 ml): IBV s. M41 ind. min. 5,5 log<sub>2</sub> VN U, IBV s. 249g ind. min. 4,0 log<sub>2</sub> VN U, ART s. But1#8544 ind. min. 9,5 log<sub>2</sub> ELISA U, EDS'76 s. BC14 ind. min. 6,5 log<sub>2</sub> HI U, NDV s. Clone 30 ind. min. 4,0 log<sub>2</sub> HI U. - Adj.: paraff.  
(ind.: induceert/induit/induziert; U: eenheden/unités/Einheiten)

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Emulsion voor/pour/für Inj.

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

500 d. of/ou/oder 1.000 d.

**5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Reproductiekippen en legkippen /Poules reproductrices et pondeuses / Zucht- und Legetiere  
Hühner

**6. INDICATIE(S)**

Vaccin tegen infectie met Infectieuze Bronchitis virus (IBV) (Massachusetts en D274/207), Newcastle Disease virus (NDV), Aviaire Rhinotracheïtis virus (ART) en EDS'76 virus.

Vaccin contre l'infection avec le virus de la Bronchite Infectieuse (IBV) (Massachusetts et D274/207), le virus de Newcastle Disease (NDV), le virus de Rhinotrachéite Aviaire (ART) et le virus EDS'76.

Impfstoff gegen ein Infektion mit einem Infektiöse Bronchitis Virus (IBV) (Massachusetts und D274/207), Newcastle Disease Virus (NDV), aviäres Rhinotracheitis Virus (ART) und EDS'76 Virus.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Inj. I.M.

Lees vóór gebruik de bijsluiters / Lire la notice avant utilisation / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

## **8. WACHTTIJD**

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 dagen/jour/Tage

## **9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG**

Accidentele zelfinjectie is gevaarlijk.  
Une auto-injection accidentelle est dangereuse.  
Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich.

Lees vóór gebruik de bijsluiters / Lire la notice avant utilisation / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

## **10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Ex. :

Aangeprikte flacon: binnen 3 uren gebruiken.  
Flacon entamé: utiliser dans les 3 heures.  
Nach Öffnung: innerhalb von 3 Stunden gebrauchen.

## **11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Bewaring: Donker in koelkast (+2°C - +8°C). Niet bevriezen. Bescherm tegen licht  
Conservation: A l'obscurité au réfrigérateur (+2°C - +8°C). Ne pas congeler. Protéger de la lumière  
Lagerung: Dunkel im Kühlschrank (+2°C - +8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen

## **12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering, lees de bijsluiters.  
Pour l'élimination, voir la notice.  
Entsorgung, lesen Sie die Packungsbeilage.

## **13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing**

Diergeneeskundig gebruik/Usage vétérinaire/Tierärztlicher Gebrauch  
Diergeneeskundig voorschrift/Ordonnance vétérinaire/Verschreibungspflichtig

## **14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.  
Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V. – Nederland  
vertegenwoordigd door  
Intervet Belgium N.V. – Stallestraat 73 – 1180 Brussel

**16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER**

Reg. n°: BE-V265876

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lotn°:

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

NOBILIS® RT+IBmulti+ND+EDS  
Emulsion voor/pour/für Inj.

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)**

Form.: pro dos. (0,5 ml): IBV s. M41 ind. min. 5,5 log<sub>2</sub> VN U, IBV s. 249g ind. min. 4,0 log<sub>2</sub> VN U, ART s. But1#8544 ind. min. 9,5 log<sub>2</sub> ELISA U, EDS'76 s. BC14 ind. min. 6,5 log<sub>2</sub> HI U, NDV s. Clone 30 ind. min. 4,0 log<sub>2</sub> HI U. - Adj.: paraff.  
(ind.: induceert/induit/induziert; U: eenheden/unités/Einheiten)

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Emulsion voor/pour/für Inj.

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

500 d. of/ou/oder 1.000 d.

**5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Reproductiekippen en legkippen /Poules reproductrices et pondeuses / Zucht- und Legetiere  
Hühner

**6. INDICATIE(S)**

Vaccin tegen infectie met Infectieuze Bronchitis virus (IBV) (Massachusetts en D274/207), Newcastle Disease virus (NDV), Aviaire Rhinotracheïtis virus (ART) en EDS'76 virus.

Vaccin contre l'infection avec le virus de la Bronchite Infectieuse (IBV) (Massachusetts et D274/207), le virus de Newcastle Disease (NDV), le virus de Rhinotrachéite Aviaire (ART) et le virus EDS'76.

Impfstoff gegen ein Infektion mit einem Infektiöse Bronchitis Virus (IBV) (Massachusetts und D274/207), Newcastle Disease Virus (NDV), aviäres Rhinotracheitis Virus (ART) und EDS'76 Virus.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Inj. I.M.

Lees vóór gebruik de bijsluiter / Lire la notice avant utilisation / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

## **8. WACHTTIJD**

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 dagen/jour/Tage

## **9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG**

Accidentele zelfinjectie is gevaarlijk.  
Une auto-injection accidentelle est dangereuse.  
Eine versehentliche Selbstinjektion ist gefährlich.

Lees vóór gebruik de bijsluiter / Lire la notice avant utilisation / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

## **10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Ex. :

Aangeprikte flacon: binnen 3 uren gebruiken.  
Flacon entamé: utiliser dans les 3 heures.  
Nach Öffnung: innerhalb von 3 Stunden gebrauchen.

## **11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Bewaring: Donker in koelkast (+2°C - +8°C). Niet bevriezen. Bescherm tegen licht  
Conservation: A l'obscurité au réfrigérateur (+2°C - +8°C). Ne pas congeler. Protéger de la lumière  
Lagerung: Dunkel im Kühlschrank (+2°C - +8°C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen

## **12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering, lees de bijsluiter.  
Pour l'élimination, voir la notice.  
Entsorgung, lesen Sie die Packungsbeilage.

## **13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing**

Diergeneeskundig gebruik/Usage vétérinaire/Tierärztlicher Gebrauch  
Diergeneeskundig voorschrift/Ordonnance vétérinaire/Verschreibungspflichtig

**14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN  
BEWAREN”**

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.  
Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.  
Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN  
DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V. – Nederland  
vertegenwoordigd door  
Intervet Belgium N.V. – Stallestraat 73 – 1180 Brussel

**16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER**

Reg. n°: BE-V265876

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lotn°: