

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja individual de 50 ml, 100 ml y 250 ml

CN: XXXXXX

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOBAL 100 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacin 100 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml, 100 ml y 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, ovino y caprino

5. INDICACIONES DE USO

6 VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía subcutánea/intravenosa

Ovino: Vía subcutánea

Caprino: Vía subcutánea

Porcino: Vía intramuscular

7. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Tras la administración intravenosa:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Tras la administración subcutánea:

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Carne: 12 días.
Leche: 4 días.
Ovino:
Carne: 4 días.
Leche: 3 días.

Caprino:
Carne: 6 días.
Leche: 4 días.

Porcino:
Carne: 13 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN.

No congelar.
Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

GLOBAL VET HEALTH SL

Representante:
SP VETERINARIA SA



14.NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3776 ESP

15.NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Viales de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOBAL 100 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Enrofloxacino 100.0 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días

Fecha límite de utilización:

5 TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Tras la administración intravenosa:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Tras la administración subcutánea:

Carne: 12 días.

Leche: 4 días.

Ovino:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Caprino:

Carne: 6 días.

Leche: 4 días.

Porcino:

Carne: 13 días.

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Viales de 100 ml y 250ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO:

QUINOBAL 100 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA SUSTANCIA ACTIVA Y OTRAS SUSTANCIAS

Enrofloxacino 100,0 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y porcino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

Bovino: SC/IV

Ovino: SC

Caprino: SC

Porcino: IM

5. TIEMPOS DE ESPERA.

Tiempo de espera:

Bovino:

Tras la administración intravenosa:

Carne: 5 días.

Leche: 3 días.

Tras la administración subcutánea:

Carne: 12 días.

Leche: 4 días.

Ovino:

Carne: 4 días.

Leche: 3 días.

Caprino:

Carne: 6 días.

Leche: 4 días.

Porcino:

Carne: 13 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN.

No congelar.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

GLOBAL VET HEALTH SL

Representante:

SP VETERINARIA SA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}