

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****5 of 25 x 1 dosis (+ 5 of 25 injectieflacons oplosmiddel van 5 ml)****1 of 5 x 5 doses (+ 1 of 5 injectieflacons oplosmiddel van 25 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

PG-600

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie.

Poudre et solvant pour solution injectable.

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

Gonadotrophin. chorion. 200 I.U. - Gonadotrophin. seric. 400 I.U. pro dos. (5 ml).

Dil.: Mononatr. phosph. - Dinatr. phosph. - Aq. pro inject.

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

5 - 25 x 1 dosis (+ 5 - 25 injectieflacons oplosmiddel/solvant/Lösungsmittel 5 ml)

1 - 5 x 5 doses (+ 1 - 5 injectieflacons oplosmiddel/solvant/Lösungsmittel 25 ml)

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Varken (zeugen, gelten)

Porc (truies, cochettes)

Schwein (Sauen, Jungsauen).

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

s.c. - i.m.

**7. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: Vlees en slachtafval/Viande et abats/Essbare Gewebe: 0 d/j/T

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 24 u.

Après ouverture à utiliser dans les 24 h.

Nach Anbrechen innerhalb von 24 S. verbrauchen.

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaren in een koelkast bij 2°C - 8°C.  
À conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C.  
Im Kühlschrank lagern bei 2°C - 8°C.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiters.  
Lire la notice avant utilisation.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
À usage vétérinaire uniquement.  
Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.  
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V011733

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Etiket injectieflacon van 1 ds of 5 ds****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

PG-600

Poeder voor oplossing voor injectie.

Poudre pour solution injectable.

Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung.

Varken/Porc/Schwein

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Gonadotrophin. chorion. 200 I.U. - Gonadotrophin. seric. 400 I.U. pro dos. un.

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Injectieflacon oplosmiddel van 5 ml of 25 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Steriel oplosmiddel  
Solvant stérile  
Steriles Lösungsmittel

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> - Aq. ad inject./ml

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Glyofiliseerde vorm: bewaren in een koelkast bij 2°C - 8°C.

Forme lyophilisée : à conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).

Lyophilisierte Form: im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).

Na reconstitutie/après reconstitution/nach Rekonstitution: 24 h/u/S bij/à/bei 2°C - 8°C.