

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN – Vial de 1 x 100 ml o 1 x 500 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ovipast Plus suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml de vacuna contiene:

Principios activos

*M. haemolytica**, serotipos A1, A2, A6, A7, A9, inactivados 5 x 10⁸ células/cepa

B. trehalosi **, serotipos T3, T4, T10, T15, inactivados 5 x 10⁸ células/cepa

* que inducen al menos 22 % de reducción D.O., midiendo la inhibición de la unión de transferrina en suero de conejo.

** que inducen un aumento de D.O. significativo ($p < 0,025$), determinando la respuesta de anticuerpos en suero de conejo.

Adyuvantes

Hidróxido de aluminio gel 250 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.

No congelar.

Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1383 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

ETIQUETA DEL VIAL DE PLÁSTICO (vial con 100 ml o 500 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Ovipast Plus suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml de vacuna contiene:

Principios activos

*M. haemolytica**, serotipos A1, A2, A6, A7, A9, inactivados 5 x 10⁸ células/cepa

B. trehalosi **, serotipos T3, T4, T10, T15, inactivados 5 x 10⁸ células/cepa

* que inducen al menos 22 % de reducción de D.O., midiendo la inhibición de la unión de transferrina en suero de conejo.

** que inducen un aumento de D.O. significativo (p<0,025), determinando la respuesta de anticuerpos en suero de conejo.

Adyuvantes

Hidróxido de aluminio gel 250 mg

100 ml

500 ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Ovino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.
No congelar.
Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

