

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VAROSTOP, avilio juostelės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje juostelėje yra:

veikliosios medžiagos:

flumetrino 3,6 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Medinės (buko medžio) juostelės, impregnuotos flumetrinu.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Bitės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Bitėms, užsikrėtusioms erkėmis *Varroa jacobsoni*, gydyti ir ligai diagnozuoti bei profilaktiškai.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti medunešio metu ar prieš kopiant medų.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Nėra.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Dirbant su preparatu, negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Naudojus juosteles, prieš valgį ir baigus darbą būtina plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Juostelės neveikia bičių motinėlės ir perų.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Juosteles reikia kabinti avilyje pavasarį ir rudenį.

Vienai bičių šeimai skiriama nuo 2 iki 4 juostelių, priklausomai nuo šeimos stiprumo:

jaunoms bei mažai užsikrėtusioms šeimoms – 1–2 juostelės,

vidutinio stiprumo bei stiprioms šeimoms – 2–4 juostelės.

Juostelės kabinamos metalinių kabliukų pagalba į tarprėmius, aptūptus bičių, simetriškai nuo centro. Tuos tarpus tarp rėmų, kuriuose bus kabinamos juostelės, rekomenduojama šiek tiek padidinti, kad bitės galėtų laisvai vaikščioti abejomis juostelių pusėmis. Jeigu rudeninio maitinimo metu penėtuvė dedama ant lizdo viršaus, reikia, kad būtent tame tarprėmyje, kur bus bičių kelias į penėtuvę, kabotų juostelė.

Gydant bites, šeimose juostelės turi būti paliktos 35 d. (ne ilgiau kaip 6 sav.) ir po to jas reikia išimti.

Gydyti bičių šeimas Varostop avilio juostelėmis rekomenduotina:

anksti pavasarį, kai bičių šeimose dar mažai perų,

vasarą, pasibaigus medunešiui, kuomet motinėlės nededa kiaušinėlių, bičių ir atvirų korių yra mažai, likęs plotas užpildytas medumi ir dauguma erkių patelių yra ant bičių kūno. Gydyti reikia tik iškopus medų iš pagrindinių korių,

rudenį, kuomet perų palaipsniui mažėja.

Efektyviausiai gydoma tada, kai preparatas naudojamas vasaros pabaigoje, išsukus medų. Preparatas gali būti naudojamas bet kuriuo metu ligai diagnozuoti ar intensyvios invazijos metu gresiant šeimos mirčiai, tačiau rekomenduotina juostelių nenaudoti esant intensyviausiam medunešiui.

Norint diagnozuoti, ar bitės užsikrėtusios *Varroa jacobsoni* erkėmis, avilio dugną reikia iškloti švariu popieriumi ir 24 val. avilyje pakabinti juosteles. Po paros reikia apžiūrėti popierių ar nėra žuvusių erkių.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Naudojant rekomenduotinomis dozėmis vaistas yra saugus.

4.11. Išlauka

Medui – 0 parų.

Negalima naudoti medunešio metu ar prieš kopiant medų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: piretriniai.

ATCvet kodas: QP53AC05.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Vaisto veiklioji medžiaga erkes veikia sąlyčio būdu, dėl to farmakodinaminiai ir farmakokinetiniai tyrimai nebuvo atlikti. Vaistas akaricidiškai veikia erkes *Varroa destructor*.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Žr. 5.1. p.

Poveikis aplinkai

Patekęs į aplinką flumetrinas greitai skyla (per 1–3 sav.). Vaistas yra šiek tiek toksiškas žinduoliams, paukščiams, bitėms ir žuvims.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Buko medžio juostelės,
etanolis (galutiniame produkte nenustatomas),
ksilolis (galutiniame produkte nenustatomas).

6.2. Nesuderinamumai

Nėra.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 24 mėn.
Atplėšus pirminę pakuotę, veterinarinį vaistą reikia sunaudoti nedelsiant. Atplėštas nesunaudotas ir panaudotas juosteles reikia išmesti tik tam skirtose vietose arba sudeginti.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti originalioje pakuotėje, žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Atskiri 30 µ storio MTPE maišeliai su impregnuotomis juostelėmis, apgaubti bendra polietilenine plėvele po 10 vnt. ir įdėti į užlydytą aliuminio folijos maišėlį, kartoninėje dėžutėje.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

„Primavet-Sofia“ OOD,
211A Slivnitsa Blvd., Sofia city,
Bulgarija.

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/2/11/2047/001

9. REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2011-05-12.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2016-04-06 .

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2016-04-06

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VAROSTOP, avilio juostelės

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje juostelėje yra 3,6 mg flumetrino.

3. VAISTO FORMA

Avilio juostelės.

4. PAKUOTĖS DYDIS

10 juostelių.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Bitės.

6. INDIKACIJOS

Bitėms, užsikrėtusioms erkėmis *Varroa jacobsoni*, gydyti ir ligai diagnozuoti bei profilaktiškai.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Juosteles reikia kabinti avilyje pavasarį ir rudenį.

Vienai bičių šeimai skiriama nuo 2 iki 4 juostelių, priklausomai nuo šeimos stiprumo:

jaunoms bei mažai užsikrėtusioms šeimoms – 1–2 juostelės,

vidutinio stiprumo bei stiprioms šeimoms – 2–4 juostelės.

Gydant bites, šeimose juostelės turi būti paliktos 35 d. (ne ilgiau kaip 6 sav.) ir po to jas reikia išimti.

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

8. IŠLAUKA

Išlauka: medui – 0 parų.

Negalima naudoti medunešio metu ar prieš kopiant medų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina

Veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

„Primavet-Sofia“ OOD,
211A Slivnitsa Blvd., Sofia city,
Bulgarija.

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/11/2047/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs

MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
ALUMINIO FOLIJS MAIŠELIS, MTPE MAIŠELIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VAROSTOP, avilio juostelės

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Vienoje juostelėje yra 3,6 mg flumetrino.

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

10 juostelių.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinę lapelį.

5. IŠLAUKA

Išlauka: medui – 0 parų.

6. SERIJOS NUMERIS

Serija

7. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Veterinariniam naudojimui.

INFORMACINIS LAPELIS
VAROSTOP, avilio juostelės

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

„Primavet-Sofia“ OOD,
211A Slivnitsa Blvd., Sofia city,
Bulgarija.

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VAROSTOP, avilio juostelės
Flumetrinas

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje juostelėje yra 3,6 mg flumetrino.

4. INDIKACIJA (-OS)

Bitėms, užsikrėtusioms erkėmis *Varroa jacobsoni*, gydyti ir ligai diagnozuoti bei profilaktiškai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti medunešio metu ar prieš kopiant medų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Bitės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIAENAI RŪŠIAI

Juosteles reikia kabinti avilyje pavasarį ir rudenį.

Vienai bičių šeimai skiriama nuo 2 iki 4 juostelių, priklausomai nuo šeimos stiprumo:

jaunoms bei mažai užsikrėtusioms šeimoms – 1–2 juostelės,

vidutinio stiprumo bei stiprioms šeimoms – 2–4 juostelės.

Juostelės kabinamos metalinių kabliukų pagalba į tarprėmius, aptūptus bičių, simetriškai nuo centro. Tuos tarpus tarp rėmų, kuriuose bus kabinamos juostelės, rekomenduojama šiek tiek padidinti, kad bitės galėtų laisvai vaikščioti abejomis juostelių pusėmis. Jeigu rudeninio maitinimo metu penėtuvė

dedama ant lizdo viršaus, reikia, kad būtent tame tarprėmyje, kur bus bičių kelias į penėtuvę, kabotų juostelė.

Gydant bites, šeimose juostelės turi būti paliktos 35 d. (ne ilgiau kaip 6 sav.) ir po to jas reikia išimti. Efektyviausiai gydoma tada, kai preparatas naudojamas vasaros pabaigoje, išsukus medų. Preparatas gali būti naudojamas bet kuriuo metu ligai diagnozuoti ar intensyvios invazijos metu gresiant šeimos mirčiai, tačiau rekomenduotina juostelių nenaudoti esant intensyviausiam medunešiui.

Norint diagnozuoti, ar bitės užsikrėtusios *Varroa jacobsoni* erkėmis, avilio dugną reikia iškloti švairiu popieriumi ir 24 val. avilyje pakabinti juosteles. Po paros reikia apžiūrėti popierių ar nėra žuvusių erkių.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Juostelės kabinamos metalinių kabliukų pagalba į tarprėmius, aptūptus bičių, simetriškai nuo centro. Tuos tarpus tarp rėmų, kuriuose bus kabinamos juostelės, rekomenduojama šiek tiek padidinti, kad bitės galėtų laisvai vaikščioti abejomis juostelių pusėmis. Jeigu rudeninio maitinimo metu penėtuvė dedama ant lizdo viršaus, reikia, kad būtent tame tarprėmyje, kur bus bičių kelias į penėtuvę, kabotų juostelė.

Gydyti bičių šeimas Varostop avilio juostelėmis rekomenduotina:

anksti pavasarį, kai bičių šeimose dar mažai perų,

vasarą, pasibaigus medunešiui, kuomet motinėlės nededa kiaušinėlių, bičių ir atvirų korių yra mažai, likęs plotas užpildytas medumi ir dauguma erkių patelių yra ant bičių kūno. Gydyti reikia tik iškopus medų iš pagrindinių korių,

rudenį, kuomet perų palaipsniui mažėja.

10. IŠLAUKA

Medui – 0 parų.

Negalima naudoti medunešio metu ar prieš kopiant medų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Atplėšus pirminę pakuotę, veterinarinį vaistą reikia sunaudoti nedelsiant.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Atplėštas nesunaudotas ir panaudotas juosteles reikia išmesti tik tam skirtose vietose arba sudeginti.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2016-04-06

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

UAB „Bičių Austėja“,
Šaltupio g. 24, Anykščiai.
Tel. +370 381 52434