

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Verpackung (50 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

IVOMEK 1%, 10 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectinum 10 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSEN

500 ml

11

4. ZIELTIERARTEN(EN)**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Injektion: s.c.

7. WARTEZEITEN**Wartezeit:**

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist

Rinder:

Essbare Gewebe: 49 Tage.

Bei trockenstehenden Milchkühen, darunter auch trächtigen Milchfärsen, nicht innerhalb von 60 Tagen vor dem Geburtstermin anwenden.

Schafe:

Essbare Gewebe: 22 Tage.

Bei Milchschaafen außerhalb der Laktation nicht innerhalb von 60 Tagen vor dem Geburtstermin anwenden.

Schweine:

Essbare Gewebe: 14 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V120556

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett (500, 1000 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

IVOMEK 1% 10 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectinum 10 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)**4. ART DER ANWENDUNG**

Injektion: s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist

Rinder:

Essbare Gewebe: 49 Tage.

Bei trockenstehenden Milchkühen, darunter auch trächtigen Milchfärsen, nicht innerhalb von 60 Tagen vor dem Geburtstermin anwenden.

Schafe:

Essbare Gewebe: 22 Tage.

Bei Milchschaafen außerhalb der Laktation nicht innerhalb von 60 Tagen vor dem Geburtstermin anwenden.

Schweine:

Essbare Gewebe: 14 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett (500, 1000 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

IVOMEK 1% 10 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectinum 10 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)**4. ART DER ANWENDUNG**

Injektion: s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN**Wartezeit:** Siehe äußere Verpackung oder Packungsbeilage.**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern. In der Originalverpackung aufbewahren. Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Etikett (50 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

IVOMEK 1% 10 mg/ml

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Ivermectinum 10 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.