

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON ÉS A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

{100 ml-es, 250 ml-es és 500 ml-es műanyag flakon }

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

FIPROMAX 0,25 g/100 ml külsőleges oldatos spray kutyák és macskák részére A.U.V.
Fipronil

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

100 ml oldat tartalmaz:

Hatóanyag:

Fipronil: 0,25 g

3. GYÓGYSZERFORMA

Külsőleges oldatos spray

4. KISZERELÉSI EGYSÉG

100 ml

250 ml

500 ml

5. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya, macska

6. JAVALLAT(OK)

Kutyák és macskák bolhák (*Ctenocephalides* spp.) és kullancsok (*Dermacentor* spp., *Ixodes* spp.) okozta fertőzöttségének gyógykezelésére és megelőzésére, valamint a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (FAD) kezelési stratégiájának részeként. A készítmény kutyákon és macskákon kullancs ellen 35 napig, kutyákon bolhák ellen 91 napig, macskákon bolhák ellen 60 napig véd, függően a környezet fertőzöttségétől.

7. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás módja: Külsőleges alkalmazás

Adagolás: Az ajánlott dózis 3 – 6 ml FIPROMAX/ttkg (7,5 – 15 mg fipronil/ttkg), ami 10-20 pumpálást jelent a 100 ml-es, illetve 1-2 pumpálást a 250 ml-es és az 500 ml-es flakomból testtömeg kilogrammonként.

A készítmény kutyákon és macskákon kullancs ellen 35 napig, kutyákon bolhák ellen 91 napig, macskákon bolhák ellen 60 napig véd, függően a környezet fertőzöttségétől.

Alkalmazási útmutató

Permetezzük a készítményt az állat szőrére az egész testfelületen kb. 10-20 cm távolságból a szőr növekedésével ellentétes irányban, hogy a szőr teljesen átmedvesedjen egészen a bőrig. A hosszúszőrű állat szőrét borzoljuk fel, hogy a készítmény eljusson a bőrre az állat hátán, oldalán, hasán, lábain, vállán és nyakán is. A fej és környékének kezelésekor permetezzük a készítményt a gumikesztyűs kezünkbe és dörzsöljük be finoman a szőrbe. Hagyjuk megszáradni az állatot letörülés nélkül. A termék bevonatképző anyagot is tartalmaz, ami a bundán filmréteget képez és a szőrt fényessé teszi. Vizsgálatok hiányában a két kezelés közötti javasolt minimális idő 4 hét. El kell kerülni, hogy a készítmény az állat szemébe vagy szájába jusson.

Fontos a pontos adagolás betartása.

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

8. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK) HA SZÜKSÉGESEK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

10. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható: {hónap/év}

Felbontás után 12 hónapon belül felhasználandó.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on fénytől védve tartandó.

12. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE, HA SZÜKSÉGES

Ártalmatlanná tétel: a helyi követelményeknek megfelelően.

A Fipromax 0,25 g/100 ml külsőleges oldatos spray nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre. El kell kerülni, hogy a készítmény vagy a kiürült csomagolóanyag élővizekbe jusson.

13. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK ÉS A KIADHATÓSÁGRA ÉS FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK, AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra. Vénymentes.

14. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

15. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME

Fortevit Kft.

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.

16. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3892/1/17 NÉBIH ÁTI (100 ml)

3892/2/17 NÉBIH ÁTI (250 ml)

3892/3/17 NÉBIH ÁTI (500 ml)

17. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gyártási szám: