

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Faltkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cuxavet TS „Ogris“ 625 mg - Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder
Wirkstoff: Cloxacillin Benzathin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Ein Injektor zu 9 g enthält:

Wirkstoff:

Cloxacillin Benzathin 625 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zur intramammären Anwendung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

4 x 1 Injektor zu je 9 g

24 x 1 Injektor zu je 9 g

40 x 1 Injektor zu je 9 g

5. ZIELTIERART(EN)

Rind (trockenstehende Milchkuh)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Zur einmaligen intramammären Anwendung.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: bei Behandlung früher als 35 Tage vor dem Abkalben: 5 Tage ab Laktationsbeginn

bei Behandlung innerhalb von 35 Tagen vor dem Abkalben: 40 Tage ab Verabreichung

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über +25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgungshinweis: Siehe Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H., Hinderhoferstrasse 3, A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul.-Nr.: 8-00117

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Injektor

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Cuxavet TS „Ogris“ 625 mg - Suspension zur intramammären Anwendung für Rinder
Wirkstoff: Cloxacillin Benzathin

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Ein Injektor zu 9 g enthält:

Wirkstoff:

Cloxacillin Benzathin 625 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

9 g

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Zur einmaligen intramammären Anwendung.

5. WARTEZEIT

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 21 Tage

Milch: bei Behandlung früher als 35 Tage vor dem Abkalben: 5 Tage ab Laktationsbeginn

bei Behandlung innerhalb von 35 Tagen vor dem Abkalben: 40 Tage ab Verabreichung

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verw. bis {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.
