

MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****Yttre kartong****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Apiguard vet 12,5 g/dos bikupegel

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje dos innehåller

Aktiv substans

Tymol.....12,5 g

3. LÄKEMEDELSFORM

Bikupegel

Lätt opalskimrande färglös till rosa, kornig gel.

4. FÖRPACKNINGSTORLEK

Kartong innehållande 1 behållare på 3000g, 1 sprutor och 2 förseglade förpackningar med 30 doseringskort.

Kartong innehållande 2 behållare på 3000g, 2 sprutor och 4 förseglade förpackningar med 30 doseringskort.

3000g Polypropenbehållare med ett polypropenlock.

Polypropenspruta

Polyeten/papper/polyeten doseringskort

5. DJURSLAG

Honungsbin (*Apis mellifera*).

6. INDIKATION(ER)

Behandling av *Varroa destructor* infestation.

7. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Läs informationen på förpackningen före användning.

Användning i bikupa: En dos à 50 g gel (motsvarar 12,5 g tymol) till varje bikupa, med två veckors mellanrum. En behandling = 2 doser.

Maximalt två behandlingar per år.

Administreringssätt

Öppna bikupan. Placera doseringskortet (medföljer) i mitten ovanför yngelramarna. Produkten ska blandas väl före användning med ett bikupeverktyg eller liknande i 10 sekunder. Använd

doseringssprutan (medföljer), överför den första dosen på 50 g gel från behållaren till doseringskortet enligt följande:

Ta ut doseringssprutan ur den förseglade förpackningen. Skjut in sprutmunstycket hela vägen in i gelén och se till att ingen luft kommer in i sprutan. Dra långsamt tillbaka kolven för att suga upp 52 ml (motsvarande 50 g) gel. Dra ut sprutan ur gelen. Tryck försiktigt på kolven för att släppa gelén från sprutan gradvis till hela ytan på doseringskortet.

Se till att det finns ett fritt utrymme på minst 0,5 cm mellan toppen av gelen och kupans lock. Stäng kupan.

Efter avslutad administrering av behandlingen till bikupor ska du tvätta sprutan i varmt vatten. Ta ut kolven helt och tvätta sprutan noggrant för att ta bort spår av gel. Låt torka och förvara i en försluten behållare tills nästa användning.

Byt ut det första doseringskortet mot ett nytt efter 2 veckor och applicera den andra dosen på 52 ml (motsvarande 50 g) gel enligt samma procedur.

Lämna läkemedlet i kolonin i ytterligare 2 veckor tills den helt försvinner från doseringskortet. Ta bort läkemedlet när du installerar supers på kolonin.

Se piktogrammen nedan:



Effekten av Apiguard vet maximeras om produkten används på sensommaren efter honungsskörden (när antalet biyngel minskar). Vid allvarliga angrepp kan denna produkt även användas under våren, när temperaturen är över 15°C.

Effekten kan variera mellan kolonier beroende på applikationssättet.

Läkemedlet bör därför användas som en behandling bland flera andra i ett integrerat program för skadedjursbekämpning och regelbunden kontroll av nedfallet kvalster. Vid observation av ytterligare stora kvalsternedfall följande vinter eller vår rekommenderas en andra vinter- eller vårbehandling för varroa.

8. KARENSTID

Honung: noll dygn.

Använd inte läkemedlet under honungsdrag.

9. SÄRSKILD(A) VARNING(AR),

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Försiktighet bör iakttas för att säkerställa rätt dosering, eftersom fel dosering kan få skadliga effekter på kolonin.

Behandling skall inte genomföras under honungsdrag för att undvika påverkan på honungssmaken. Använd inte läkemedlet när den maximala dagstemperaturen under behandlingen förväntas underskrida 15 °C eller när aktiviteten i kolonin är mycket låg, eller när temperaturen överstiger 40 °C.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Undvik direktkontakt med hud och ögon på grund av risk för ögon-/hudirritation och risk för kontaktdermatit.

Använd ogenomträngliga handskar utöver gängse skyddsutrustning vid hantering av läkemedlet.

Tvätta händer och material som varit i direkt kontakt med gelen med tvål och vatten.

Vid hudkontakt, tvätta området noggrant med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt, skölj rikligt med rinnande, rent vatten och uppsök läkare.

Andas inte in läkemedlet.

Överdoser (symtom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

En större dos än rekommenderat kan orsaka störningar i kolonins beteende (oro, rymning eller ökad dödlighet). Avlägsna överflödigt läkemedel från kolonin vid överdosering.

10. UTGÅNGSDATUM

Utg.dat: Se förpackningens sida

Öppnad förpackning används före: Se förpackningens sida

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30°C.

Får ej frysas.

Se till att behållaren är ordentligt stängd.

Skyddas från direkt solljus.

Skall ej förvaras nära bekämpningsmedel eller andra kemiska ämnen som skulle kunna kontaminera läkemedlet.

Förvaras åtskilt från livsmedel.

De återstående doseringskorten ska förvaras på en torr och ren plats.

Ladda alltid korten med gel i ett väl ventilerat utrymme.

Förvara de återstående doseringskorten i den yttre kartongen

12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Produkten får inte komma ut i vattendrag eftersom det kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

13. TEXTEN "FÖR DJUR" SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

14. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Vita Bee Health Limited
1 Castlewood Avenue
Rathmines, Dublin 6
D06 H685
Irland
+44 1256 473 175
info@vita-europe.com

16. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 62072

17. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats: Se förpackningens sida