

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Новакок форте - разтвор за инфузия за животни
Novacos forte – Infusion Solution for Animals

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ) СУСТАНЦИЯ(И)

В 100 ml разтвор се съдържат:

Активни субстанции

Metamizole sodium	4.00 g
Caffeine	0.35 g
Calcium gluconate	10.00 g
Magnesium gluconate	1.00 g
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate	0.402 g
Acetylmethionine	4.00 g
Glucose (като monohydrate)	18.182 g

Ексципиенти:

1.05 g бензинов алкохол, борова киселина, вода за инжекции

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор за интравенозна инфузия.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

250 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне, говеда, телета и свине.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Прилага се като интравенозна инфузия при треска, болка, състояния на слабост и изтощение, инфекции и интоксикации като коли-мастити, акутна и тежка септицемия, следродилна септицемия, диария, пневмонии, ацетонемия, транспортна болест, млечна треска и пареза, хемоглобинурия.

Използването на Новакок форте като допълнение към основната антиинфекциозна терапия се оказва животоспасяващ момент.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Бавна интравенозна инфузия след затопляне на продукта до телесна температура.

Средни и едри коне	150-250 ml
Дребни коне (200-350 kgт.м.)	100-150 ml

Кончета	до 100 ml
Говеда	до 250 ml
Млади говеда	80-100 ml
Бозаещи телета	50-70 ml
Свине за разплод	50 ml
Свине за угояване	30 ml
Прасенца	20 ml

В зависимост от заболяването третирането може да се повтори в следващите дни. При инфекциозни заболявания продуктът се прилага успоредно с основното лечение от антибиотици или триметоприм - сулфонамидни продукти.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове: Месо и вътрешни органи :свине 3 дни
 говеда 6 дни
 коне 5 дни

Мляко: 2 ½ дни (5 издоявания)

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:

Да се прилага само бавно интравенозно след предварително затопляне на банката до телесна температура, като едновременно се следи сърдечната честота. Да се прекрати инфузията в случай на тахикардия и сърдечна аритмия.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи продукта на животните:

При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне, използвайте преди: 28 дни (при температура 2 °C – 8 °C).

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C). Да се пази от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство. Празните картонени опаковки могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VetViva Richter GmbH, Durisolstrasse 14, 4600 Wels, Austria

16. НОМЕРНА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2184

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР