

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

Болфо 1,23 g/лечебен нашийник за котки и малки кучета (<10 kg)

Болфо 4,442 g/лечебен нашийник за кучета (≥10 kg)

2. Състав

Активни вещества:

Пророхур 98,7 mg/g

	Дължина	Тегло	Пророхур
Болфо лечебен нашийник за котки и малки кучета (<10 kg)	38 cm	12,5 g	1,23 g
Болфо лечебен нашийник за кучета (≥10 kg)	70 cm	45 g	4,442 g

Кафяв нашийник.

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета, котки.



4. Показания за употреба

За профилактика и лечение на опаразитяване с бълхи и кърлежи при кучета и котки.

За опаразитени кучета и котки или при риск от смесено опаразитяване с бълхи и кърлежи. Ветеринарният лекарствен продукт е показан за употреба само, когато е необходимо едновременно третиране срещу бълхи и кърлежи.

Нашийникът е ефективен в продължение на 4 месеца срещу бълхи и 10 седмици срещу кърлежи.

5. Противопоказания

Да не се използва при кученца под 3-месечна възраст.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предупреждения:

Трябва да се обмисли вероятността други животни в домакинството да са източник на повторно

опаразитяване с бълхи и кърлежи, и при необходимост, те да бъдат третирани с подходящ продукт.

Освен бълхите върху кучето, заобикалящата среда също може да е заразена с яйца, ларви и какавиди на бълхи. От тях могат да се развият нови бълхи. Поради тази причина е важно да се осъществява ефективен контрол на тези ранни стадии от развитието на паразитите в средата около кучето, посредством прилагането на подходящ, разрешен инсектицид.

Бълхите могат да бъдат междинен гостоприемник на тении, поради това е препоръчително да бъдат прилагани и продукти за вътрешно обезпаразитяване. За ефективен контрол на бълхите е важно да бъде обработена и средата заобикаляща кучето с подходящ одобрен инсектицид срещу ларвните стадии.

При употребата на този продукт трябва да се вземе предвид местната информация за чувствителността на целевите паразити, когато е налична.

Бълхите върху кучето умират за няколко часа след поставянето на нашийника. Кърлежите, смучещи кръв умират приблизително за един ден. Мъртвите кърлежи падат от кучето или могат да бъдат отстранени лесно.

Кърлежите, попаднали върху кучето ще бъдат убити и ще паднат в рамките на 72 часа, обикновено без да са смукали кръв. Прикрепянето на единични кърлежи не е изключено.

Поради тази причина, предаването на заразни заболявания от кърлежи не може да бъде напълно изключено при неблагоприятни условия.

Специални предпазни мерки при употреба:

Деца трябва да избягват контакт с животни, носещи нашийника.

Да се съхранява далеч от храна и фураж.

Нашийникът да не се използва за игра, в частност от деца.

Нашийникът да не се дъвче или смуче, в частност от деца.

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Да не се използва при животни с механична обструкция на храносмилателния тракт или пикочните пътища, бронхиална астма или други белодробни и сърдечносъдови заболявания, тъй като карбаматите могат да предизвикат контракция на гладката мускулатура.

Да не се използва при животни с кожни увреждания.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Да се избягва контакт с очите и кожата.

Да не се пие, яде или пуши по време на работа с продукта.

След работа с нашийника, ръцете да се измиват старателно с вода и сапун.

Хора с установена свръхчувствителност към пророхиг или към някое от помощните вещества трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Този ветеринарен лекарствен продукт съдържа карбамат (пророхиг). При симптоми на отравяне, моля, потърсете медицинска помощ.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Този продукт е силно токсичен за водни организми, птици и пчели.

Този продукт може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Да не се допуска кучета с поставени нашийници да влизат във водни басейни, в които има водни организми.

Бременност и лактация:

Безопасността на ветеринарния лекарствен продукт не е доказана по време на бременност.

Активното вещество не е класифицирано като ембриотоксично, тератогенно или като репродуктивно токсично, поради което не се очакват такива ефекти при бременни или кърмещи животни.

Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие:
Да не се прилага нашийника едновременно с други инсектициди.

Предозиране:

Поради естеството на фармацевтичната форма, предозирането е невъзможно.

При случайно поглъщане или дъвчене на нашийника е възможно да се появят симптоми на карбаматно отравяне като повишено слюноотделяне, свиване на зениците, повръщане и диария. При клинични признаци на карбаматно отравяне се прилага симптоматично лечение и антидот атропин сулфат, интравенозно.

7. Неблагоприятни реакции

Кучета, котки:

Много редки (по-малко от 1 на 10 000 третирани животни, включително изолирани съобщения):

Еритема в мястото на приложение, Загуба на козина в мястото на приложение, Сърбеж в мястото на приложение, Лезия в мястото на приложение
--

Диария ¹ , Хиперсаливация ¹ , Повръщане ¹
--

Локална еритема ² , Локален сърбеж ²
--

¹След попадане на продукта в устата.

²Леки.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарният лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: {подробности за националната система}.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

Прилагане върху кожата.

Само за външно приложение.

Един нашийник за едно животно, поставен около врата.

Котки и малки кучета с телесна маса до 10 kg: 1 нашийник с дължина 38 cm.

Кучета с телесна маса 10 kg и над 10 kg: 1 нашийник с дължина 70 cm.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

Извадете нашийника от опаковката и го развийте.

Уверете се, че няма остатъци от пластмасовите конектори от вътрешната страна.

Поставете нашийника около врата на животното без да го стягате прекалено (трябва да е възможно да се поставят два пръста между нашийника и врата на животното).

Изтеглете остатъка от нашийника през халката и отрежете излишната част на 2 cm от халката.

Правилно поставеният нашийник трябва да се проверява и регулира периодично, особено при млади животни.

Ефективен е срещу бълхи и кърлежи ако се носи постоянно.

Продължителността и ефикасността на действие зависят от дължината и състоянието на козината, от активността на животното и степента на опаразитяване.

Когато козината на животното е замърсена, е препоръчително то да бъде изкъпано преди поставяне. Нашийникът е водоустойчив, но не се препоръчва животното да се къпе или да плува с него. В такива случаи е добре нашийникът да се свали и след подсушаване на козината да се постави отново.

Загубата на активност може да бъде проверена като се надраска повърхността на нашийник с остър метален предмет. Ако мястото на надраскването е бяло на цвят, нашийникът е все още активен. В противен случай, трябва да бъде заменен с нов.

Оптималният ефект от действието на нашийника се достига 24 часа след поставянето му на врата на животното.

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Този ветеринарен лекарствен продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Да се съхранява в оригиналната опаковка до момента на употреба.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета и картонената кутия след Exp. Срокът на годност отговаря на последния ден от този месец.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като ргорохиг може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Да не се замърсяват реки, речни корита, язовири, резервоари и други водоизточници с продукта.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска без лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

Болфо 1,23 g/лечебен нашийник за котки и малки кучета (<10 kg): 0022-1827

Болфо 4,442 g/лечебен нашийник за кучета (≥10 kg): 0022-1826

38 cm или 70 cm нашийник в полиестер/полиетилен вакуумно запечатана фолиева опаковка, в картонена кутия.

15. Дата на последната редакция на текста

08/2025

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

Elanco Animal Health GmbH, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Германия

Тел: +48221047815

PV.BGR@elancoah.com

Производител, отговарящ за освобождаването на партиди:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Германия

27.8.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV