

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  
КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-3032**

**1.    НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

ЕКТОМИН

ЕСТОМИН

Разтвор за кожа за говеда, овце и кучета

**2.    КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

В 100 ml се съдържат:

**Активно вещество:**

Cypermethrin       10 g

**Помощни вещества:**

| Качествен състав на помощните вещества и другите съставки |
|-----------------------------------------------------------|
| Polysorbate 80                                            |
| Macrogol 400                                              |

**3.    КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

**3.1   Видове животни, за които е предназначен ВЛП**

Говеда, овце и кучета.

**3.2   Показания за употреба за всеки вид животни, за който е предназначен продуктът**

Лечение при инвазии с паразити, чувствителни към циперметрин - лечение при инвазия с кърлежи, бълхи, въшки и мухи, както и за лечение на краста.

**3.3   Противопоказания**

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ КОТКИ. Този продукт е изключително токсичен за котки и може да доведе до тяхната смърт. За да се предпазят котките от инцидентно излагане на действието на продукта е необходимо третираните кучета да се държат отделно от котките за период от 72 часа след третирането.

**3.4   Специални предупреждения**

Да не се използва в комбинация с други противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти.

**3.5   Специални предпазни мерки при употреба**

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Ветеринарният лекарствен продукт е предназначен само за прилагане върху кожата, при стриктно спазване на всички указания за употреба.

Трябва да се внимава, при приложение, продуктът да не попада в очите на животните.

### Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Използвайте продукта на добре проветриво място и избягвайте вдишването на парите.

Да се избягва директен контакт с кожата. Да се измият ръцете след употреба. При контакт ръцете да се измият обилно с вода.

Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, незабавно да се изплакнат, обилно с вода.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни очила, маска за лице за еднократна употреба, защитно облекло, гумени ръкавици и ботуши, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да не се пипа мястото на приложение за период от 3-6 часа след третирането.

Веднага след работа с продукта свалете замърсените дрехи и измийте откритата кожа с чиста вода. Хора с установена свръхчувствителност към пиретроидните инсектициди трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

При случайно поглъщане или при продължително кожно или очно дразнещо действие, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. При работа с продукта да не се яде, пие или пуши.

### Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да попада във водни басейни, тъй като циперметринът е опасен за риби и други водни организми. Затова е важно да се гарантира, че животните се третират в зона, където след изкърпване течността може да се оттича във вана. Необходимо е да се гарантира, че животните не влизат или пресичат водни течения, докато космената покривка е още мокра. Да не се къпят животни в близост до водни корита.

### **3.6 Неблагоприятни реакции**

Не са известни.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на ветеринарния лекарствен продукт. Съобщенията трябва да се изпращат, за предпочитане чрез ветеринарен лекар, или на притежателя на разрешението за търговия или на националния компетентен орган чрез националната система за съобщаване. За съответните данни за връзка вижте също точка 16 от листовката.

### **3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене**

Не се прилага по време на бременност и лактация.

### **3.8 Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие**

Да не се използва в комбинация с други противопаразитни продукти.

### **3.9 Начин на приложение и дозировка**

За прилагане върху кожата.

|  | Степен на разтваряне с вода | на Концентрация, която трябва да се приложи |
|--|-----------------------------|---------------------------------------------|
|--|-----------------------------|---------------------------------------------|

0.5 L/животно

|        |          |         |                            |
|--------|----------|---------|----------------------------|
| Овце   | 1 : 1000 | 100 ppm | Изкърпване                 |
| Кучета | 1 ml/L   | 100 ppm | Напръскване на цялото тяло |

### **3.10 Симптоми на предозиране (и когато е приложимо — процедури на действие при спешни случаи и антидоти)**

Циперметринът е слабо токсичен при приложение върху кожата. Признаците на интоксикация при всички пътища на приемане са характерни за циано-индуцираните пиретроидни интоксикации и се характеризират със седация, атаксия, приведена походка, непостоянен тремор и конвулсии. Тези признаци на токсичност се появяват няколко часа след прилагане на дозата и се проявяват при оцелелите за период от 3 дни.

Няма специфичен антидот, но може да се назначи симптоматична терапия, ако се прецени за необходимо.

### **3.11 Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба, включително ограничения за употребата на антимикробни и противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти, с цел да се ограничи рискът от развитие на резистентност**

Не е приложимо.

### **3.12 Карентни срокове**

Овце:

Месо и вътрешни органи – 7 дни.

Говеда:

Месо и вътрешни органи – 28 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

## **4. ФАРМАКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **4.1 Ветеринарен лекарствен анатомо-терапевтичен код (ATCvet Code): QP53AC08**

Ектопаразитициди за локална употреба, пиретрини и пиретроиди.

### **4.2 Фармакодинамика**

Циперметринът е синтетичен пиретроиден инсектицид, който притежава висока инсектицидна активност, ниска токсичност за птиците и бозайниците и е достатъчно стабилен на въздух и светлина.

Циперметринът е високо ефективен инсектицид, ефикасен срещу широк кръг паразити. Инсектицидът притежава невротоксично действие върху аксоните на централната и периферната нервна система, посредством взаимодействие с натриевите канали при бозайници и инсекти.

При гръбначните и безгръбначните, циперметринът действа главно върху нервната система. Циперметринът действа едновременно като стомашна отрова и като контактен инсектицид. В периферната нервна система, първоначалното му действие се изразява в предизвикване на видими повтарящи се действия и възникването на нервни импулси в резултат на промяна на йонния пермамбилитет на нервните мембрани. Това дълго и постоянно действие може да причини стотици до хиляди повтарящи се нервни импулси в сетивните органи. Тази повтаряща се активност е в следствие на пиретроидни

### **4.3 Фармакокинетика**

Синтетичните пиретроиди обикновено се метаболизират при бозайници чрез естерна хидролиза, окисляване и конюгиране и нямат склонност към натрупване в тъканите.

## **5. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

### **5.1 Основни несъвместимости**

При липса на данни за съвместимост този ветеринарен лекарствен продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарни лекарствени продукти.

### **5.2 Срок на годност**

Срок на годност на крайния ветеринарен лекарствен продукт: 2 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 30 дни.

### **5.3 Специални условия за съхранение**

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява далече от източници на топлина.

### **5.4 Вид и състав на първичната опаковка**

Стъклен флакон с гумена тапа и алуминиева капачка от 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml и 100 ml, опаковани в картонена кутия.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

### **5.5 Специални мерки за унищожаване на неизползвани продукти или остатъци от тях**

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като циперметрин може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Не трябва да се замърсяват езера, водни пътища или канавки с продукта или празни опаковки.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

## **6. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

“Фарма Вет” ООД

## **7. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

0022-3032

**8. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 08/01/2021

**9. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

03/2024

**10. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ**

Да се отпуска само по лекарско предписание.

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ**  
*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*