

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS V/NRP/19/0002

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

LV Calmasol-204 S šķīdums injekcijām liellopiem, zirgiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāta monohidrāts 200 mg

Nātrija toldimfos 4 mg

Magnija hlorīda heksahidrāts 3,34 mg

Palīgvielas:

Nātrija metilparahidroksibenzoāts 1,5 mg

Nātrija propilparahidroksibenzoāts 0,15 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Dzidrs, gaiši dzeltens šķīdums

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Mērķa sugas

Liellopi, zirgi, aitas, cūkas, suņi un kaķi.

4.2 Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Piena triekas, pirmsdzemdību un pēcdzemdību paraplēģijas, stresa sindroma, alergisku reakciju ārstēšanai, organisma vispārējai stimulācijai zirgiem, liellopiem, teļiem, kumeļiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem.

4.3 Kontrindikācijas

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5 Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pirms lietošanas šīm veterinārajām zālēm ļaut uzsilt līdz ķermeņa temperatūrai.

Intravenozā infūzija vai injekcija jāveic lēni.

Ievadot subkutāni, kopējā deva jāsadala uz divām injekcijas vietām.

Infūzijas laikā jāuzrauga sirdsdarbības ātrums un ritms, kā arī asinsrite. Ja parādās jebkādas pārdozēšanas pazīmes, infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Ja notikusi nejauša saskare ar acīm, rūpīgi skalot acis ar tekošu ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Ja notikusi nejauša saskare ar ādu, skartā vieta jāmazgā ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Nejaušas pašinjekcijas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai marķējumu ārstam.

Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm. Nekavējoties noskalojiet ādu ar acīm un skalojiet ar ūdeni.

Ar šīm veterinārajām zālēm jārikojas uzmanīgi, ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Pēc preparāta lietošanas mazgājiet rokas.

4.6 Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7 Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9 Devas un lietošanas veids

Lēnai intravenozai, subkutānai, intraperitoneālai vai intramuskulārai injekcijai.

Zirgiem, liellopiem – 250 ml.

Teļiem, kumeļiem, aītām, cūkām – 50-150 ml.

Suņiem un kaķiem – 15-50 ml.

Saskaņā ar ārstējošā veterinārārsta norādījumiem, nepieciešamības gadījumā šīs veterinārās zāles ievada atkārtoti.

4.10 Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav novērota.

4.11 Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: kalcijs, kombinācijas ar citām vielām.
ATĶvet kods: QA12AX00.

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Kalcijs LV *Calmasol-204 S* sastāvā ir kompleksa savienojuma veidā kā kalcija glikonāta monohidrāts; fosfors kā nātrija toldimfos, bet magnijs kā magnija hlorīda heksahidrāts.

LV *Calmasol-204 S* sastāvā iekļautās aktīvās vielas atjauno organisma kalcija-magnija-fosfora līdzsvaru, kura izmaiņas visbiežāk izraisa dzemdību parēzi (piena trieka); fosfors darbojas tonizējoši.

LV *Calmasol-204 S* aplikācija it īpaši ir nepieciešama pirms un pēcdzemdību periodā, kā arī atveseļošanās laikā pēc pārslimotām slimībām.

5.2 Farmakokinētiskie dati

LV *Calmasol-204 S* komponenti atjauno elektrolītu līmeni asinīs, kuri vitāli nepieciešami daudzu metabolo procesu norisē. Fosfors un magnijs no organisma izdalās galvenokārt ar urīnu, bet kalcijs arī ar fekālijām.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Borskābe

Sorbīts

Nātrija hlorīds

Nātrija metilparahidroksibenzoāts

Nātrija propilparahidroksibenzoāts

Ūdens injekcijām

6.2 Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3 Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 3 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4 Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

6.5 Tiešā iepakojuma veids un saturs

500 ml polipropilēna flakons ar sterilu brombutila gumijas aizbāzni un alumīnija vāciņu.

6.6 Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Viimsi county
Harjumaa 74013
Igaunija
Tālr.: +372 6005 005
Fakss: +372 6005 006

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/19/0002

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 27/02/2019

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2019

RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

