

**NOTICE**  
**DOLTHENE suspension buvable pour chiens**

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS SI DIFFÉRENT**

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

Dopharma Research  
Zalmweg 24 – 4941 VX  
P.O. Box 205 – 4940 AE  
Raamsdonksveer – the Netherlands

**Fabricant responsable de la libération des lots**

Dopharma France  
23 Rue du Prieuré, Saint-Herblon  
44150 Vair-sur-Loire  
France

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

DOLTHENE suspension buvable pour chiens  
(S, M, L)

**3. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET AUTRES INGRÉDIENTS**

**Substance active**

Oxfendazolum 22,65 mg

**Excipients**

Acidum sorbicum 1,50 mg  
Aqua purificata q.s.p. 1 ml

**4. INDICATIONS**

Traitement et contrôle chez le chien des helminthoses digestives à :

Nématodes

*Toxocara canis*  
*Toxascaris leonina*  
*Uncinaria stenocephala*  
*Ancylostoma caninum*  
*Ancylostoma braziliense*  
*Trichuris vulpis*

Cestodes

*Taenia* spp  
*Dipylidium caninum*

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas traiter les femelles gestantes pendant les 35 premiers jours de la gestation.

## **6. EFFETS INDESIRABLES**

Très rarement, de troubles gastro-intestinaux comme vomissements ou l'anorexie peuvent se manifester.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a été pas efficace, veuillez en informer votre vétérinaire.

## **7. ESPECES CIBLES**

Chiens.

## **8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPECE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION**

La suspension est à administrer par voie orale, mélangée à la nourriture ou éventuellement administrée directement dans la gueule.

Le goût neutre de la suspension permet une administration facile aux chiots.

Posologie: 11,3 mg de principe actif par kg et par jour, soit 5 ml pour 10 kg de poids vif, pendant trois jours consécutifs.

Chaque boîte du médicament vétérinaire contient une pipette doseuse à graduation de 5 ml équivalent à 10 kg.

## **9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Bien agiter avant emploi.

## **10. TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

## **11. CONDITIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Protéger de la lumière. A conserver à l'abri du gel.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

## **12. MISES EN GARDE PARTICULIERES**

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

La résistance des parasites à une classe particulière d'anthelminthique peut se développer suite à une utilisation fréquente et répétée d'un anthelminthique de cette classe.

Ne pas utiliser chez l'animal présentant une hypersensibilité connue à la substance active ou un excipient.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux :

En ce qui concerne des réactions locales d'hypersensibilité, éviter le contact direct lors de l'application.  
Porter des gants.

Gestation et lactation :

Ne pas traiter les femelles gestantes pendant les 35 premiers jours de la gestation.  
Le médicament vétérinaire peut être administré pendant la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

Ne pas mélanger avec un autre médicament.

Surdosage (symptômes conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire :

La tolérance du médicament vétérinaire chez les chiens après l'administration jusqu'à 5 fois la dose recommandée pendant plus que 3 fois la période de traitement recommandée est très bien.  
Rarement, de troubles gastro-intestinaux comme vomissements ou l'anorexie peuvent se manifester.

Incompatibilités:

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

**13. PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR L'ELIMINATION DES MEDICAMENTS NON UTILISES OU DES DECHETS DERIVES DE TELS MEDICAMENTS VETERINAIRES**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

**14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE**

Décembre 2019

**15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

BE-V164717

Flacons de 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 et 250 ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Délivrance**

Délivrance libre