

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VITOL-140, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

retinolio palmitato (vit. A)	80 000 TV,
cholecalciferolio (vit. D3)	40 000 TV,
alfa-tokoferolio acetato (vit. E)	20 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio, butilhidroksitolueno iki 1 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Galvijai, veršeliai, avys, ožkos, arkliai, kiaulės, šunys ir katės.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Galvijų, veršelių, avių, ožkų, arklių, kiaulių, šunų ir kačių organizmui papildyti vitaminais A, D3 ir E, sergant jų trūkumo ligomis, patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų) bei pašarų įsisavinimui pagerinti.

4.3. Kontraindikacijos

Nenaudoti maistiniams gyvūnams, kuriems pakanka vitamino A, nes preparatai gali kauptis valgomuose audiniuose.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Kad vaistas nesikaupytų organizme, nereikėtų juo gydyti dažniau nei kartą per savaitę.

Maistinių gyvūnų rūšims šį veterinarinį vaistą galima skirti tik vieną kartą ir negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus vitamino A, negalima atmesti hipervitaminozės tikimybės. Todėl šį vaistinį preparatą reikia naudoti labai atsargiai. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Atlikus vitamino A tyrimus su laboratoriniais gyvūnais, nustatytas teratogeninis poveikis. Todėl šio veterinarinio vaisto negali švirkšti nėščios moterys. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, reikia plauti dideliu kiekiu vandens. Naudojus vaistą, reikia plauti rankas.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Naudojus rekomenduotinomis dozėmis – nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumo pradžioje vaikingoms patelėms vaistą reikia skirti apdairiai, nes vitaminas A gali veikti teratogeniškai.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Patartina vaisto nemaišyti su kitais veterinariniais vaistais.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti po oda ar į raumenis, laikantis įprastų aseptikos reikalavimų. Maistinių gyvūnų rūšims šio veterinarinio vaisto negalima naudoti po oda:

arkliui, galvijui – 10 ml tirpalo,

veršeliui, kumeliukui – 5 ml,

aviai, ožkai – 3 ml,

kiaulei – 5–8 ml,

paršeliui – 1–3 ml,

šuniui – 1–5 ml,

katei – 1–2 ml.

Maistinių gyvūnų rūšims šį veterinarinį vaistą galima skirti tik vieną kartą ir negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Riebaluose tirpių vitaminų negalima perdozuoti, nes jie kaupiasi organizme ir gali sukelti nepalankų poveikį. Perdozavus vitamino A sumažėja apetitas, priesvoris, atsiranda eritema, alopecija, gleivinių pažeidimai, ilgųjų kaulų skilimai, pasireiškiantys šlubavimu ar pakitusia eiseną. Perdozavus vitamino D pasireiškia hiperkalcemija, hipofosfatemija, osteoporozė, hipoparatiroidizmas, hiperkalcitoninizmas ir degeneracinė kalcinozė.

Negalima viršyti rekomenduotinių dozių.

4.11. Išlauka

Galvijienai: 234 paros;

Kiaulienai: 224 paros;

Arklienai: 234 paros;

Avienai: 185 paros;

Ožkienai: 185 paros.

Pienui – 120 valandų (5 paros).

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: vaistai virškinimo traktui ir medžiagų apykaitai, riebaluose tirpių vitaminų mišinys. ATCvet kodas: QA11JA.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Tikslus vitaminų veikimo mechanizmas nėra žinomas. Vitaminas A yra svarbus regėjimui ir reprodukcijai. Jo taip pat reikia normaliam odos epителиui, augimui, audinių atsistatymui, kaulų formavimuisi, imuninėms funkcijoms bei hormonų sintezei. Vitaminas D3 būtinas reguliuojant kalcio ir fosfatų koncentraciją kraujo plazmoje bei apykaitą per tris pagrindinius audinius: inkstų, plonųjų žarnų ir kaulų. Jauniklių organizme vit. D3 yra ypač svarbus skeletui ir dantims normaliai vystytis. Vitaminas E veikia kaip antioksidantas ir laisvųjų radikalų gaudyklė, būtinas ląstelių membranos stabilumui, eritrocitų apsaugai. Vit. E apsaugo deguoniui jautrų vit. A nuo oksidacinio suardymo.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Dideli riebaluose tirpių vitaminų kiekiai pirmiausia kaupiasi kepenyse ir riebaliniame audinyje, čia būna ilgesnį laiką. Oksiduoti ar konjuguoti su gliukurono rūgštimi metabolitai išsiskiria su šlapimu ar tulžimi.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Benzilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, sojų aliejus.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 2 sav.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti šaldytuve, 2-8 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

II tipo rudo stiklo flakonai po 100 ml, užkimšti guminiiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. REGISTRUOTOJAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
LIETUVA

8. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/10/2004/001

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2010-12-10.
Perregistravimo data 2015-12-09.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2025-11-14

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS IR PIRMINĖS PAKUOTĖS

**STIKLINIS FLAKONAS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VITOL-140, injekcinis tirpalas

2. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
retinolio palmitato (vit. A) 80 000 TV,
cholekalciferolio (vit. D3) 40 000 TV,
alfa-tokoferolio acetato (vit. E) 20 mg;
pagalbinių medžiagų (benzilo alkoholio, butilhidroksitolueno).

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, veršeliai, avys, ožkos, arkliai, kiaulės, šunys ir katės.

6. INDIKACIJA (-OS)

Galvijų, veršelių, avių, ožkų, arklių, kiaulių, šunų ir kačių organizmui papildyti vitaminais A, D3 ir E, sergant jų trūkumo ligomis, patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų) bei pašarų įsisavinimui pagerinti.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Švirkšti po oda ar į raumenis, laikantis įprastų aseptikos reikalavimų. Maistinių gyvūnų rūšims šio veterinarinio vaisto negalima naudoti po oda:

arkliui, galvijui – 10 ml tirpalo,
veršeliui, kumeliukui – 5 ml,
aviai, ožkai – 3 ml,
kiaulei – 5–8 ml,
paršeliui – 1–3 ml,
šuniui – 1–5 ml,
katei – 1–2 ml.

8. IŠLAUKA

Išlauka:

Galvijienai: 234 paros;

Kiaulienai: 224 paros;

Arkliai: 234 paros;

Avienai: 185 paros;

Ožkiai: 185 paros.

Pienui – 120 valandų (5 paros).

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

Atidarius – 2 sav.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti šaldytuve, 2-8 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“

Terminalo g. 13, Biruliškės

LT-54469, Kauno r.

LIETUVA

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs {numeris}

INFORMACINIS LAPELIS
VITOL-140, injekcinis tirpalas

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

UAB „Interchemie werken „De Adelaar“ LT“
Terminalo g. 13, Biruliškės
LT-54469, Kauno r.
LIETUVA

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,
Vanapere tee 14, Pringi, Viimsi vald,
74001 Harjumaa,
ESTIJA

PharmaPark Production OÜ

Nuia tn 2 Tallinn Harjumaa 11415
Estija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

VITOL-140, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

retinolio palmitato (vit. A)	80 000 TV,
cholekalciferolio (vit. D3)	40 000 TV,
alfa-tokoferolio acetato (vit. E)	20 mg;

pagalbinių medžiagų:

benzilo alkoholio, butilhidroksitolueno iki 1 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Galvijų, veršelių, avių, ožkų, arklių, kiaulių, šunų ir kačių organizmui papildyti vitaminais A, D3 ir E, sergant jų trūkumo ligomis, patyrus stresą (dėl vakcinacijos, transportavimo, didelės drėgmės ar temperatūrų svyravimų) bei pašarų įsisavinimui pagerinti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Naudojus rekomenduotinomis dozėmis – nežinomos.

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai, veršeliai, avys, ožkos, arkliai, kiaulės, šunys ir katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti po oda ar į raumenis, laikantis įprastų aseptikos reikalavimų. Maistinių gyvūnų rūšims šio veterinarinio vaisto negalima naudoti po oda:

arkliui, galvijui – 10 ml tirpalo,

veršeliui, kumeliukui – 5 ml,

aviai, ožkai – 3 ml,

kiaulei – 5–8 ml,

paršeliui – 1–3 ml,

šuniui – 1–5 ml,

katei – 1–2 ml.

Maistinių gyvūnų rūšims šį veterinarinį vaistą galima skirti tik vieną kartą ir negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. 12 p.

10. IŠLAUKA

Galvijienai: 234 paros;

Kiaulienai: 224 paros;

Arklienai: 234 paros;

Avienai: 185 paros;

Ožkienai: 185 paros.

Pienui – 120 valandų (5 paros).

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Atidarius laikyti šaldytuve, 2-8 °C temperatūroje.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 2 sav.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Kad vaistas nesikauptų organizme, nereikėtų juo gydyti dažniau nei kartą per savaitę.

Maistinių gyvūnų rūšims šį veterinarinį vaistą galima skirti tik vieną kartą ir negalima viršyti rekomenduojamos dozės.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai įsišvirkštus vitamino A, negalima atmesti hipervitaminozės tikimybės. Todėl šį vaistinį preparatą reikia naudoti labai atsargiai. Atsitiktinai įsišvirkštus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Atlikus vitamino A tyrimus su laboratoriniais gyvūnais, nustatytas teratogeninis poveikis. Todėl šio veterinarinio vaisto negali švirkšti nėščios moterys. Atsitiktinai patekus ant odos ar į akis, reikia plauti dideliu kiekiu vandens. Naudojus vaistą, reikia plauti rankas.

Vaikingumas ir laktacija

Vaikingumo pradžioje vaikingoms patelėms vaistą reikia skirti apdairiai, nes vitaminas A gali veikti teratogeniškai.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Riebaluose tirpių vitaminų negalima perdozuoti, nes jie kaupiasi organizme ir gali sukelti nepalankų poveikį. Perdozavus vitamino A sumažėja apetitas, priesvoris, atsiranda eritema, alopecija, gleivinių pažeidimai, ilgųjų kaulų skilimai, pasireiškiantys šlubavimu ar pakitusia eisena. Perdozavus vitamino D pasireiškia hiperkalcemija, hipofosfatemija, osteoporozė, hipoparatiroidizmas, hiperkalcitoninizmas ir degeneracinė kalcinozė. Negalima viršyti rekomenduotinių dozių.

Nesuderinamumai

Šio veterinarinio vaisto negalima maišyti su kitais veterinariniais vaistais.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2025-11-14

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: vaistai virškinimo traktui ir medžiagų apykaitai, riebaluose tirpių vitaminų mišinys. ATCvet kodas: QA11JA.

Pakuotė: II tipo rudo stiklo flakonai po 100 ml, užkimšti guminiais kamšteliais ir apgaubti aliumininiais gaubteliais.